

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Lidokain SAD infusionsvæske, opløsning 5 g/l

Lidocainhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Lidokain SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Lidokain SAD
3. Sådan skal du tage Lidokain SAD
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Lidokain SAD anvendes til at forebygge og behandle hurtig uregelmæssig hjerterytme.

Ekstra hjerteslag og hurtige hjerteslag understøttende ved meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop med øget pacemakeraktivitet.

Du vil få Lidokain SAD som en meget langsom indsprøjtning i en blodåre af en læge eller sygeplejerske.

Lægen kan give dig Lidokain SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE LIDOKAIN SAD

Tag ikke Lidokain SAD

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for lidocainhydrochlorid eller andre lokalbedøvende midler, der minder om lidocain (lokalanalgetika af amidtypen), eller et af de øvrige indholdsstoffer
- hvis du har for lavt blodtryk

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Lidokain SAD:

- Hvis du har en hjertesygdom
- Hvis du har hjerteblok (overledningsproblemer)
- Hvis du har nedsat leverfunktion
- Hvis du bliver behandlet med medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (du vil så skulle kontrolleres)

Du skal være opmærksom på følgende:

- Lidokain SAD indeholder glucose, så hvis du har diabetes, vil medicinen blive givet med forsigtighed.

Brug af anden medicin sammen med Lidokain SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Det er især vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du får:

- medicin mod for meget mavesyre (cimetidin)
- medicin til behandling af forhøjet blodtryk og hjerterytme forstyrrelser (beta-blokkere) (propranolol, metoprolol og tertatolol)
- medicin til at kontrollere hjerterytmen (propafenon)
- medicin mod epilepsi (phenytoin)
- medicin mod infektion (rifampicin)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til

råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun få Lidokain SAD efter aftale med lægen. Fosterets puls kan påvirkes (nedsættes).

Amning

Lidokain SAD kan bruges under amning. Lidocain udskilles i modermælken. Efter indsprøjtning hos moren kan der muligvis opstå bivirkninger hos det ammede barn i form af sløvhed, irritabilitet, langsom og uregelmæssig puls.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lidokain SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Lidokain SAD indeholder glucose

Medicinen indeholder glucose. 1 liter indeholder 55 g glucose. Diabetespatienter skal tage hensyn hertil. Spørg lægen, hvis du er i tvivl.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE LIDOKAIN SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Lidokain SAD gives som en meget langsom indsprøjtning i en blodåre (intravenøs infusion). Du vil normalt få Lidokain SAD af en læge eller sygeplejerske.

Du må få Lidokain SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Den sædvanlige dosis

Doseringen er individuel. Lægen vil afgøre den rette dosis til dig, og om der skal muligvis anvendes mindre dosis. Dosis vil afhænge af din vægt og dit helbred.

Voksne

I starten gives 1-2 mg lidocain pr. kg legemsvægt i løbet af 1-2 minutter. Dette kan gentages 1-2 gange med 5-10 minutters interval. Herefter indgives dosis som en meget langsom indsprøjtning med 1-4 mg pr. minut.

Hvis du har brugt for meget Lidokain SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Lidokain SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.

Hvis du har fået for meget Lidokain SAD, kan du få følgende symptomer:

- Rysten
- Krampe
- Bevidstløshed

og sjældnere:

- Langsom puls
- Hjertestop (asystoli)
- Svækket vejrtrækning og blåfarvning af læber og negle

Hvis du har glemt at bruge Lidokain SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Lidokain SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede):

Alvorlige: Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Ikke alvorlige: Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Allergiske reaktioner.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Alvorlige: Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bevidstløshed evt. svækket vejrtrækning og blåfarvning af læber og negle.

Ring 112.

Unormal og uregelmæssig hjerterytme. Forsinket hjertebanken og nedsat sammentrækningskraft af hjertet (ved meget høje doser). Kan være eller blive alvorligt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige: Svimmelhed, dødsghed, indre uro, talebesvær, kvalme, forvirring, opstemthed, synsforstyrrelser (tågesyn).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring.

Opbevar Lidokain SAD i original emballage.

Opbevar Lidokain SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Lidokain SAD efter den udløbsdato (Anv. inden), der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Lidokain SAD 5 g/l infusionsvæske indeholder

Aktivt stof: Lidocainhydrochlorid. Glucosemonohydrat.

Øvrige hjælpestoffer: Vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Lidokain SAD 5 g/l er en klar, farveløs væske.

Lidokain SAD findes i pakningsstørrelse på:

500 ml infusionsbeholder.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

AmgroS I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgroS@amgroS.dk

Fremstiller

Sygehusapoteket Region Nordjylland

Porsvej 1

9000 Aalborg

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2014.

Vnr. 701144-01