

Indlægsseddel: Information til brugeren**ZOVIRAX®
3% øjensalve
Aciclovir**

92268-001-01

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Zovirax til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovirax.
3. Sådan skal du bruge Zovirax.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

- Zovirax virker ved at hæmme formering af herpesvirus.
- Du kan bruge Zovirax til behandling af herpes i øjet.

Lægen kan have givet dig Zovirax for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovirax**Brug ikke Zovirax**

- hvis du er allergisk over for aciclovir, valaciclovir eller det øvrige indholdsstof i Zovirax (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Zovirax

- Øjensalven kan give forbigående mild svie umiddelbart efter påsmøring.
- Du må ikke bruge kontaktlinser, mens du er i behandling med Zovirax øjensalve.

Brug af anden medicin sammen med Zovirax

- Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem brug af Zovirax og det andet præparat.

Førtæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

- Du må kun bruge Zovirax efter aftale med lægen.

Amning:

- Du kan bruge Zovirax, selvom du ammer. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovirax kan give sløret syn lige efter brug. Vent med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, til dit syn er klart igen.

3. Sådan skal du bruge Zovirax**Den sædvanlige dosis er**

Læg cirka 1 cm øjensalve i nederste øjnlågsrand 5 gange dagligt. Fortsæt i mindst 3 dage efter symptomerne er ophørt.



Brug altid Zovirax nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du har brugt for meget Zovirax

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket,

hvis du har brugt mere Zovirax, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Zovirax

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Zovirax

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om. Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Zovirax.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Irritation i øjet pga. overfladisk påvirkning af hornhinden.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Forbigående mild irritation eller svien i øjet i forbindelse med påsmøring.
- Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Betændelse i øjenlåsranden (bygkorn).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldendebivirkning.dk eller E-mail: [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk). Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar Zovirax utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Zovirax ved temperaturer over 25 °C.
- Bør kun anvendes 1 måned efter åbning.
- Brug ikke Zovirax efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zovirax, 3%, øjensalve indeholder:

Aktivt stof:

Aciclovir 30 mg/g.

Øvrigt indholdsstof:

Hvid vaselin.

Pakningsstørrelser:

Zovirax fås i:

Zovirax øjensalve 3% i pakninger med en tube á 4,5 g øjensalve.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostovice, CZ

I Danmark markedsføres Zovirax også som Zovir.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2014.



922680101