

Indlægsseddel: Information til brugeren

Betolvex® 1 mg filmovertrukne tabletter

cyanocobalamin

08-2025
P507745-10

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Betolvex
3. Sådan skal du tage Betolvex
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Betolvex indeholder B₁₂-vitamin, som er nødvendigt for nervesystemets funktion og for dannelsen af røde blodlegemer.

Du kan tage Betolvex til langtidsbehandling af sygdommen pernicious anæmi. Det er en alvorlig form for blodmangel, som skyldes mangel på B₁₂-vitamin.

Lægen kan have givet dig Betolvex for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Betolvex

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Betolvex

- hvis du er allergisk over for vitamin B₁₂ eller et af de øvrige indholdsstoffer i Betolvex (angivet i afsnit 6).
- hvis du har en sjælden, arvelig sygdom i synsnerverne kaldet Lebers arvelige optiske neuropati.
- hvis du har nedsat syn på grund af overdrevent tobaks- og alkoholforbrug.
- hvis du har en sjælden nervesygdom kaldet tropisk ataktisk neuropati.

Brug af andre lægemidler sammen med Betolvex

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

- Tal med din læge, hvis du tager
- p-piller eller mini-piller
 - lægemidler mod alvorlige infektioner (aminoglycosider, chloramphenicol)
 - lægemidler mod kronisk, blødende betændelse i tarmen (aminosalicylsyre)
 - lægemidler mod epilepsi (phenytoin)
 - lægemidler mod diabetes (metformin)
 - lægemidler mod forhøjet kolesterol (colestyramin)
 - lægemidler mod kaliummangel (kaliumsalte)
 - lægemidler mod forhøjet blodtryk (methyldopa)
 - lægemidler mod for meget mavesyre (f.eks. omeprazol og cimetidin)

Brug af Betolvex sammen med mad og drikke

Du skal tage Betolvex med et glas vand.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan tage Betolvex under graviditet.

Amning

Betolvex går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Betolvex påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Betolvex

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Den sædvanlige dosis er 1 tablet dagligt.

Hvis du har taget for meget Betolvex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Betolvex, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Betolvex giver som regel ingen symptomer ved overdosering.

Hvis du har glemt at tage Betolvex

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Betolvex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos 1-10 ud af 10.000 behandlede):

- Allergiske reaktioner inklusive udslæt, nældefeber og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Feber.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Betolvex utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Tag ikke Betolvex efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Betolvex indeholder:

- Aktivt stof: cyanocobalamin. 1 filmovertrokken tablet indeholder 1 mg cyanocobalamin.
- Øvrige indholdsstoffer: mannitol, pregelatineret stivelse, mikrokrySTALLinsk cellulose, magnesiumstearat, stearinsyre, kartoffelstivelse, hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171), jernoxid (E172).

Pakningsstørrelser

Betolvex fås i pakningsstørrelser à 60, 100, 120 (2x60) og 180 (3x60) filmovertrukne tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4
Stenhuggervej 12
6710 Esbjerg V

Fremstiller:

2care4
Stenhuggervej 12-14
6710 Esbjerg V

Betolvex® er et registreret varemærke, der tilhører Actavis Group ehf.

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2025.