

Baypress® 20 mg tabletter

nitrendipin

0242145903

Baypress® er et registreret varemærke, som tilhører Bayer Koncernen

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Baypress® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Baypress® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Baypress®'s virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Baypress®
3. Sådan skal De bruge Baypress®
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Baypress®
6. Yderligere oplysninger

1 Baypress®'s virkning og hvad De skal bruge det til

Baypress® anvendes til behandling af forhøjet blodtryk.

Baypress® indeholder det aktive stof nitrendipin, som er en calciumantagonist, der virker ved at afslappe de små blodkar og gør det derved lettere for blodet at passere i blodkarrene, hvorved blodtrykket falder.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Baypress®

Brug ikke Baypress®, hvis:

- De er overfølsom overfor nitrendipin, andre dihydropyridiner eller et af de øvrige indholdsstoffer i Baypress®
- De lider af kredsløbskollaps (kardiogen shock) pga. hjertelidelse, blodprop i hjertet, rytmeforstyrrelser i hjertet eller væskeophobning i hjertesækken
- De lider af åreforkalkning, forsnævret åbning mellem hjertekamrene eller forstørret hjerte

- De har ustabil angina pectoris
- De har eller har haft stærkt nedsat blodgennemstrømning i hjertet eller blodprop i hjertet
- De lider af hjertesvigt
- De er i behandling med et af følgende stoffer: rifampicin (antibiotika), phenytoin, carbamazepin eller phenobarbiton (mod epilepsi)

Vær ekstra forsigtig med at bruge Baypress®

- Hvis De har alvorlig nedsat lever- eller nyrefunktion. Dosis skal muligvis justeres. Tal med lægen
- Hvis De lider af overledningsforstyrrelser i hjertet, hjertesvigt, hurtig puls, åreforkalkning eller forsnævring af hjerteklapperne. Tal med lægen
- Hvis De i forvejen har dårligt hjerte, da Baypress® i så fald kan forårsage hjertekramper (angina pectoris). Hvis De i forvejen lider af angina pectoris, kan De opleve en forværring, hvis De stiger for hurtigt i dosering i begyndelsen af behandlingen eller hvis De pludselig stopper med behandlingen
- Hvis De i forvejen lider af utilstrækkelig blodgennemstrømning i hjertet (myokardieiskæmi), da Baypress® kan forårsage udtalt blodtryksfald med efterfølgende hurtig puls hos denne gruppe. Det kan resultere i blodpropper i hjertet hos patienter med myokardieiskæmi. Tal med lægen

Brug af anden medicin

Fortæl altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Baypress®, og Baypress® kan påvirke virkningen af anden medicin. De skal fortælle lægen, hvis De bruger følgende medicin:

- Anden medicin for blodtrykket (særligt betablokkere)
- Mod epilepsi (phenytoin, carbamazepin, phenobarbiton)
- Mod HIV-infektion (amprenavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, saquinavir)
- Baclofen (muskelfslappende)
- Digoxin (for hjertet)
- Rifampicin (antibiotika)

- Cimetidin (mod mavesår og for meget mavesyre)

De bør ikke tage Baypress® sammen med grapefrugtjuice, da grapefrugtjuice kan øge virkningen af Baypress®.

Brug af Baypress® sammen med mad og drikke

De kan tage Baypress® sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Erfaringerne med brug af Baypress® til gravide er meget begrænsede. De må derfor kun bruge Baypress® efter lægens anvisning.

Amning

Erfaringer med Baypress® er endnu begrænsede. De bør derfor ikke bruge Baypress®, hvis De ammer. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Baypress® kan, særlig i starten af behandlingen eller ved øgning af dosis, give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes i trafikken.

3. Sådan skal De bruge Baypress®

Voksne:

Den sædvanlige dosis er mellem 10 og 20 mg og skal tages 1 gang dagligt om morgenen.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Dosis skal muligvis nedsættes. Lægens anvisning skal følges.

Brug altid Baypress® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis De har brugt for meget Baypress®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Baypress®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Symptomer på overdosering er for lavt blodtryk, evt. bevidsthedssvækkelse og shock.

Hvis De har glemt at tage Baypress®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med Deres sædvanlige dosering.

Hvis De holder op med at tage Baypress®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. Bivirkninger

Baypress® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter): Hjertekramper (angina pectoris, kan særligt forekomme i begyndelsen af behandlingen eller ved øgning af dosis), hurtig puls, lavt blodtryk, besvimelse, blodprop i hjertet (se afsnittet "Vær ekstra forsigtig med at bruge Baypress®"). Kontakt læge eller sygehus, ring evt. 112, hvis De får smerter i brystet, som stråler ud til venstre arm, ryggen, skuldrene, halsen eller kæben. Ubehaget kan ledsages af åndenød, maveforstyrrelser, svimmelhed og besvimelse.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter): Hovedpine, rødmen af huden, periodevis rødmen af ansigtet, hyppig vandladning.

Ikke almindelige bivirkninger

(det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter): Svimmelhed, rysten, unormale følelser i huden, fx myrekryb, kløende, brændende, sovende eller prikkende fornemmelser, hjertebanken, væskeophobning i anklerne, mavearmproblemer (kvalme, opkastning, diarre, mavesmerter), træthed.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter): Nervøsitet, synsforstyrrelser, allergiske hudreaktioner (eksem, nældefeber, kløe), muskelsmerter.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Fortykkelse af tandkødet, påvirket leverfunktion, brystudvikling hos mænd.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kræver behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Sådan opbevarer De Baypress®

Baypress® opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Baypress®, efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Baypress® indeholder:

Det virksomme indholdsstof i Baypress® 20 mg tabletter er nitrendipin 20 mg.

De øvrige indholdsstoffer er: Natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, majsstivelse, mikrokrySTALLINSK cellulose, povidon.

Baypress®'s udseende og pakningsstørrelser:

Baypress® 20 mg er en rund, lysegul tablet med deleker, mærket H H på den ene side, og Bayer Bayer (i et kryds) på den anden side. Baypress® 20 mg tabletter findes i pakningsstørrelsen 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark:

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 04/2007