

Indlægsseddel: Information til brugeren
Isosorbidmononitrat Orifarm 60 mg depottabletter
isosorbidmononitrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isosorbidmononitrat Orifarm
3. Sådan skal du tage Isosorbidmononitrat Orifarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Isosorbidmononitrat Orifarm indeholder isosorbidmononitrat, der tilhører gruppen af medicin kaldet nitrater.

Denne type medicin afslapper og udvider blodkarrene omkring hjertet, hvorved blodet får nemmere ved at strømme til hjertet og rundt i kroppen. Din medicin er en depottablet, som langsomt frigiver medicinen i kroppen.

Isosorbidmononitrat Orifarm anvendes som forebyggende behandling af angina pectoris (muskelkramper i hjertet), men er **ikke** egnet til behandling af akut angina pectoris. Hvis du får et akut anfald af angina pectoris, bør du tage en anden mere passende medicin. Du må ikke stoppe med at tage Isosorbidmononitrat Orifarm uden først at have konsulteret din læge.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isosorbidmononitrat Orifarm

Tag ikke Isosorbidmononitrat Orifarm

- hvis du er allergisk over for isosorbidmononitrat, andre nitrater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Isosorbidmononitrat Orifarm (angivet i punkt 6).
- hvis du har alvorlige problemer med blodcirkulationen i hjernen som ved f.eks. et slagtilfælde eller anden hjerneskade.
- hvis du har for lavt blodtryk
- hvis du har en hjertelidelse, som f.eks. sygdom i hjertesækken (perikarditis eller perikardial tamponade).

- hvis du tager sildenafil, der bruges til at behandle impotens.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Isosorbidmononitrat Orifarm.

Vær ekstra forsigtig med at tage Isosorbidmononitrat Orifarm

- hvis du har alvorlig blodmangel
- hvis du har nedsat funktion af skjoldbruskkirtlen (hypothyroidisme)
- hvis du har for højt tryk i kraniet
- hvis du har problemer med blodcirkulationen i hjernen, som ved f.eks. et slagtilfælde eller anden hjerneskade.
- hvis du tidligere har lidt af for lavt blodtryk, shock eller hjerte-kredsløbsproblemer.
- hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
- hvis du er fejlernæret eller ikke er i stand til at regulere din kropstemperatur (hypotermi) eller hvis du får en af disse tilstande under behandlingen
- hvis du har hypoxæmi (lavt iltindhold i blodet, f.eks. på grund af en lungesygdom).

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis et eller flere af punkterne gælder for dig.

Brug af anden medicin sammen med Isosorbidmononitrat Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager følgende medicin, der sænker blodtrykket, og derved forstærker den blodtryksænkende virkning.

- hjertemedicin kaldet betablokkere, som f.eks. sotalol, carvedilol
- vanddrivende medicin (diuretika) som f.eks. furosemid, hydrochlorthiazid
- medicin mod depression (kaldet tricykliske antidepressiva) som f.eks. mirtazapin, trimipramin
- beroligende midler
- sildenafil eller andre phosphodiesterase type-5 hæmmere til behandling af impotens
- alprostadil (prostaglandin), et andet lægemiddel til behandling af impotens
- dihydroergotamin (mod migræne)
- blodtryksænkende lægemidler, da deres effekt kan være kraftigere (herunder karudvidende lægemidler (vasodilatorer), blodtryksænkende medicin (antihypertensiva) og angiotensin II receptor-antagonister)
- aldesleukin til behandling af kræft
- calciumkanalblokkere (medicin til behandling af forskellige tilstande i hjerte og blodkar).

Brug af Isosorbidmononitrat Orifarm sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Isosorbidmononitrat Orifarm med eller uden mad, men alkohol kan øge den blodtryksænkende effekt og gøre dig døsigt. Derfor bør brugen af alkohol undgås.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Hvis du er gravid eller ammer må du kun tage Isosorbidmononitrat Orifarm ifølge aftale med læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel eller svag.

Isosorbidmononitrat Orifarm indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Isosorbidmononitrat Orifarm

Tag altid Isosorbidmononitrat Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering

Voksne

Den sædvanlige startdosis er ½ tablet (30 mg) én gang dagligt i de første 2-4 dage. Tabletten har delekærv og kan deles i to lige store doser. Herefter er den sædvanlige dosis 1 tablet (60 mg) dagligt om morgenen. Hvis nødvendigt, kan dosis øges til 2 tabletter (120 mg) dagligt, taget om morgenen.

Tabletten sluges med ½ glas vand om morgenen.

Tabletten må ikke knuses eller tygges, selvom du kan dele den i to.

Brug til børn

Du må ikke give denne medicin til børn.

Hvis du har taget for mange Isosorbidmononitrat Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Isosorbidmononitrat Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på en overdosis kan være hovedpine, rødmen, koldsved, kvalme, hjertebanken, forvirring, svimmelhed og besvimelse. Hvis du pludselig oplever et af ovenstående symptomer, skal du lægge dig ned med benene opad, da dette kan hjælpe med at mindske symptomerne. Kontakt straks din læge eller tag til nærmeste skadestue. Tag pakningen med, også selvom den er tom.

Hvis du har glemt at tage Isosorbidmononitrat Orifarm

Hvis du har glemt at tage Isosorbidmononitrat Orifarm må du ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis det snart er tid til den næste dosis, skal du blot fortsætte med at tage tabletterne som planlagt.

Hvis du holder op med tage Isosorbidmononitrat Orifarm

Du må ikke stoppe med at tage tabletterne uden først at tale med lægen, da din angina pectoris kan vende tilbage eller forværres.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Isosorbimononitrat Orifarm er opbygget af et uopløseligt skelet, der kommer ud sammen med afføringen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger, der skyldes Isosorbidmononitrat Orifarm, forekommer som oftest i starten af behandlingen.

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter)

- hovedpine

Almindelige (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter)

- svimmelhed
- lavt blodtryk
- hurtig puls

- kvalme.

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter)

- opkastning
- diarré.

Sjældne (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter)

- besvimelse
- hududslæt
- kløe.

Meget sjældne (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter)

- muskelsmerter, ømme eller svage muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myalgi)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Isosorbidmononitrat Orifarm utilgængeligt for børn.

Brug ikke Isosorbidmononitrat Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Isosorbidmononitrat Orifarm indeholder:

- Aktivt stof: isosorbidmononitrat 60 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Cellulose, mikrokrySTALLinsk; kaolin, tungt; magnesiumstearat; silica, kolloid vandfri. Tabletovertrækket indeholder: syntetisk paraffinvoks; hård paraffinvoks; hypromellose; titandioxid (E171); lactosemonohydrat; macrogol; jernoxid, gul (E172), jernoxid, sort (E172), jernoxid, rød (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Isosorbidmononitrat Orifarm er gule, ellipseformede, depottabletter mærket med "IM" delekærv "60" på den ene side og delekærv på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store dele.

Pakningsstørrelser

Isosorbidmononitrat Orifarm fås i blisterpakninger med 7, 14, 28, 30, 60, 98, 100 og 250 depottabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2015