

INDLÆGSSEDDEL

Isaderm® Vet.

Gel til hund

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
7171 Uldum
Danmark

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Genera Inc.
Svetonedeljska cesta 2
Kalinovica
10436 Rakov Potok
Kroatien

Repræsentant:

Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
7171 Uldum
Danmark

Veterinærlægemidlets navn:

Isaderm vet. gel til hund
Fusidinsyre, Betamethason

Angivelse af de aktive stoffer og andre indholdsstoffer:

1 g gel indeholder:

Fusidinsyre 5 mg
Betamethason 1 mg

Methylparahydroxybenzoat, propylparahydroxybenzoat, karbomer, polysorbat 80, dimeticon, natriumhydroxid og rensset vand.

Indikationer:

Produktet anvendes til lokal behandling af overfladisk hudbetændelse hos hunde f.eks. akut fugtig eksem ("hot spots") og betændelse i hudfolder (intertrigo).

Kontraindikationer:

Må ikke anvendes:

- Til dyr som er overfølsomme overfor indholdsstofferne. Stop behandlingen, hvis der udvikles overfølsomhed overfor produktet.
- Til behandling af dyb hudbetændelse, da glykokortikoider er kontraindikeret i dette tilfælde.
- Ved svampeinfektion eller ved Cushing sygdom.

Bivirkninger:

Lokalt påførte steroider kan medføre, at huden bliver tyndere og blodåreskørhed.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirkningssystem.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Dyrearter:

Hund.

Dosering, anvendelsesmåde og indgivelsesvej:

Påsmør en passende mængde gel på det berørte område to gange daglig i minimum 5 dage. Behandlingen skal fortsætte 2 døgn efter ophelingen. Den anbefalede maksimale behandlingsvarighed er 7 dage.

Hvis der ikke ses nogen bedring indenfor 3 dage, eller hvis tilstanden forværres, må diagnosen revurderes.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tilbageholdelsestid:

Ikke relevant.

Eventuelle særlige forholdsregler vedrørende opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP.

Særlige advarsler:

Særlige advarsler for hver dyreart:

Man skal forhindre, at hunden slikker på de behandlede områder og derved indtager produktet.

Hvis der er risiko for at hunden klør eller bider sig i det berørte område, kan det være nødvendigt at anvende krave eller andre forebyggende forholdsregler.

Særlige forsigtighedsregler for dyret:

Betamethason kan blive absorberet via huden og kan give forbigående nedsat binyrefunktion og nedsat foderoptagelse.

Man bør undgå at tildække det behandlede område, at bruge gelen over længere tid eller på større hudområder.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet:

Kortikosteroider kan have uoprettelig virkning på huden; de kan blive absorberet og kan have en skadelig virkning, specielt ved hyppig og udstrakt kontakt eller ved graviditet.

Der skal benyttes handsker ved påsmøring af produktet. Ved utilsigtet kontakt med produktet vaskes det pågældende hud område straks.

Drægtighed:

Må ikke anvendes til drægtige tæver.

Overdosis:

For små hunde mindre end 3 kg bør gel ikke påsmøres på hud arealer større end 2 cm².

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne:

Kontakt din dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

Dato for seneste revision af indlægssedlen: 03-2019

Andre oplysninger:

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.

E1714