

Betnovat® kutanopløsning, 1 mg/ml

0202035904

Betnovat® er et registreret varemærke, som tilhører Schering-Plough Koncernen

Læs denne information godt igennem, før De begynder at bruge medicinen

- Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Betnovat® til Dem personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Betnovat®
3. Sådan skal De bruge Betnovat®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Betnovat® er en klar væske.

Betnovat® kutanopløsning indeholder et stærkt binyrebarkhormon. Betnovat® dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslet, eksem eller psoriasis. De kan bruge Betnovat® kutanopløsning til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Betnovat® kutanopløsning

Brug ikke Betnovat® kutanopløsning hvis:

- De er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Betnovat® kutanopløsning.
- De har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

Brug ikke Betnovat® mod:

- En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
- Betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- Bumser eller på områder med bumser.

- Sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
- Hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Særlige forholdsregler

- Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at Deres læge igen har set på Deres hudsygdom.
- De bør ikke bruge binyrebarkhormon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- De bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
- Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør De tale med Deres læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
- De bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- De bør ikke bruge Betnovat® rundt om øjnene.
- Undgå at få Betnovat® i øjnene.
- Hvis De har brugt Betnovat® i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Betnovat® i længere tid. Fortæl derfor lægen, at De bruger Betnovat® kutanopløsning, hvis De er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Betnovat® kutanopløsning.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De må kun bruge Betnovat® kutanopløsning efter lægens anvisning.

Amning:

De kan bruge Betnovat® i korte perioder, selv om De ammer. Spørg lægen.

De bør ikke bruge Betnovat® kutanopløsning på brystet mens De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Betnovat® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

De kan bruge Betnovat® sammen med anden medicin.

3. Sådan skal De bruge Betnovat® Dosering

Voksne: Påsmør Betnovat® i et tyndt lag 1-3 gange dagligt.

Børn: De må kun bruge Betnovat® til børn efter lægens anvisning.

Undgå at få Betnovat® i øjnene.

Vask hænder efter brug, med mindre det er hænderne der behandles.

Sæt flaskens åbning mod hårbunden og tryk let på flasken.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har De brugt for meget Betnovat® kutanopløsning?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Betnovat® kutanopløsning, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan De få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Har De glemt at bruge Betnovat® kutanopløsning?

Smør et tyndt lag Betnovat® kutanopløsning på, så snart De kommer

i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist.

4. Bivirkninger

Betnovat® kutanopløsning kan som al anden medicin give bivirkninger. Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved brug af lufttæt forbinding.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
- Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 behandlede):

- Brændende fornemmelse, kløe.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 behandlede):

- Tynd hud, der let går i stykker.
- Strækmærker.
- Små punktformede eller større blødninger i huden.
- Betændelsesagtig hudsygdom midt i ansigtet.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter):

- Hvide eller mørke pletter på huden (nedsat eller øget pigmentering).
- Uønsket hårvækst.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Forværring af hudsygdommen ved ophør af behandlingen.
- Udvidelse af de små blodkar i huden.
- Overfølsomhed.
- Allergisk kontakteksem.

Hyppighed er ikke kendt:

- Ny betændelse kan opstå i hud, der er behandlet med Betnovat®.
- Forværring af betændelse i huden, sløring af betændelse i hud.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

Opbevar Betnovat® utilgængeligt for børn. Brug ikke Betnovat® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Betnovat® indeholder:

Det virksomme indholdsstof i Betnovat® er betamethason 1 mg/ml som betamethasonvalerat
De øvrige indholdsstoffer er: carbomer, isopropylalkohol, natriumhydroxid og rensset vand.

Pakningsstørrelser:

Betnovat® findes i pakningsstørrelsen 2 x 50 ml.

Markedsføring i Danmark:

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup.

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup.

Revideret 11/2006