

Indlægsseddel: Information til brugeren

Adapalen Orifarm 1 mg/g gel

Adapalen

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Adapalen Orifarm
3. Sådan skal du bruge Adapalen Orifarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Adapalen Orifarm anvendes til behandling af bumser (acne vulgaris) med betændelse og mange hudorme.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Adapalen Orifarm

Brug ikke Adapalen Orifarm:

- Hvis du er allergisk over for adapalen eller et af de øvrige indholdsstoffer i Adapalen Orifarm (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Adapalen Orifarm hvis:

- du er gravid eller planlægger at blive det.
- du bliver overfølsom over for Adapalen Orifarm.
- din hud bliver irriteret.
- du opholder dig meget i solen.
- din hud er særlig følsom over for sollys.
- hvis din akne er meget udbredt.

NB! Hvis din hud viser reaktion, som tyder på følsomhed eller alvorlig irritation skal du omgående afbryde behandlingen og tale med din læge.

Vær opmærksom på:

- at Adapalen Orifarm ikke må komme i øjne, mund, næsebor eller slimhinder. Hvis Adapalen Orifarm kommer i øjnene, skal du omgående skylle øjnene med lunkent vand.

- at du ikke må bruge Adapalen Orifarm på beskadiget hud (sår og hudafskrabninger), solskoldet hud eller på hudområder med eksem.
- at du skal udsætte dig for mindst muligt sollys og solarium, når du bruger Adapalen Orifarm. Brug beskyttende påklædning og solcreme med høj beskyttelsesfaktor på de hudområder, der ikke kan undgå at blive udsat for sollys.

Brug af anden medicin sammen med Adapalen Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med lægen, hvis du tager:

- Anden medicin til behandling af akne (f.eks. erythromycin, clindamycin, benzoylperoxid eller andre retinoider). Du kan bruge andre aknemidler til udvortes brug om morgenen og Adapalen Orifarm om aftenen. Dette gælder dog ikke for anden medicin af retinoid typen.

Adapalen Orifarm kan virke mildt lokalirriterende. Det er derfor muligt, at samtidig brug af rensecrerner med slibekorn og lignende, peelingmidler, midler som virker opstrammende på huden eller andre hudprodukter kan medføre hudirritationer.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Adapalen Orifarm bør ikke anvendes under graviditet.

Hvis du bliver gravid, mens du bruger Adapalen Orifarm, skal du stoppe behandlingen og fortælle det til din læge så hurtigt som muligt, så der kan ske en opfølgning på behandlingen.

Amning

Du kan amme, selv om du bruger Adapalen Orifarm. For at undgå at barnet kommer i kontakt med lægemidlet, bør Adapalen Orifarm ikke bruges på brystet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Adapalen Orifarm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Adapalen Orifarm indeholder Methylparahydroxybenzoat (E218) og propylenglycol

- Methylparahydroxybenzoat (E218) kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
- Propylenglycol kan give irritation af huden.

3. Sådan skal du bruge Adapalen Orifarm

Brug altid Adapalen Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Smør Adapalen Orifarm i et tyndt lag på den angrebne hud 1 gang dagligt ved sengetid.

Brug til børn og unge:

Adapalen Orifarm er kun beregnet til behandling af voksne og unge over 12 år.

Brugsanvisning:

- Vask huden før du bruger Adapalen Orifarm.
- Huden skal være tør, før du smører Adapalen Orifarm på.

- Smør Adapalen Orifarm på i et tyndt lag.
- Undgå at få Adapalen Orifarm i øjne, mund, næsebor og slimhinder.
- Adapalen Orifarm er udelukkende beregnet til brug på huden. Du må ikke indtage Adapalen Orifarm.

Hvis du har brugt for meget Adapalen Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Adapalen Orifarm end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Du vil ikke opnå et hurtigere eller bedre resultat, hvis du bruger for meget Adapalen Orifarm. I stedet kan du få symptomer på en overdosering i form af udtalt rødme, afskalning og ubehag.

Hvis du har glemt at bruge Adapalen Orifarm

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Adapalen Orifarm

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Adapalen Orifarm kan give følgende bivirkninger ved påføringsstedet:

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter)

- tør hud
- hudirritation
- brændende fornemmelse i huden
- rødmen af huden (erytem)

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter)

- lokal hududslæt (kontaktdermatitis)
- hudgener
- solskoldning
- kløe i huden
- afskalning af huden
- opblussen af akne

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- smerte eller opsvulmen af huden
- irritation, rødme, kløe eller hævelse af øjenlåg

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Adapalen Orifarm utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 25 °C.

Må ikke opbevares i køleskabet eller fryses.

Brug ikke Adapalen Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Adapalen Orifarm indeholder:

- Aktivt stof: adapalen.
- Øvrige indholdsstoffer: carbomer; propylenglycol; poloxamer 182; dinatriumedetat; methylparahydroxybenzoat (E218); phenoxyethanol; natriumhydroxid; rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Adapalen Orifarm er en glat, hvid og ensartet gel.

Pakningsstørrelser: 60 g

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S.
Danmark
info@orifarm.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret november 2014.