

# Metoprololsuccinat 2care4 100 mg, depottabletter

## Metoprololsuccinat

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

### Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololsuccinat 2care4
3. Sådan skal du tage Metoprololsuccinat 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

### 1. Virkning og anvendelse

Metoprololsuccinat 2care4 tilhører en lægemiddelgruppe, der kaldes beta-blokkere. Disse lægemidler virker ved at udvide blodkarrene og nedsætte pulsen. Metoprololsuccinat 2care4 anvendes til voksne ved:

- Forhøjet blodtryk.
- Hjertekramper (angina pectoris).
- Uregelmæssige hjerteslag (arytmier).
- Forebyggelse efter en blodprop i hjertet.
- Hjertebanken ved hjertelidelser.
- Forebyggelse af migræne.
- Nedsat hjertefunktion.

Metoprololsuccinat 2care4 anvendes til børn og unge (6-18 år) ved:

- Forhøjet blodtryk.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

### 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Metoprololsuccinat 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

#### Tag ikke Metoprololsuccinat 2care4 hvis du

- er overfølsom over for metoprololsuccinat, andre beta-blokkere eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metoprololsuccinat 2care4 (angivet i afsnit 6).
- har forstyrrelser i hjertets ledningssystem eller hjerteblok.
- har nedsat hjertefunktion som ikke er under kontrol.
- har meget dårlig blodcirkulation.
- har en meget lav puls (mindre end 50 slag/min.).
- har et meget lavt blodtryk (systolisk under 90 mm Hg).
- har metabolisk acidose (en ubalance i det normale syre-base forhold i kroppen).
- er i behandling med MAO-hæmmere (mod depression).
- har svær astma eller KOL (rygerlunger).
- samtidig får verapamil, diltiazem og disopyramid givet som injektion.
- har ubehandlet fæokromocytom (godartet svulst i binyren, som forårsager forhøjet blodtryk).

#### Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Metoprololsuccinat 2care4 hvis du

- har astma. Muligvis er det nødvendigt at justere dosis af astmamedicinen.

- har diabetes, da Metoprololsuccinat 2care4 kan maskere symptomer på hypoglykæmi (nedsat mængde sukker i blodet).
- har psoriasis.
- har thyreotoksikose (overaktivitet i skjoldbrusk-kirtlen).
- har fæokromocytom (godartet svulst i binyren, som forårsager forhøjet blodtryk).
- skal opereres. Informer narkoselægen om behandlingen med Metoprololsuccinat 2care4. Det anbefales dog ikke at stoppe behandlingen med Metoprololsuccinat 2care4 før operation.
- har "hvide fingre og tæer" (Raynaud's syndrom).
- har smerter i benene på grund af åreforkalkning (claudicatio intermittens).
- har problemer med dit hjerte (såsom langsoms hjerterefrekvens) eller dit kredsløb (sådanne problemer kan forværres, hvis du tager Metoprololsuccinat 2care4).
- har en alvorlig lever- eller nyresygdom.
- nogensinde har fået en svær overfølsomhedsreaktion.
- har en sjælden form for angina, der hedder Prinzmetals angina.
- har hjertesvigt og samtidig:
  - har haft et hjerteanfald eller et anfald af brystsmerter (angina) inden for de seneste 28 dage.
  - har nedsat nyre- eller leverfunktion.
  - er under 40 år eller over 80 år.
  - har en sygdom i hjerteklapperne.
  - har forstørret hjertemuskel.
  - har fået en hjerteoperation inden for de seneste 4 måneder.
  - har ustabil hjertesvigt (NYHA-klasse IV).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Metoprololsuccinat 2care4. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Ligesom andre betablokkere kan metoprololsuccinat også øge både følsomheden over for allergener (allergifremkaldende stof) og sværhedsgraden af allergiske reaktioner.

#### Brug af anden medicin sammen med Metoprololsuccinat 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Tal med din læge, hvis du tager

- cimetidin (mod mavesår).
- reserpin, hydralazin, guanfacin, glyceroltrinitat, diuretika, vasodilatorer, alfa-methyldopa eller anden medicin der er blodtryks-sænkende.
- terbinafin (mod svampeinfektion).
- paroxetin, fluoxetin og sertraline (mod depression).
- hydroxychlorokin (mod malaria).
- chlorpromazin, triflupromazin, chlorprothixen (antipsykotiske midler).
- amiodaron, quinidin, propafenon, hjerteglykosider, samt antiarytmika givet som intravenøs injektion (mod uregelmæssige hjerteslag).
- difenhydramin (antihistamin).
- celecoxib, lidocain og indometacin (f.eks. mod smerter).

- rifampicin (antibiotika).
- insulin og anden medicin mod diabetes.
- MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva, barbiturater og phenothiazider (mod depression).
- verapamil, nifedipin, og diltiazem (calcium-blokkere, hjertemedicin).
- andre beta-blokkere f.eks. øjendråber.
- anæstetika (bedøvelsesmidler ved operationer).
- clonidin (mod migræne).
- adrenalin, noradrenalin og anden nervemedicin.
- narkotika.
- succinylcholin halid, tubocurarin (muskelafslappende).

#### Brug af Metoprololsuccinat 2care4 sammen med mad, drikke og alkohol

Alkohol kan forstærke virkningen af Metoprololsuccinat 2care4.

Du skal tage Metoprololsuccinat 2care4 med et glas vand.

#### Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

#### Graviditet

Du må kun tage Metoprololsuccinat 2care4 efter lægens anvisning.

#### Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Metoprololsuccinat 2care4, da metoprololsuccinat går over i modermælken. Tal med lægen.

#### Trafik- og arbejdssikkerhed

Metoprololsuccinat 2care4 kan give bivirkninger som svimmelhed og træthed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig.

### 3. Sådan skal du tage Metoprololsuccinat 2care4

Tag altid Metoprololsuccinat 2care4 nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Metoprololsuccinat 2care4 bør indtages én gang dagligt, helst om morgenen. Tabletten skal sluges hel eller delt uden at den tygges eller knuses. Drik et glas vand sammen med medicinen.

#### Den sædvanlige dosis er

##### Voksne

*Forhøjet blodtryk:* 50 mg én gang daglig. Ved behov kan dosis øges til 100-200 mg én gang daglig.

*Hjertekramper (angina pectoris):* 100-200 mg én gang daglig.

*Uregelmæssige hjerteslag (arytmier):* 100-200 mg én gang daglig.

*Forebyggelse efter en blodprop i hjertet:* 200 mg én gang daglig.

*Hjertebanken ved hjertelidelser:* 100 mg én gang daglig. Ved behov kan dosis øges til 200 mg én gang daglig.

*Forebyggelse af migræne:* 100-200 mg én gang daglig.

*Nedsat hjertefunktion:* Følg lægens anvisninger.

#### Børn og unge 6-18 år

Forhøjet blodtryk: 0,50 mg/kg legemsvægt én gang daglig. Kan øges efter aftale med lægen til højst 2,0 mg/kg legemsvægt én gang dagligt.

#### Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis hos ældre over 80 år. Følg lægens anvisninger.

#### Børn under 6 år

Børn under 6 år må normalt ikke få Metoprololsuccinat 2care4.

#### Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

#### Alvorlig nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

#### Hvis du har taget for mange Metoprololsuccinat 2care4 depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Metoprololsuccinat 2care4, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er lavt blodtryk (træthed og svimmelhed), langsom puls, uregelmæssig hjerterytme, hjertestop, åndedrætsbesvær, dyb bevidstløshed, kvalme, opkastning og blåfarvning af huden.

#### Hvis du har glemt at tage Metoprololsuccinat 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet/dosis.

#### Hvis du holder op med at tage Metoprololsuccinat 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget, du er i tvivl om.

## 4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

#### Alvorlige bivirkninger

**Ikke almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Kortåndethed / Vejtrækningsbesvær / Astma-lignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

**Sjældne bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Krumning af penis ved rejsning (forsvinder ikke, efter at du er stoppet med behandling). Kontakt lægen.

**Meget sjældne bivirkninger:** Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Hvide, "døde" fingre og tæer. Kontakt lægen.
- Vævsdød hos patienter med svære kredsløbsforstyrrelser.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

#### Ikke alvorlige bivirkninger

**Meget almindelige bivirkninger:** Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

- Udtalt fald i blodtryk og svimmelhed, evt. besvimelse ved skift fra liggende til siddende eller fra siddende til stående stilling pga. lavt blodtryk.
- Træthed.

**Almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Svimmelhed.
- Hovedpine.
- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Problemer med at holde balancen, svimmelhed samt meget sjældent besvimelse – ved normal puls og vejtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
- Hjertebanken.
- Kolde hænder og fødder.
- Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Kvalme, mavesmerter, diarré og forstoppelse.

**Ikke almindelige bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

- Vægtøgning.
- Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Opkastning.
- Koncentrationsbesvær.
- Døsighed.
- Søvnløshed.
- Mareridt.
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.
- Midlertidig forværring af symptomerne på hjertesvigt, hvor kun overledningstiden er forlænget (AV-blok af første grad), smerter i hjerteregionen.
- Hududslæt (psoriasislignende nældefeber og dystrofiske hudlæsioner).
- Øget svedproduktion.
- Muskelkramper.
- Vand i kroppen. Kontakt lægen.

**Sjældne bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Øget tørst, træthed og vandladning pga. sukker-syge. Øget sukker (glukose) i blodet (både hos diabetikere og ikke-diabetikere).
- Nervøsitet, angst.
- Synsforstyrrelser, tørre eller irriterede øjne.
- Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
- Uregelmæssig hjerterytme, forstyrrelser i hjertets ledningssystem.
- Uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Metoprololsuccinat 2care4 i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mund-hygge, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.
- Snue.
- Hårtab.
- Impotens (rejsningsbesvær) og andre seksuelle forstyrrelser.

**Meget sjældne bivirkninger:** Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
- Smagsforstyrrelser.
- Glemsomhed eller hukommelsessvækkelse.
- Forvirring.
- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.

- Personlighedsændringer (f.eks. humørsvingninger).
- Susen for ørerne (tinnitus), høreforstyrrelser.
- Forværring af vindueskiggersyndrom (gangstermer som forsvinder ved hvile).
- Lette overfølsomhedsreaktioner, forværring af psoriasis, nyt udbrud af psoriasis, psoriasis-lignende hudforandringer.
- Smerter i leddene, muskelsvaghed.

Metoprololsuccinat 2care4 kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

#### Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen  
Axel Heides Gade 1  
DK-2300 København S.  
Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)  
E-mail: [sst@sst.dk](mailto:sst@sst.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## 5. Opbevaring

Opbevar Metoprololsuccinat 2care4 utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Metoprololsuccinat 2care4 ved temperaturer over 30 °C.

Tag ikke Metoprololsuccinat 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Anv. før) er den sidste dag i den foregående måned. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

## 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

#### Metoprololsuccinat 2care4 indeholder:

Aktivt stof: 95 mg metoprololsuccinat svarende til 100 mg metoprololtartrat.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletterne: Mikrokrystallinsk cellulose, methylcellulose, majsstivelse, glycerol, ethylcellulose, magnesiumstearat.

Tabletovertræk: Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, stearinsyre, titandioxid (E171).

#### Udseende og pakningsstørrelse

##### Udseende

Metoprololsuccinat 2care4 100 mg er en hvid, aflang depottablet med delekærv på begge sider.

#### Pakningsstørrelse

Metoprololsuccinat 2care4 100 mg depottabletter fås i en pakningsstørrelse á 100 depottabletter.

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4  
Tømrervej 9  
6710 Esbjerg V.

#### Ompakket og frigivet af

2care4  
Tømrervej 9  
6710 Esbjerg V.

Metoprololsuccinat 2care4 svarer til Mertolok.

**Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2014**