



Indlægsseddel: Information til brugeren

Bisolvon® 8 mg tabletter

bromhexinhydrochlorid

1939045909

Bisolvon® er et registreret varemærke, som tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co KG.

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer

- De kan få Bisolvon® uden recept. For at opnå den bedste behandling, skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Bisolvon®.
- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Bisolvon®
3. Sådan skal De bruge Bisolvon®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Bisolvon® er et slimløsnende middel, der bruges ved hoste med sejt slim.

Bisolvon® bruges desuden ved Sjögrens syndrom (en sygdom med tørre slimhinder i mund, svælg og øjne).

Hvis Deres læge har sagt, at De skal tage Bisolvon® for noget andet, skal De altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE BISOLVON®

Brug ikke Bisolvon® hvis De:

- er overfølsom overfor bromhexin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Bisolvon®.
- for nylig har hostet blod op.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Bisolvon®

- Tal med lægen, inden De tager Bisolvon® hvis De har mavesår eller sår på tolvfingertarmen.
- I meget få tilfælde er der forekommet alvorlige hudreaktioner i forbindelse med anvendelse af slimløsnende medicin som Bisolvon®. Hvis De oplever udslæt i hud eller slimhinder, blæreformet udslæt og betændelse, eller kraftig afskalning eller afstødning af huden, skal De straks stoppe med at tage Bisolvon® og kontakte lægen.
- De skal være opmærksom på, at De kan få en større produktion af slim ved behandling med Bisolvon®.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med Deres læge, hvis De tager medicin mod

- betændelse (infektion) (erythromycin, amoxicillin, oxytetracyclin)

Brug af Bisolvon® sammen med mad og drikke
De kan tage Bisolvon® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis De er gravid må De kun anvende Bisolvon® efter aftale med lægen.

Amning:

Hvis De ammer, må De ikke bruge Bisolvon®, da Bisolvon® går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Bisolvon® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Bisolvon®

Bisolvon® indeholder lactose. Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE BISOLVON®

Hvis Deres læge har ordineret Bisolvon® til Dem, skal De altid følge lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosering er

Hoste

Voksne og børn over 10 år: 1–2 tabletter

(8–16 mg) 3 gange daglig.

Børn 6 – 10 år: ½–1 tablet (4–8 mg) 3 gange daglig.

Sjögrens syndrom

Op til 4 tabletter (32 mg) 3 gange daglig.

De må kun anvende Bisolvon® til børn under 6 år efter aftale med en læge.

Nedsat nyrefunktion: Dosis skal nedsættes. Følg lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion: Dosis skal nedsættes ved alvorlig nedsat leverfunktion. Følg lægens anvisning.

Hvis De har taget for mange Bisolvon® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Bisolvon®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme og opkastning.

Hvis De har glemt at tage Bisolvon®

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis De har glemt at tage en dosis Bisolvon®. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Bisolvon® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

- Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald eller åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Milde mave-tarm gener.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Diarre, kvalme, opkastning.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Allergiske reaktioner.
- Hududslæt.
- Nældefeber
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelser af ansigt, læber og tunge kan det være livsfarligt. Ring 112.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

- Opbevar Bisolvon® utilgængeligt for børn.
- De kan opbevare Bisolvon® ved almindelig temperatur.
- Anvend ikke Bisolvon® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Bisolvon® tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Bromhexin som bromhexinhydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: Lactose, majsstivelse og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Bisolvon® 8 mg er en rund, hvid tablet, mærket 51B på den ene side og med logo på den anden. Bisolvon® 8 mg tabletter findes i pakningsstørrelsen 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel er senest revideret august 2012