

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kinin DAK 100 mg filmovertrukne tabletter

Quininhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Kinin DAK uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Kinin DAK.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kinin DAK
3. Sådan skal du tage Kinin DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kinin DAK bruges til behandling af natlige lægkramper og virker ved at dæmpe muskelaktiviteten.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Kinin DAK for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kinin DAK

Tag ikke Kinin DAK hvis du:

- er overfølsom over for quinin, quinidin eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
- har en arvelig blodsygdom (glucose-6-phosphat dehydrogenase mangel (G6PD))
- har en alvorlig muskelsygdom (myasthenia gravis)

Vær ekstra forsigtig med at tage Kinin DAK

Tal med lægen inden du tager Kinin DAK, hvis du har:

- astma
- uregelmæssig hjerterytme eller forstyrrelse i hjertets elektriske impulser
- blodmangel med hæmoglobin i urinen, som medfører mørkfarvning af urinen (black water fever)
- betændelse i synsnerven
- øresusen (tinnitus)
- for lavt blodsukker

Brug af anden medicin

Anden medicin kan ændre virkningen af Kinin DAK, eller Kinin DAK kan ændre virkningen af anden medicin. Tal derfor med din læge, hvis du tager:

- medicin mod psykiske lidelser eller ufrivillige bevægelser (pimozid, droperidol)
- medicin mod malaria (mefloquin, chloroquin)
- medicin mod tuberkulose (rifampicin)
- medicin mod HIV-virus (ritonavir, saquinavir)
- medicin mod for meget mavesyre (der indeholder aluminium)
- medicin mod mavesår (cimetidin)
- hjertemedicin (digoxin, flecainid, amiodaron)
- blodfortyndende medicin (warfarin)
- medicin, der undertrykker immunforsvaret (ciclosporin)
- medicin mod gigt (guldforbindelser)
- kapsler med vaccine mod tyfus

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Kinin DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Kinin DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Hvis du er gravid, må du kun tage Kinin DAK efter aftale med lægen.

Når du ammer, må du gerne tage Kinin DAK. Kinin DAK går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kinin DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Kinin DAK

Hvis din læge har ordineret Kinin DAK til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletten med rigelig væske. Du kan eventuelt knuse den.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1 – 2 tabletter ved sengetid.

Ældre: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Tal med lægen.

Børn: Du må kun bruge Kinin DAK til børn under 15 år efter lægens anvisning.

Hvis lægkramperne udebliver i flere sammenhængende nætter, bør behandlingen stoppes, så effekten kan vurderes.

Hvis du har taget for mange Kinin DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Kinin DAK, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er hovedpine, døvhed, øresusen, svimmelhed, synssvækkelse, kvalme, opkastning, diaré, mavesmerter, hurtig puls, manglende koordinering af bevægelser, prikkende fornemmelse, nyrepåvirkning, nedsat vandladning, forstyrrelser i hjerterytmen, forstyrrelser i hjernefunktionen, for lavt blodtryk, besvimelse, åndedrætsophør, koma, hjertestop.

Hvis du har glemt at tage Kinin DAK

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Kinin DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Ekstremt lavt sukkerindhold i blodet (alvorlig), blindhed (alvorlig), påvirkning af hørelsen (alvorlig), påvirkning af vejtrækningen (alvorlig), kvalme, opkastning, synkebesvær, mavesmerter, diaré, synsforstyrrelser, uklarhed, forvirring, desorientering, ophidselse.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 -10 ud af 10.000 behandlede):

Ekstremt lavt indhold af hvide blodlegemer (alvorlig), blodmangel (alvorlig), påvirkning af hjerterytmen (alvorlig), nyrepåvirkning (alvorlig), leverpåvirkning (alvorlig), åndedrætsbesvær (alvorlig), forværring af astmasymptomer (alvorlig), astma, ekstrem træthed, feber, svimmelhed, besvimelse, rastløshed, forvirring, hovedpine, lysfølsomhed, allergisk hudreaktion, udslæt, rødmen, kløe, betændelse i blodkar, øget svedtendens, væskeophobninger i ansigtet.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Hudreaktion med kraftig afskalning og afstødning af huden (alvorlig).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Vedvarende høreskader (alvorlig). For højt sukkerindhold i blodet, for højt insulinindhold i blodet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Kinin DAK utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Kinin DAK ved almindelig temperatur.

Brug ikke Kinin DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Kinin DAK 100 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Det aktive stof i Kinin DAK er quininhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er gelatine, glycerol 85% (E 422), hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, koncentreret saltsyre (E 507), magnesiumstearat (E 470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520), talcum (E 553b).

Farvestof: Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Kinin DAK er en hvid, filmovertrukken tablet uden delekærv.

Kinin DAK findes i pakningsstørrelser à 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret januar 2009.