

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Thiamazol Copharma 5 mg tabletter

Thiamazol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
 - Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
 - Lægen har ordineret Thiamazol Copharma til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
 - Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
- Se nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Thiamazol Copharma
3. Sådan skal du tage Thiamazol Copharma
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Thiamazol Copharma hæmmer dannelsen af stofskiftehormon i skjoldbruskkirtlen. Du kan bruge Thiamazol Copharma mod forhøjet stofskifte. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Thiamazol Copharma**Tag ikke Thiamazol Copharma**

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for thiamazol, carbimazol, propylthiouracil eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
- hvis du har moderate til svære forstyrrelser i antallet af blodlegemer (for få hvide blodlegemer).
- hvis du allerede har eksisterende kolestatisk sygdom, som ikke er forårsaget af hyperthyroidisme.
- hvis du tidligere har haft beskadigelse af knoglemarven efter behandling med thiamazol eller carbimazol.
- hvis du er gravid og i behandling med thyroideahormoner (f.eks. levothyroxin)

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal stoppe behandlingen og kontakte din læge, hvis

- du får ømhed i halsen, sår i munden, feber eller andre symptomer på infektion.
- du får gulsot, feber, udslæt, kvalme og opkastninger.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Thiamazol Copharma:

- hvis du har en leversygdom
- hvis du har forstørret skjoldbruskkirtel (struma), og den vokser under behandlingen med Thiamazol Copharma, så den giver luftrørsforsnævring.
- hvis du er gravid eller ammer.
- hvis du får almen sløvhed, tendens til betændelser (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Når det forhøjet stofskifte normaliseres kan det medføre en vægtøgning under behandlingen

med Thiamazol. Det tyder på en normalisering af dit stofskifte.

Brug af anden medicin sammen med Thiamazol Copharma

Fortæl altid lægen eller på apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med jod eller har været det i de seneste år.

Du skal være opmærksom på at din sygdom kan påvirke virkningen af andre lægemidler, samt at doseringen af andre lægemidler måske skal ændres når funktionen af skjoldbruskkirtlen normaliseres.

Brug af Thiamazol Copharma sammen med mad og drikke

Du kan tage Thiamazol Copharma i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Thiamazol Copharma.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Thiamazol Copharma.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Thiamazol Copharma påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Thiamazol Copharma

Tag altid Thiamazol Copharma nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du skal tage tabletterne med et glas vand.

Den sædvanlige dosis er:**Voksne****Svære tilfælde:**

Begyndelsesdosis: 6 til 12 tabletter (3060 mg) daglig fordelt på flere doser. Følg lægens anvisning.

Lette tilfælde:

Begyndelsesdosis: 4 tabletter (20 mg) daglig. Følg lægens anvisning.

Vedligeholdelsesdosis: 1 til 2 tabletter (510 mg) daglig.

Hvis du har forstørret skjoldbruskkirtel, eller du

har været i behandling med jod, kan lægen i begyndelsen af behandlingen ordinere meget store doser (f.eks. 24 tabletter (120 mg)).

Brug til børn og unge

Børn og unge (3-17 år)

Dosis afhænger af barnets vægt. Lægen kan fortælle dig, hvad dosis er, og hvor længe behandlingen varer.

Børn på 2 år og derunder:

Børn på 2 år og derunder må kun få Thiamazol Copharma efter lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Thiamazol Copharma tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Thiamazol Copharma, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber, evt. mathed, koldsved, sult, forvirring, bevidstløshed pga. lavt blodglukose og påvirkning af leverens funktion. Ved længere tids overdosering kan du få struma og for lavt stofskifte.

Hvis du har glemt at tage Thiamazol Copharma

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Thiamazol Copharma

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Thiamazol Copharma kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter.

- Allergiske reaktioner med udslæt, nældefeber, smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse.
- Tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. nedsat antal hvide blodlegemer (granulocytopeni).
- Smerter, varme og hævelse i et eller flere led pga. betændelse.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Forstørret skjoldbruskkirtel. Kontakt lægen.
- Feber.
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge.
- Smerter i leddene (især i tommelfingerens grundled).

Ikke almindelige bivirkninger: *Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.*

- Gulst, ofte med hudkløe. Kontakt lægen.
- Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kontakt læge eller skadestue.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
- Smagsforstyrrelser, som kan aftage efter behandlingsophør. Tilbagevenden til normal kan dog tage flere uger.
- Svimmelhed.
- Kvalme eller opkastning, mavesmerter.
- Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulst. Kan være alvorligt. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger: *Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.*

- Svær leversygdom: Søg læge eller skadestue straks.
- Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led og muskelsmerter pga. bindevævssygdom. Kontakt lægen.
- Smerter over lænden, feber, skummende eller blodig urin pga. nyrebetændelse. Kontakt læge eller skadestue.
- Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt. andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.
- Betændelse i en spytkirtel.
- Feber pga. overfølsomhed mod thiamazol

Meget sjældne bivirkninger: *Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter*

- Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Føleforstyrrelser og lammelser fortrinsvis i arme og ben, men vejrtrækningen kan også rammes. Kontakt læge eller skadestue. Hvis du får åndenød, ring 112.
- Smerter og føleforstyrrelser pga. nervebetændelse.
- Mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper pga. lavt blodsukker (autoimmunt insulinsyndrom). Kan være eller bliver alvorligt. Tal med lægen.
- Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Svære former for allergiske hudreaktioner (systemisk lupus erythematosus lignende reaktion), eksem or irritation, hårtab.
- Muskelsmerter.
- Hævede lymfekirtler
- Gulst pga. blokeret galde flow i leveren. Leverbetændelse som reaktion på lægemidlet der forsvinder som regel efter seponering af lægemidlet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar Thiamazol Copharma i ydre karton.

Tag ikke Thiamazol Copharma efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Thiamazol Copharma 5 mg tabletter indeholder: Aktivt stof: Thiamazol 5 mg. Øvrige indholdsstoffer: Mannitol, mikrokrySTALLinsk cellulose, majsstivelse, magnesiumstearat, natriumstivelsesglycolat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvid til gullig, rund, let hvælvet tablet mærket "T5" og med delekærv på den ene side.

Pakningsstørrelser

Thiamazol Copharma fås i pakningsstørrelser á 50 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af

Copharma ApS
Kanalholmen 14-18
DK-2650 Hvidovre

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2015