

Indlægsseddel: Information til brugeren

Salina DAK, oral opløsning

ekstrakt af lakridsrod

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger

- Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af en uge.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Salina DAK
3. Sådan skal du tage Salina DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Salina DAK (herefter kaldet Salina) er et naturlægemiddel, der virker slimløsnende ved hoste i kortere perioder.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Salina DAK

Tag ikke Salina, hvis:

- du er allergisk over for lakrids eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)
- du har lavt kaliumindhold i blodet, f.eks. hvis du tager vanddrivende medicin eller bruger afføringsmiddel
- du har forhøjet blodtryk
- du har nedsat hjertefunktion
- du har svært nedsat nyrefunktion
- du har skrumpelever

Advarsler og forsigtighedsregler

Salina bør ikke anvendes i mere end 4 - 6 uger.

Salina DAK skal tages med forsigtighed, hvis dit hjerte slår uregelmæssigt (arytmier).

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Salina, da det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Salina

Fortæl lægen, hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder:

- vanddrivende medicin
- hjertemedicin (digoxin)
- medicin mod infektion (metronidazol)
- binyrebarkhormoner
- medicin til alkoholafvænning (Antabus®)

Brug af Salina sammen med mad og drikke

Du kan tage Salina uafhængigt af måltiderne.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Da Salina indeholder alkohol, må du kun bruge Salina efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Salina påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Salina indeholder alkohol

Dette lægemiddel indeholder 1,1 vol% alkohol, dvs. op til 135 mg alkohol pr. dosis svarende til 3,3 ml øl eller 1,4 ml vin pr. dosis.

Skadelig for alkoholikere.

Anvend kun dette lægemiddel til børn, gravide og ammende kvinder og patienter i højrisikogruppe såsom patienter med epilepsi og leversygdomme efter aftale med lægen.

Salina indeholder methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216)

Dette kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. Sådan skal du tage Salina DAK

Tag altid lægemidlet nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 15 ml, 3 – 4 gange daglig. Brug vedlagte målebæger til at afmåle medicinen med.

Kontakt lægen, hvis der ikke ses bedring inden for en uge.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Børn: Der er ingen børnedosering, idet erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig. Du må kun bruge Salina til børn under 15 år efter aftale med en læge.

For at undgå forstyrrelser i saltbalancen, væskeophobning i kroppen og blodtryksforhøjelse bør du ikke anvende Salina i mere end 4 – 6 uger.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for meget Salina?

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du har taget mere Salina, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag flasken med.

Tegn på overdosering kan være forhøjet blodtryk, forstyrrelser i saltbalancen (kan f.eks. vise sig ved væskeophobning i kroppen), hovedpine, muskelsvaghed, træthed, uregelmæssig hjerterytme, hjertesvigt.

Hvis du har glemt at tage Salina?

Hvis du har glemt en dosis Salina, tag den da så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, springes den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Salina kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Søg omgående læge eller ring 112 ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

Allergiske reaktioner.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer):

Alvorlige allergiske reaktioner, forhøjet blodtryk, forstyrrelse i væske-/saltbalancen, forstyrrelse i hjerterytmen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Salina utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Afløber altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

Salina DAK, oral opløsning indeholder

- Aktivt stof: 1 ml indeholder 98,5 mg vandig ekstrakt af lakridsrod (3:1) svarende til 4,64 mg glycyrrhizinsyre.
- Øvrige indholdsstoffer: Ethanol 96%, koncentreret ammoniakopløsning, polysorbat 80 og rensed vand.
Smagsstoffer: Ammoniumchlorid og pebermynteolie.
Konservering: Methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216).

Udseende og pakningsstørrelser

Salina DAK er en klar/næsten klar, sortbrun væske.

Produktet findes i pakningsstørrelser à 200 ml, 300 ml og 500 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Takeda Pharma A/S
Delta Park 45
2665 Vallensbæk Strand

Fremstiller

Takeda Pharma Sp. z o.o.
12 Księstwa Łowickiego ST.
99-420 Łyszkowice
Polen

eller

Takeda Nycomed AS
Solbærvegen 5
2409 Elverum
Norge

Denne indlægsseddel blev sidst ændret maj 2020