

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kloramfenikol DAK 5 mg/ml øjendråber, opløsning

Chloramphenicol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Kloramfenikol DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol DAK
3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kloramfenikol DAK øjendråber er et bakteriehæmmende lægemiddel (antibiotikum) til behandling af øjenbetændelse.

Lægen kan have givet dig Kloramfenikol DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol DAK

Brug ikke Kloramfenikol DAK hvis du er overfølsom over for chloramphenicol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Kloramfenikol DAK

Tal med lægen, inden du bruger Kloramfenikol DAK, hvis du har en knoglemarvssygdom, eller nogen i din familie har eller har haft alvorlige blodsygdomme.

Vær opmærksom på, at du:

- ikke må bruge Kloramfenikol DAK sammen med kontaktlinser
- ikke bør bruge Kloramfenikol DAK længere end 2 uger, da der ellers er risiko for udvikling af bivirkninger og resistens (medicinen virker ikke)

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Kloramfenikol DAK, eller Kloramfenikol DAK kan påvirke virkningen af anden medicin. Tal derfor med din læge, hvis du tager anden medicin mod infektion (penicillin, cefalosporiner, gentamicin, tetracyclin, polymyxin B).

Hvis du bruger anden medicin i øjnene, skal du vente ca. 5 minutter, efter du har brugt Kloramfenikol DAK, før du bruger den næste medicin.

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Kloramfenikol DAK under graviditet.

Amning

Du må gerne bruge Kloramfenikol DAK, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kloramfenikol DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol DAK

Brug altid Kloramfenikol DAK efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brugsanvisning

Bryd flaskens forsegling ved at skrue låget helt til. Herved dannes et lille hul i flaskens spids. Skru låget af. Flasken er nu klar til brug.

Træk ned i nederste øjenlåg, dryp en øjendråbe i lommen mellem øje og øjenlåg. Undgå at beholderens spids kommer i berøring med huden eller øjet. Skru låget på efter brug. Øjendråberne løber med tårevæsken ned i svælget og kan til tider afgive smag i mund/svælg.

Voksne og børn: 1 dråbe mindst 6 gange daglig. Din læge vil fastlægge din dosis. Følg lægens anvisninger.

Selvom der sker en bedring efter få dage, er det vigtigt at fortsætte behandlingen i den periode lægen har anvist. Ellers er der risiko for, at infektionen blusser op igen.

Hvis du har brugt for meget Kloramfenikol DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Kloramfenikol DAK, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har brugt for mange øjendråber, kan du skylle øjet med vand eller saltvand.

Hvis du har glemt at bruge Kloramfenikol DAK

Du skal ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Det bedste resultat opnås, når doseringen følges.

Hvis du holder op med at bruge Kloramfenikol DAK

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. Bivirkninger

Kloramfenikol DAK kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Brændende, sviende fornemmelse og irritation i øjnene, rødme i det hvide område af øjet, ny infektion (muligvis med bakterier, der ikke kan behandles), allergiske reaktioner.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Betændelse i synsnerven, der kan medføre blindhed.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Påvirkning af knoglemarven ved langvarig brug, væskeophobning under huden især ved læber og hals.

Ikke alvorlige: Sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker og tendens til infektioner, nældefeber, udslæt, øjenbetændelse.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Kloramfenikol DAK utilgængeligt for børn.

En **uåbnet** Kloramfenikol DAK skal opbevares i køleskab ved 2 – 8 °C.

Efter åbning må Kloramfenikol DAK højst bruges 1 måned og kan da opbevares ved stuetemperatur.

Brug ikke Kloramfenikol DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Kloramfenikol DAK 5 mg/ml øjendråber indeholder

Aktivt stof er chloramphenicol. De øvrige indholdsstoffer er borax (E 285), borsyre (E 284) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Kloramfenikol DAK øjendråber er en klar, farveløs opløsning. Produktet findes i plastflasker à 10 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Pharma AS
Solbærveien 5
N-2409 Elverum

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Revideret november 2011