

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kloramfenikol DAK 1% øjensalve

Chloramphenicol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Kloramfenikol DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol DAK
3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Kloramfenikol DAK øjensalve er et bakteriehæmmende lægemiddel (antibiotikum) til behandling af øjenbetændelse.

Lægen kan have givet dig Kloramfenikol DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kloramfenikol DAK

Brug ikke Kloramfenikol DAK hvis du er overfølsom over for chloramphenicol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Kloramfenikol DAK

Tal med lægen, inden du bruger Kloramfenikol DAK, hvis du har en knoglemarvssygdom, eller nogen i din familie har eller har haft alvorlige blodsygdomme.

Vær opmærksom på, at du:

- ikke må bruge Kloramfenikol DAK sammen med kontaktlinser
- ikke bør bruge Kloramfenikol DAK længere end 2 uger, da der ellers er risiko for udvikling af bivirkninger og resistens (medicinen virker ikke)

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også lægemidler, som ikke er på recept, lægemidler købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Anden medicin kan ændre virkningen af Kloramfenikol DAK, eller Kloramfenikol DAK kan ændre virkningen af anden medicin. Tal derfor med din læge, hvis du tager anden medicin mod infektion (penicillin, cefalosporiner, gentamicin, tetracyclin, polymyxin B).

Hvis du bruger anden medicin i øjnene, skal du vente ca. 5 minutter, efter du har brugt Kloramfenikol DAK, før du bruger den næste medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Kloramfenikol DAK under graviditet.

Amning

Du kan bruge Kloramfenikol DAK, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kloramfenikol DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Kloramfenikol DAK

Brug altid Kloramfenikol DAK efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brugsanvisning

Træk ned i det nederste øjenlåg og tryk $\frac{1}{2}$ cm salve ud i lommen mellem øje og øjenlåg. Luk øjet og fordel salven ved at massere let på øjenlåget.

Selvom der sker en bedring efter få dage, er det vigtigt at fortsætte behandlingen i den periode, lægen har anvist. Ellers er der risiko for, at infektionen blusser op igen.

Voksne og børn: Salven anvendes 3 - 6 gange dagligt, i det antal dage lægen har sagt. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har brugt for meget Kloramfenikol DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har brugt mere Kloramfenikol DAK end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har brugt for meget øjensalve, kan du skylle øjet med vand eller saltvand.

Hvis du har glemt at bruge Kloramfenikol DAK

Du skal ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Det bedste resultat opnås, når doseringen følges.

Hvis du holder op med at bruge Kloramfenikol DAK

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. Bivirkninger

Kloramfenikol DAK kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Brændende, sviende fornemmelse og irritation i øjnene, rødme i det hvide område af øjet, ny infektion (muligvis med bakterier, der ikke kan behandles), allergiske reaktioner.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Betændelse i synsnerven, der kan medføre blindhed.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Påvirkning af knoglemarven ved langvarig brug, væskeophobning under huden især ved læber og hals

Ikke alvorlige: Sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker og tendens til infektioner, nældefeber, udslæt, øjenbetændelse.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Kloramfenikol DAK utilgængeligt for børn.

En **uåbnet** tube Kloramfenikol DAK skal opbevares i køleskab ved 2 – 8 °C.

Efter åbning må Kloramfenikol DAK højst bruges i 1 måned og må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Kloramfenikol DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Kloramfenikol DAK 1% øjensalve indeholder

Aktivt stof er chloramphenicol. De øvrige indholdsstoffer er paraffinolie (E 905) og gul, blød paraffin.

Udseende og pakningsstørrelse

Kloramfenikol DAK øjensalve er en gullig, uklar, tyktflydende salve, der findes i pakningsstørrelser à 5 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
4000 Roskilde

Fremstiller

Tubilux Pharma S.p.A.
Via Costarica 20/22
00040 Pomezia (RM), Italien

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Revideret november 2011