

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Klorzoxazon DAK 250 mg tabletter Chlorzoxazon

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Klorzoxazon DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Klorzoxazon DAK
3. Sådan skal du tage Klorzoxazon DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Klorzoxazon DAK er et muskelafslappende lægemiddel, der bruges ved akutte muskelsmerter på grund af muskelspændinger, forvridninger, forstuvninger og lignende.

Lægen kan have givet dig Klorzoxazon DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE KLORZOXAZON DAK

Tag ikke Klorzoxazon DAK

- hvis du er overfølsom over for chlorzoxazon eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Klorzoxazon DAK

Tal med lægen inden du tager Klorzoxazon DAK, hvis du

- har nedsat leverfunktion
- har en sjælden, arvelig stofskiftesygdom (porfyri)

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med

- angstdæmpende og beroligende medicin (barbiturater, benzodiazepiner og chloralhydrat)

- anden muskelafslappende medicin (f.eks. carisoprodol)
- stærk, smertestillende medicin (opioider)
- medicin mod alkoholafhængighed (disulfiram)
- naturlægemiddel mod tristhed og modløshed (prikbladet perikum)

Hvis du lider af kronisk alkoholisme, kan du reagere anderledes på medicinen. Tal med din læge inden du tager Klorzoxazon DAK.

Brug af Klorzoxazon DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Klorzoxazon DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du normalt ikke tage Klorzoxazon DAK. Tal med lægen.

Amning

Du må ikke tage Klorzoxazon DAK, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Klorzoxazon DAK kan give bivirkninger (svimmelhed, træthed og døsighed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.
Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE KLORZOXAZON DAK

Tag altid Klorzoxazon DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletten med rigelig væske. Du kan evt. dele eller knuse tabletten.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Du skal starte med at tage 1 – 2 tabletter (250 – 500 mg) 3 – 4 gange daglig. Senere kan lægen ændre din dosis til 1 tablet (250 mg) 3 gange daglig.

Børn

Dosis afhænger af barnets vægt. 20 mg pr. kg legemsvægt dagligt, fordelt på flere doser. Følg lægens anvisning.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Klorzoxazon DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Klorzoxazon DAK, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på at du har taget for mange Klorzoxazon DAK kan være mavegener, kvalme, opkastninger, døsighed, svimmelhed, hovedpine, utilpashed, træthed efterfulgt af nedsat muskelkraft, lavt blodtryk og vejrtrækningsbesvær. Desuden øget muskelspænding og ophidselse.

Hvis du har glemt at tage Klorzoxazon DAK

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Klorzoxazon DAK

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Klorzoxazon DAK.

4. BIVIRKNINGER

Klorzoxazon DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Træthed, svimmelhed, døsighed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Halsbrand, smerter og ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen, kvalme, diaré.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Blodigt opkast og/eller sort afføring på grund af blødning i mave og tarm (alvorlig), gulsot ofte med hudkløe (alvorlig), misfarvning af urinen, blødninger i huden, allergiske reaktioner.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Lever-skader (alvorlig).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Klorzoxazon DAK utilgængeligt for børn.
Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.
Brug ikke Klorzoxazon DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Klorzoxazon DAK 250 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Chlorzoxazon.

Øvrige indholdsstoffer: Kartoffelstivelse, crospovidon (E 1202), magnesiumstearat (E 470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), povidon (E 1201), talcum (E 553b), vandfri kolloid silica (E 551).

Udseende og pakningsstørrelser

Klorzoxazon DAK er en rund, hvid tablet med delekærv.

Klorzoxazon DAK findes i pakningsstørrelser à 25 og 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2009