

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kodamid® DAK 9,6/50/150/250/80 mg tabletter

codeinphosphathemihydrat/caffein/propyphenazon/salicylamid/magnesiumoxid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Kodamid® DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodamid® DAK
3. Sådan skal du tage Kodamid® DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Kodamid® DAK er et smertestillende lægemiddel til svage smerter.

Lægen kan have givet dig Kodamid® DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE KODAMID® DAK

Tag ikke Kodamid® DAK hvis du:

- er overfølsom over for codeinphosphathemihydrat, caffein, propyphenazon, salicylamid, magnesiumoxid eller et af de øvrige indholdsstoffer
- har en arvelig stofskiftesygdom (porfyri)
- har mangel på enzymet glucose-6-phosphat dehydrogenase
- ammer
- har svært nedsat nyrefunktion
- har frisk blødning fra mave-tarmkanalen (blodige opkastninger og/eller sort afføring)
- tidligere har haft allergiske reaktioner som væskeophobninger omkring læber og hals, nældefeber, snue eller astma ved brug af smertestillende medicin (af typen NSAID eller salicylater).
- er gravid i 7. - 9. måned
- samtidig er i behandling med et smertestillende lægemiddel indeholdende ketorolac.

Vær ekstra forsigtig med at tage Kodamid® DAK

**BØRN ELLER UNGE
I HJEMMET?**

Læs advarslen og vær omhyggelig med,
hvordan du opbevarer denne medicin.

Tal med lægen inden du tager Kodamid[®] DAK, hvis du:

- har sygdomme relateret til mave-tarmsystemet
- har eller har haft mavesår
- har astma, vejrtrækningsbesvær eller en lungesygdom (KOL)
- har nedsat leverfunktion
- skal vaccineres mod skoldkopper
- tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, clopidogrel og dipyridamol)

Vær opmærksom på at Kodamid[®] DAK kan virke vanedannende.

Vanemæssig og samtidig brug af flere forskellige smertestillende lægemidler kan medføre nyreskader med risiko for nyresvigt.

Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Anden medicin kan ændre virkningen af Kodamid[®] DAK, eller Kodamid[®] DAK kan ændre virkningen af anden medicin. Tal derfor med din læge, hvis du tager:

- medicin mod mavesår og for megen mavesyre (cimetidin, ranitidin)
- blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, clopidogrel og dipyridamol)
- medicin mod forhøjet blodtryk og nedsat hjertefunktion (captopril, ACE-hæmmere, propranolol, atenolol, digoxin)
- vanddrivende medicin
- medicin mod infektioner (ciprofloxacin, levofloxacin, tetracyklin, azithromycin)
- medicin mod HIV-virus (atazanavir)
- malariamedicin (chloroquin)
- acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (ketorolac)
- medicin mod psykoser (clozapin)
- vaccine mod skoldkopper

Brug af Kodamid[®] DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Kodamid[®] DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Vær opmærksom på at du under længerevarende behandling med Kodamid® DAK kan have en nedsat mulighed for at blive gravid. Din behandling bør derfor være så kortvarig som mulig og i lavest mulige dosis.

Graviditet

Du må ikke tage Kodamid® DAK, hvis du er gravid i 7. - 9. måned. I de første 6 måneder af graviditeten kan du tage Kodamid® DAK i lavest mulige dosis efter lægens anvisning.

Amning

Du må ikke tage Kodamid® DAK, når du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kodamid® DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE KODAMID® DAK

Tag altid Kodamid® DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletten med rigelig væske. Du kan eventuelt dele eller knuse tabletten.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 – 2 tabletter højst 2 – 3 gange dagligt.

Børn: Børn under 15 år må kun få Kodamid® DAK efter lægens anvisning.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat lever- og nyrefunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Kodamid® DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Kodamid® DAK, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Symptomer på overdosering er små pupiller, forstoppelse, vandladningsbesvær, hovedpine, træthed, kvalme, opkastning, nedsat kropstemperatur, døsighed, svimmelhed, ligegyldighed, forvirring, vejrtrækningsbesvær, lavt blodtryk, kold og klam hud, koma, vand i lungerne, opstemthed, krampeanfald, høj kropstemperatur, shock, hurtig puls, leverpåvirkning, rødmen, påvirkning af hjertefunktionen og nervesystemet (nedsat reaktionsevne).

Hvis du har glemt at tage Kodamid® DAK

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Kodamid® DAK

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Kodamid® DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er mave-tarm-gener.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Kvalme; oppustethed; mavesmerter; opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion) hos personer med astma, kroniske luftvejsinfektioner eller overfølsomhed over for andre smertestillende midler; vejrtrækningsbesvær.

Ikke alvorlige: Forstoppelse; diaré.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Kraftig afskalning og afstødning af hud; nyrepåvirkning med risiko for nyresvigt.

Ikke alvorlige: Døsighed; misfarvning af urinen; rødmen af huden; nældefeber.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Blodmangel med gulsot; akutte voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen; Reyes syndrom hos børn udtrykt ved feber, opkastninger og sløret bevidsthed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. SÅDAN OPBEVARER DU KODAMID® DAK

Opbevar Kodamid® DAK utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

Brug ikke Kodamid® DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kodamid® DAK 9,6/50/150/250/80 mg tabletter indeholder

Aktive stoffer: 9,6 mg codeinphosphathemihydrat, 50 mg koffein, 150 mg propyphenazon, 250 mg salicylamid og tungt magnesiumhydroxid svarende til 80 mg magnesiumoxid.

Øvrige indholdsstoffer: Kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse, mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), povidon (E 1201), talcum (E 553b) og vandfri kolloid silica (E 551).

Udseende og pakningsstørrelser

Kodamid® DAK er hvide, ovale tabletter med delekerV.

Kodamid® DAK findes i pakningsstørrelser à 100 og 200 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
4000 Roskilde
eller
Nycomed Pharma Sp.z o.o.
12 Księstwa Łowickiego ST.,
99-420 Łyszkowice, Polen

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2010