

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kodein DAK 25 mg filmovertrukne tabletter Codein

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Kodein DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodein DAK
3. Sådan skal du tage Kodein DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Kodein DAK virker hoste- og smertestillende. Du kan anvende Kodein DAK ved hoste eller til behandling af svage smerter.

Lægen kan have givet dig Kodein DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE KODEIN DAK

Tag ikke Kodein DAK hvis du

- er overfølsom over for codein eller et af de øvrige indholdsstoffer

Vær ekstra forsigtig med at tage Kodein DAK

Tal med lægen, inden du tager Kodein DAK, hvis du

- har nedsat lungefunktion
- astma
- bronkitis med opspyt
- hoste med slim
- har lever- eller nyresvigt

Længere tids behandling med Kodein DAK kan føre til afhængighed.

Kodein DAK har en sløvende bivirkning, som forstærkes, hvis du drikker alkohol.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- sovemedicin eller beroligende medicin
- hjertemedicin (kinidin, antiarytmika, betablokkere)
- medicin mod psykiske lidelser
- medicin mod depression (SSRI, venlafaxin)
- smertestillende medicin (opioider)
- medicin mod blærelidelser (tolterodin)
- antibiotika (rifampicin)
- Medicin til bedøvelse (anæstetika)

Brug af Kodein DAK sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Kodein DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Hvis du drikker alkohol forstærkes Kodein DAKs sløvende bivirkning.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Kodein DAK efter aftale med din læge.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Kodein DAK efter aftale med din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Kodein DAK virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle. Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Kodein DAK

Denne medicin indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE KODEIN DAK

Tag altid Kodein DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletterne sammen med rigelig væske. Tabletterne kan evt. deles, tygges eller knuses.

Den sædvanlige dosis er**Hoste****Voksne**

1 – 2 tabletter (25 – 50 mg) 1 – 3 gange daglig.

Svage smerter**Voksne**

1 – 2 tabletter (25 – 50 mg) hver 4. – 6. time, dog højst 200 mg daglig.

Børn

Børn under 15 år må kun få Kodein DAK efter lægens anvisning.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Kodein DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Kodein DAK, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er nedsat bevidsthedsniveau evt. bevidstløshed og vejrtrækningsbesvær, eventuelt stop af vejrtrækning, blåfarvning af ansigt og fingre på grund af iltmangel, lavt blodtryk, små pupiller og maveproblemer.

Ved alvorlige overdoseringer kan følgende symptomer forekomme; uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser; chok, lungeskader; påvirkning af hjerterytmen; muskelsmerter; muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne; forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen.

Hvis du har glemt at tage Kodein DAK

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Kodein DAK

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Kodein DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Svimmelhed; døsighed; kvalme; opkastning; forstoppelse.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætssbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse på grund af overfølsomhed (anafylaktisk shock); svækket vejtrækning, blåfarvning af læber og negle; kramper.

Ikke alvorlige: Opstemthed; lavt blodtryk; Nældefeber.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Voldsomme mavesmerter i den øvre del af maven og feber på grund af akut betændelse i bugspytkirtlen, forgiftning af nyren (nefrotoksicitet).

Ikke alvorlige: Allergi Risiko for afhængighed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Kodein DAK utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Tag ikke Kodein DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kodein DAK 25 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: Codeinphosphathemihydrat.

Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, hypromellose (E 464), kartoffelsstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520), talcum (E 553b).

Farvestof: Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Kodein DAK er en hvid, hvælvet, filmovertrukken tablet med delekærv på den ene side.

Kodein DAK findes i pakningsstørrelser à 30 og 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Seneste indlægsseddel kan ses på: www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2013