

## INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Escitalopram Glenmark 5 mg Filmovertrukne tabletter  
Escitalopram Glenmark 10 mg Filmovertrukne tabletter  
Escitalopram Glenmark 15 mg Filmovertrukne tabletter  
Escitalopram Glenmark 20 mg Filmovertrukne tabletter

### Escitalopram

#### Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Escitalopram Glenmark til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

#### Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Glenmark
3. Sådan skal du tage Escitalopram Glenmark
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelse og yderligere oplysninger

## 1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Escitalopram Glenmark indeholder escitalopram og anvendes til behandling af depression (moderate til svære depressive episoder) og angsttilstande (som panikangst med eller uden agorafobi, som er angst for at opholde sig på steder, hvor hjælp måske ikke er tilgængelig, socialangst, generaliseret angst og tvangshandlinger, også kaldet obsessiv-kompulsiv lidelse, OCD).

Escitalopram tilhører en gruppe af antidepressiva kaldet selektive serotonin genoptagelseshæmmere (SSRI'er). Disse lægemidler påvirker serotonin systemet i hjernen ved at øge serotonin niveauet. Man mener, at forstyrrelser i serotonin systemet er et vigtigt element i udviklingen af depression og lignende sygdomme.

## 2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE Escitalopram Glenmark

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

### Tag ikke Escitalopram Glenmark

- hvis du er allergisk over for escitalopram eller et af de øvrige indholdsstoffer i Escitalopram Glenmark (se pkt. 6 "Pakningsstørrelse og yderligere information").
- hvis du tager anden medicin, som tilhører gruppen af MAO-hæmmere, herunder selegilin (anvendes til behandling af Parkinsons sygdom), moclobemid (anvendes til behandling af depression) og linezolid (et antibiotikum).
- hvis du er født med eller har haft tilfælde med unormal hjerterytme (ses på EKG, en undersøgelse af, hvordan hjertet fungerer).

- hvis du tager medicin mod problemer med hjerterytmen, eller som påvirker hjerterytmen (se pkt. 2 "Brug af anden medicin").

### **Vær ekstra forsigtig med at tage Escitalopram Glenmark**

Fortæl det til lægen, hvis du har andre lidelser eller sygdomme, så din læge kan tage det med i betragtning. Det er særlig vigtigt at fortælle lægen:

- hvis du har epilepsi. Behandling med Escitalopram Glenmark bør stoppes, hvis du får krampeanfald, eller hvis hyppigheden af anfald stiger (se også pkt. 4 "Bivirkninger").
- hvis du har nedsat lever- eller nyrefunktion. I så fald kan lægen måske blive nødt til at justere din dosis.
- hvis du har diabetes. Behandling med Escitalopram Glenmark kan ændre den glykæmiske kontrol (dit blodsukker). Dosen af insulin og/eller andre diabetesmidler skal muligvis justeres.
- hvis du har nedsat indhold af natrium i blodet.
- hvis du har tendens til nemt at få blødninger eller blå mærker.
- hvis du får elektrokonvulsiv behandling (behandling med elektrochok).
- hvis du har koronar hjertesygdom.
- hvis du har eller har haft hjerteproblemer eller for nylig har haft et hjerteanfald.
- hvis du har lav hvilepuls og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig, svær diarré og opkastninger (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende midler).
- hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjerterytme, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når du rejser dig. Det kan tyde på unormal hjerterytme.
- hvis du har eller tidligere har haft øjenproblemer, såsom visse typer grøn stær (forhøjet tryk i øjet).

### **Bemærk:**

Som med andre lægemidler til behandling af depression eller relaterede sygdomme opnås der ikke øjeblikkelig bedring. Når du begynder på behandling med Escitalopram Glenmark, kan det tage flere uger, før du oplever en bedring. Ved behandling af panikangst går der som regel 2-4 uger, før der ses en bedring. I starten af behandlingen kan nogle patienter opleve øget angst. Den forsvinder i løbet af behandlingen. Det er derfor meget vigtigt at følge lægens anvisninger nøjagtigt og ikke stoppe behandlingen eller ændre dosen uden at tale med lægen om det.

Nogle patienter med mani-depressive lidelser kan gå ind i en manisk fase. Den kendetegnes ved usædvanlige og hurtigt skiftende ideer, malplaceret lykketilstand og overdreven fysisk aktivitet. Kontakt lægen, hvis du oplever det.

Symptomer som rastløshed eller problemer med at sidde eller stå stille kan også forekomme under de første uger af behandlingen. Kontakt straks lægen, hvis du oplever disse symptomer.

Du er måske ikke selv opmærksom på de ovennævnte symptomer. Derfor kan det være en god idé at bede en ven eller et familiemedlem om at hjælpe dig med at observere eventuelle tegn på ændringer i din adfærd.

Fortæl det omgående til lægen, eller kontakt det nærmeste hospital, hvis du har negative tanker eller oplevelser, eller hvis du får nogen af ovenstående symptomer i løbet af behandlingen.

### **Selvmodstanker og forværring af depression eller angst**

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du af og til få tanker om at gøre skade på dig selv eller begå selvmord. Disse tanker kan blive forstærket, når du begynder at tage antidepressiv medicin, fordi det varer nogen tid, før medicinen virker. Der går som regel cirka to uger, men nogle gange længere.

Der kan være større sandsynlighed for, at du får disse tanker:

- Hvis du tidligere har haft selvmodstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

- Hvis du er **ung**. Information fra kliniske forsøg har vist en øget risiko for selvmordsadfærd hos unge under 25 år med psykiatriske lidelser, som blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om at gøre skade på dig selv eller begå selvmord, **skal du omgående kontakte din læge eller tage på hospitalet.**

**Det kan være en god idé at fortælle det til et familiemedlem eller en nær ven** at du er deprimeret eller lider af angst og bede dem læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt bede dem om at sige det til dig, hvis de mener, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de er bekymrede over ændringer i din adfærd.

### Børn og teenagere

Escitalopram Glenmark bør normalt ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Du bør også være opmærksom på, at patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger som selvmordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (hovedsageligt aggression, trodsighed og vrede), når de tager denne type medicin. Lægen kan alligevel vælge at ordinere Escitalopram Glenmark til patienter under 18 år, fordi han/hun beslutter, at det vil være til gavn for dem. Hvis lægen har ordineret Escitalopram Glenmark til en patient under 18 år, og du vil drøfte det, skal du kontakte lægen. Fortæl det til lægen, hvis nogen af de symptomer, der er angivet ovenfor, opstår eller bliver forværret, når patienter under 18 år tager Escitalopram Glenmark. Langsigtet sikkerhedsmæssig effekt på vækst, modning og kognitiv og adfærdsmæssig udvikling for Escitalopram Glenmark denne aldersgruppe er endnu ikke påvist.

### **Brug af anden medicin sammen med Escitalopram Glenmark**

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Fortæl det til lægen, hvis du tager et af de følgende lægemidler:

- Non-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAOI), som indeholder phenelzin, iproniazid, isocarboxazid, nialamid og tranylcypromin som aktive stoffer. Hvis du har taget et af disse midler, skal du vente 14 dage, før du begynder at tage Escitalopram Glenmark. Når du stopper med at tage Escitalopram Glenmark, skal der gå 7 dage, før du tager et af disse lægemidler.
- Reversible, selektive MAO A-hæmmere, som indeholder moclobemid (anvendes til behandling af depression).
- Irreversible MAO B-hæmmere, som indeholder selegilin (anvendes til behandling af Parkinsons sygdom). Disse midler øger risikoen for bivirkninger.
- Antibiotikummet linezolid.
- Litium (anvendes til behandlingen af mani-depressive lidelser) og tryptofan.
- Imipramin og desipramin (anvendes begge til behandling af depression).
- Sumatriptan og lignende lægemidler (anvendes til behandling af migræne) og tramadol (anvendes imod svære smerter). Disse midler øger risikoen for bivirkninger.
- Cimetidin og omeprazol (anvendes til behandling af mavesår), fluvoxamin (antidepressivum) og ticlopidin (anvendes til at reducere risikoen for apopleksi). Disse midler kan øge mængden af Escitalopram Glenmark i blodet.
- Prikbladet perikon, også kaldet Johannesurt (*Hypericum perforatum*) – et naturlægemiddel, som anvendes mod depression.
- Acetylsalicylsyre (aspirin) og non-steroidale antiinflammatoriske lægemidler (medicin til at lindre smerter eller til at fortynde blodet, såkaldte antikoagulantia).
- Warfarin, dipyridamol og phenprocoumon (medicin til at fortynde blodet, såkaldte antikoagulantia). Din læge vil sikkert kontrollere dit blods koagulationstid, når du indleder og afslutter behandlingen med Escitalopram Glenmark for at kontrollere, at din dosis af det blodfortyndende middel stadig er passende.

- Mefloquin (anvendes til behandling af malaria), bupropion (anvendes til behandling af depression) og tramadol (anvendes til behandling af svære smerter) på grund af en mulig risiko for sænkning af krampetærsklen.
- Neuroleptika (medicin til behandling af skizofreni, psykoser) på grund af en mulig risiko for sænkning af krampetærsklen, samt antidepressiva.
- Flecainid, propafenon og metoprolol (anvendes ved hjerte-karsygdomme) clomipramin og nortriptylin (antidepressiva) samt risperidon, thioridazin og haloperidol (antipsykotika). Doseringen af Escitalopram Glenmarkskal måske justeres.
- Medicin, der sænker blodets indhold af kalium eller magnesium, da disse forhold øger risikoen for livstruende hjerterytmeforstyrrelser.

TAG IKKE Escitalopram Glenmark, hvis du tager medicin mod hjerterytmeproblemer eller medicin, der kan forlænge hjerterytmen, som Klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastin). Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

### **Brug af Escitalopram Glenmark sammen med mad og drikke**

Escitalopram Glenmark kan tages med eller uden mad (se pkt. 3, "Sådan skal du tage Escitalopram Glenmark).

I lighed med mange lægemidler er det ikke tilrådeligt at kombinere Escitalopram Glenmark med alkohol, selvom Escitalopram Glenmark ikke forventes at interagere med alkohol.

### **Graviditet og amning**

Fortæl det til din læge, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid. Tag ikke Escitalopram Glenmark, hvis du er gravid, medmindre du og din læge har drøftet de fordele og ulemper, det indebærer.

Hvis du tager Escitalopram Glenmark i de sidste tre måneder af graviditeten, skal du være opmærksom på, at følgende virkninger kan ses hos den nyfødte: vejrtrækningsproblemer, blålig hud, krampeanfald, ændringer i legemstemperatur, spiseproblemer, opkastning, lavt blodsukker, stive eller slappe muskler, voldsomme reflekser, rysten, nervøsitet, irritabilitet, sløvhed, konstant gråd, søvnløshed og søvnproblemer. Kontakt omgående din læge, hvis dit nyfødte barn har nogen af disse symptomer.

Sørg for, at din jordemoder og/eller din læge ved, at du tager [Udfyldes nationalt. Under graviditeten og særligt i de sidste tre måneder af graviditeten kan lægemidler som Escitalopram Glenmark øge risikoen for en alvorlig lidelse med forhøjet tryk i lungekredsløbet kaldet persisterende pulmonal hypertension (PPHN) hos den nyfødte. Det får barnet til at trække vejret hurtigere og virke blåligt. Disse symptomer starter som regel i løbet af de første 24 timer efter fødslen. Hvis det sker for dit barn, skal du omgående kontakte jordemoderen eller lægen.

Hvis du tager Escitalopram Glenmark under graviditeten, må du ikke brat stoppe med behandlingen.

Tag ikke Escitalopram Glenmark, hvis du ammer, medmindre du og din læge har drøftet de fordele og ulemper, det indebærer.

Citalopram, et lægemiddel lig escitalopram, har i dyreforsøg vist sig at nedsætte sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men påvirkning af menneskers fertilitet er hidtil ikke observeret.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Du rådes til ikke at køre bil eller andre køretøjer eller betjene maskiner, før du ved, hvordan Escitalopram Glenmark påvirker dig.

### **3. SÅDAN SKAL DU TAGE Escitalopram Glenmark**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De/du har taget mere af Escitalopram Glenmark, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De/du føler Dem/dig utilpas).

Tag altid Escitalopram Glenmark nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

### **Voksne**

#### *Depression*

Den normalt anbefalede dosis af Escitalopram Glenmark er 10 mg en gang dagligt. Din læge kan øge dosen til højst 20 mg dagligt.

#### *Panikangst*

Startdosen af Escitalopram Glenmark er 5 mg en gang daglig i den første uge. Derefter øges dosen til 10 mg dagligt. Din læge kan yderligere øge dosen til højst 20 mg dagligt.

#### *Socialfobi*

Den normalt anbefalede dosis af Escitalopram Glenmark er 10 mg en gang dagligt. Din læge kan enten nedsætte dosen til 5 mg dagligt eller øge dosen til højst 20 mg dagligt, afhængig af hvordan du reagerer på medicinen.

#### *Generaliseret angst*

Den normalt anbefalede dosis af Escitalopram Glenmark er 10 mg en gang dagligt. Din læge kan øge dosen til højst 20 mg dagligt.

#### *Tvangstanker/tvangshandlinger (OCD)*

Den normalt anbefalede dosis af Escitalopram Glenmark er 10 mg en gang dagligt. Din læge kan øge dosen til højst 20 mg dagligt.

### **Ældre (over 65 år)**

Den anbefalede startdosis af Escitalopram Glenmark er 5 mg en gang dagligt. Din læge kan øge dosen til 10 mg dagligt.

### **Børn unge (under 18 år)**

Escitalopram Glenmark bør normalt ikke gives til børn og unge. Se pkt. 2. "Det skal du vide, før du begynder at tage Escitalopram Glenmark" for yderligere oplysninger.

Du kan tage Escitalopram Glenmarkmed eller uden mad. Synk tabletten sammen med lidt vand. Lad være med at tygge den, den smager bittert.

Om nødvendigt kan du dele tabletten ved først at lægge den på en flad overflade med delekærven opad. Derefter kan tabletten deles ved at trykke ned på begge ender af tabletten med pegefingrene.

### **Behandlingens varighed**

Der kan gå et par uger, før du begynder at få det bedre. Bliv ved med at tage Escitalopram Glenmark, selvom der går nogen tid, før du føler nogen bedring.

Du må ikke ændre på dosen uden først at tale med lægen om det.

Bliv ved med at tage Escitalopram Glenmark, så længe lægen anbefaler det. Hvis du stopper for hurtigt med behandlingen, kan dine symptomer vende tilbage. Det anbefales at fortsætte behandlingen i mindst 6 måneder, efter at du har fået det godt igen.

### **Hvis du har taget for mange Escitalopram Glenmark**

Hvis du tager mere end den ordinerede dosis af Escitalopram Glenmark, skal du omgående kontakte lægen eller skadestuen på det nærmeste hospital. Også selvom du ikke har tegn på ubehag. Nogle af tegnene på en overdosis kan være svimmelhed, rysten, ophidselse, krampe, koma, kvalme, opkastninger, ændret hjerterytme, lavere blodtryk og ændring i kroppens væske/saltbalance. Tag æsken/holderen med Escitalopram Glenmarkmed til lægen eller hospitalet.

### **Hvis du har glemt at tage Escitalopram Glenmark**

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer at tage en dosis, og du husker det, før du går i seng, skal du straks tage dosen. Fortsæt som normalt næste dag. Hvis du først husker det i nattens løb eller dagen efter, skal du springe den glemte dosis over og fortsætte som normalt.

### **Hvis du holder op med at tage Escitalopram Glenmark**

Hold ikke op med at tage [Udfyldes nationalt, før lægen anbefaler det. Når du har gennemført dit behandlingsforløb, anbefales det normalt at reducere dosen af Escitalopram Glenmarkgradvist over nogle uger.

Når du holder op med at tage Escitalopram Glenmark, særligt hvis det sker brat, kan du få ophørssymptomer. De er almindelige, når behandling med Escitalopram Glenmark stoppes. Risikoen er højere, hvis du har taget Escitalopram Glenmark i lang tid eller i høje doser, eller når dosen nedsættes for hurtigt. De fleste oplever, at symptomerne er lette og fortager sig af sig selv inden for to uger. Men hos nogle patienter kan de være meget generende eller længerevarende (2-3 måneder eller mere). Hvis du får svære ophørssymptomer, når du holder op med at tage Escitalopram Glenmark, skal du kontakte din læge. Han/hun beder dig måske om at begynde at tage tabletterne igen og trappe langsommere ned.

Ophørssymptomer kan omfatte: Svimmelhed (usikker på benene eller miste balancen), prikken og stikken, brændende fornemmelser og (mindre almindeligt) fornemmelse af elektrisk stød også i hovedet, søvnforstyrrelser (voldsomme drømme, mareridt, søvnløshed), angst, hovedpine, kvalme, svedtendens (også om natten) rastløshed eller ophidselse, rysten, forvirring eller desorientering, letpåvirkelig eller irriterbar, diarré (løs afføring), synsforstyrrelser, uregelmæssig eller voldsom hjertebanken (palpitationer).

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

## **4. BIVIRKNINGER**

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkningerne forsvinder som regel efter nogle få ugers behandling. Vær opmærksom på, at mange af disse bivirkninger også kan være symptomer på din sygdom. De forsvinder derfor, når du begynder at få det bedre.

### **Kontakt lægen, hvis du får nogen af følgende bivirkninger under behandlingen:**

Ikke almindelige (påvirker 1 til 10 ud af 1.000):

- Usædvanlige blødninger, inklusive mave-tarmblødninger

Sjældne (påvirker 1 til 10 ud af 10.000):

- Hvis du oplever hævelser af hud, tunge, læber eller ansigt eller har vejrtræknings- eller synkebesvær (allergisk reaktion), skal du straks kontakte lægen eller tage på hospitalet.
- Hvis du har høj feber eller oplever ophidselse, forvirring, rysten og pludselige muskelsammentrækninger, kan det være tegn på en sjælden tilstand kaldet serotonergt syndrom. Kontakt lægen, hvis du oplever det.

Kontakt omgående lægen eller tag på hospitalet, hvis du får nogen af følgende bivirkninger:

- Vandladningsbesvær
- Krampeanfald, se også afsnittet Vær ekstra forsigtig med at tage Escitalopram Glenmark
- Hvis huden og det hvide i øjnene bliver gult, er det tegn på nedsat leverfunktion/gulsot
- Hurtig, uregelmæssig hjerterytme eller besvimelse, som kan være symptomer på en livstruende tilstand kaldet Torsade de Pointes.

### **Endvidere er følgende bivirkninger indberettet:**

Meget almindelige (påvirker mere end 1 ud af 10):

- Kvalme
- Hovedpine

Almindelige (påvirker 1 til 10 ud af 100)

- Tilstoppet eller løbende næse (sinusitis)
- Nedsat appetit, øget appetit
- Angst, rastløshed, unormale drømme, problemer med at falde i søvn, søvnighed, svimmelhed, gaben, rysten, prikken i huden
- Diarré, forstoppelse, opkastning, mundtørhed
- Øget svedtendens
- Smerter i muskler og led (artragi og myalgi)
- Seksuelle forstyrrelser (forsinket ejakulation, erektionsproblemer, nedsat seksuallyst og kvinder kan opleve besvær med at få orgasme)
- Træthed, feber
- Vægtøgning

Ikke almindelige (påvirker 1 til 10 ud af 1.000):

- Nældefeber, udslæt, kløe
- Tænderskæren, ophidselse, nervøsitet, panikanfald, forvirring
- Søvnforstyrrelser, smagsforstyrrelser, besvimelse (synkope)
- Forstørrede pupiller (mydriasis), synsforstyrrelse, ringen for ørerne (tinnitus)
- Hårtab
- Vaginalblødning
- Vægttab
- Hurtig hjerterytme
- Hævelse af arme eller ben
- Næseblod

Sjældne (påvirker 1 til 10 ud af 10.000):

- Aggression, depersonalisering, hallucinationer
- Langsom hjerterytme
- Selvmordsrelaterede hændelser, se også afsnittet "Vær ekstra forsigtig med at tage Escitalopram Glenmark"

Nogle patienter har indberettet (hyppighed ikke kendt):

- Tanker om at gøre skade på sig selv eller selvmordstanker (tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd) er rapporteret under behandling med escitalopram (det aktive stof i Escitalopram Glenmark eller kort efter behandlingsophør (se også afsnittet "Vær ekstra forsigtig med at tage Escitalopram Glenmark").
- Nedsat indhold af natrium i blodet (symptomerne er kvalme og utilpashed, muskelsvækkelse eller forvirring)
- Svimmelhed, når du rejser dig, på grund af lavt blodtryk (ortostatisk hypotension)
- Abnorm leverfunktionstest (øget mængde leverenzymmer i blodet)
- Bevægelsesforstyrrelser (ufrivillige bevægelser af musklerne)
- Smertefuld erektion (priapisme)
- Blødningsforstyrrelser, inklusive blødninger i hud og slimhinder (ekchymose) og nedsat antal blodplader (thrombocytopeni)
- Pludselig hævelse af hud eller slimhinder (angioødemer)
- Øget mængde af urin, der udskilles (uhensigtsmæssig udskillelse af ADH)
- Mælkeflåd hos kvinder, som ikke ammer
- Mani
- En øget risiko for knoglebrud er blevet observeret hos patienter, der tager denne type medicin  
Ændret hjerterytme (kaldes "forlænget QT-interval", som kan ses på et elektrokardiogram, hjertets elektriske aktivitet).

Endvidere er der kendskab til en række bivirkninger af lægemidler, der virker på samme måde som escitalopram (det aktive stof i Escitalopram Glenmark). Det drejer sig om:

- Motorisk rastløshed (akatasi)
- Anoreksi

Øget risiko for knoglebrud er observeret hos patienter, der tager denne type medicin.

**Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.**

## 5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Escitalopram Glenmark efter den udløbsdato, der står på blisteren eller pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester .

## 6. PAKNINGSSTØRRELSE OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

**Escitalopram Glenmark indeholder**

Aktivt stof: escitalopram. Hver tablet indeholder 5 mg, 10 mg, 15 mg eller 20 mg escitalopram (som oxalat).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletterne:

Mikrokrystallinsk cellulose (E460), croscarmellosenatrium (E468), magnesiumstearat (E572), kolloid, vandfri silica og talkum

Tabletovertræk:

Hypromellose (E464), titandioxid (E171), macrogol 400

## **Udseende og pakningsstørrelse**

Escitalopram Glenmark foreligger som 5 mg, 10 mg, 15 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter. Tabletterne beskrives nedenfor.

5 mg: Hvid til offwhite, rund, bikonveks, filmovertrukket tablet med "E 1" præget på den ene side og glat på den anden side.

10 mg: Hvid til offwhite, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet med "E 2" præget på den ene side og delekærv på den anden side. Tabletterne kan deles i to lige store halvdele.

15 mg: Hvid til offwhite, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet med "E 3" præget på den ene side og delekærv på den anden side. Tabletterne kan deles i to lige store halvdele.

20 mg: Hvid til offwhite, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet med "E 4" præget på den ene side og delekærv på den anden side. Tabletterne kan deles i to lige store halvdele.

Tabletterne er pakket enten i flad aluminium/aluminiumsbliester eller klar PVC-aclar/aluminiumbliester

Escitalopram Glenmark fås i følgende pakningsstørrelser:

*5 mg filmovertrukne tabletter*

Bliester: 14, 20, 28, 50 og 100

*10 mg filmovertrukne tabletter*

Bliester: 14, 20, 28, 50 og 100

*15 mg filmovertrukne tabletter*

Bliester: 20, 28, 50 og 100

*20 mg filmovertrukne tabletter*

Bliester: 14, 20, 28, 50 og 100

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

## **Indehaver af markedsføringstilladelsen**

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited  
Laxmi House, 2 B Draycott Avenue,  
Kenton, Middlesex HA3 0BU,  
Forenede Kongerige

## **Fremstiller**

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited.  
Building 2, Croxley Green Business Park,  
Croxley Green  
Hertfordshire, WD18 8YA Forenede Kongerige

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.  
Hvězdova 1716/2b, 140 78 Prague 4,  
Tjekkiet

Tillomed Laboratories Limited  
3 Howard Road, Eaton Socon,  
St. Neots, Cambridgeshire, PE19 8ET  
Forenede Kongerige

**Denne indlægsseddel blev senest godkendt 05/2014**