

## INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

### **Kodein DAK 3 mg/ml, oral opløsning** codein

#### **Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har givet Kodein DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

#### **Oversigt over indlægssedlen**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodein DAK
3. Sådan skal du tage Kodein DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

#### **1. Virkning og anvendelse**

Kodein DAK (herefter kaldet Kodein) virker hostestillende. Det virker ved at hæmme hosterefleksen. Det har også en smertestillende effekt mod svage smerter.

Lægen kan have givet dig Kodein for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

#### **2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodein DAK**

##### **Tag ikke Kodein**

- hvis du er overfølsom over for codein eller et af de øvrige indholdsstoffer.

##### **Vær ekstra forsigtig med at tage Kodein**

Tal med lægen, inden du tager Kodein, hvis du har

- nedsat lungefunktion
- astma
- bronkitis med opspyt
- hoste med slim
- har lever- eller nyresvigt

Længere tids behandling med Kodein kan føre til afhængighed.

Kodein har en sløvende bivirkning, som forstærkes, hvis du drikker alkohol.

## **Brug af anden medicin**

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- sovemedicin eller beroligende medicin
- hjertemedicin (kinidin, antiarytmika, betablokkere)
- medicin mod psykiske lidelser
- medicin mod depression (SSRI, venlafaxin)
- smertestillende medicin (opioider)
- medicin mod blærelidelser (tolterodin)
- antibiotika (rifampicin)
- Medicin til bedøvelse (anæstetika)

Kodein oral opløsning indeholder alkohol.

Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke tage Kodein uden først at tale med lægen eller apoteket.

## **Brug af Kodein sammen med mad og drikkevarer**

Du kan tage Kodein i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Hvis du drikker alkohol forstærkes Kodeins sløvende bivirkning.

## **Graviditet og amning**

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

### **Graviditet**

Hvis du er gravid, må du kun tage Kodein efter aftale med lægen.

### **Amning**

Hvis du ammer, må du kun tage Kodein efter aftale med lægen.

## **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Kodein virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

## **Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Kodein**

Kodein indeholder en mindre mængde alkohol (ethanol), mindre end 100 mg per dosis.

Hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke tage Kodein uden først at tale med lægen eller apoteket.

Kodein indeholder sorbitol (E 420). Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

### 3. Sådan skal du tage Kodein DAK

Tag altid Kodein nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Afmål medicinmængden i vedlagte målebæger.

#### Den sædvanlige dosis er

##### Hoste

##### Voksne

10 – 15 ml 2 – 3 gange daglig.

##### Børn

**6 – 14 år:** 5 ml 2 – 3 gange daglig.

**2 – 5 år:** 2½ ml 2 – 3 gange daglig.

Kodein skal generelt gives med stor forsigtighed til børn. Må ikke gives til børn under 2 år uden lægens anvisning

##### Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

##### Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

##### Hvis du har taget for meget Kodein

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Kodein, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er nedsat bevidsthedsniveau evt. bevidstløshed og vejrtrækningsbesvær, eventuelt stop af vejrtrækning, blåfarvning af ansigt og fingre på grund af iltmangel, lavt blodtryk, små pupiller og maveproblemer.

Ved alvorlige overdoseringer kan følgende symptomer forekomme: uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, chok, lungeskader, påvirkning af hjerterytmen, muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne, forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen.

##### Hvis du har glemt at tage Kodein

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

##### Hvis du holder op med at tage Kodein

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

### 4. Bivirkninger

Kodein kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

**Almindelige bivirkninger** (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

**Ikke alvorlige:** Svimmelhed, døsighed, kvalme, opkastning, forstoppelse.

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

**Alvorlige:** Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse på grund af overfølsomhed (anafylaktisk shock), svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle, krampes.

**Ikke alvorlige:** Opstemthed, lavt blodtryk, nældefeber.

**Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

**Alvorlige:** Voldsomme mavesmerter i øvre del af maven og feber på grund af akut betændelse i bugspytkirtlen, forgiftning af nyren (nefrotoksicitet).

**Ikke alvorlige:** Allergi, risiko for afhængighed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger som ikke er nævnt her.

### **Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen**

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er beskrevet i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk), eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## **5. Opbevaring**

Opbevar Kodein utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Tag ikke Kodein efter den udløbsdato, der står på etiketten.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## **6. Yderligere oplysninger**

### **Kodein DAK 3 mg/ml oral opløsning indeholder:**

Det virksomme indholdsstof er codeinphosphathemihydrat. De øvrige indholdsstoffer er ethanol 0,02 vol% og rensset vand. Søddestoffer er saccharinnatrium (E 954) og sorbitol (E 420). Smagsstoffer er levomenthol og solbærsaft. Konserveringsmiddel er kaliumsorbat (E 202).

**Udseende og pakningsstørrelser**

Kodein DAK 3 mg/ml oral opløsning er en rødbrun væske med lugt af solbær.

Kodein DAK 3 mg/ml oral opløsning findes i flasker à 200 ml.

**Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark**

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

**Fremstiller**

Nycomed Pharma AS

Solbærveien 5

N-2409 Elverum

Seneste indlægsseddel kan ses på: [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

**Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2013.**