

## INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

### **Kodein Stærk DAK 8 mg/ml oral opløsning** codein

#### **Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har givet Kodein Stærk DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

#### **Oversigt over indlægssedlen**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodein Stærk DAK
3. Sådan skal du tage Kodein Stærk DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

#### **1. Virkning og anvendelse**

Kodein Stærk DAK (herefter kaldet Kodein Stærk) virker hoste- og smertestillende. Du kan anvende Kodein Stærk ved hoste eller til behandling af svage smerter.

Lægen kan have givet dig Kodein Stærk for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

#### **2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodein Stærk DAK**

##### **Tag ikke Kodein Stærk**

- hvis du er overfølsom over for codein eller et af de øvrige indholdsstoffer.

##### **Vær ekstra forsigtig med at tage Kodein Stærk**

Tal med lægen, inden du tager Kodein Stærk, hvis du har

- nedsat lungefunktion
- astma
- bronkitis med opspyt
- hoste med slim
- har lever- eller nyresvigt

Længere tids behandling med Kodein Stærk kan føre til afhængighed.

Kodein Stærk har en sløvende bivirkning, som forstærkes, hvis du drikker alkohol.

Kodein Stærk er skadelig for alkoholikere.

Da Kodein Stærk indeholder alkohol, må børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme kun tage Kodein Stærk efter aftale med lægen.

### **Brug af anden medicin**

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- sovemedicin eller beroligende medicin
- hjertemedicin (kinidin, antiarytmika, betablokkere)
- medicin mod psykiske lidelser
- medicin mod depression (SSRI, venlafaxin)
- smertestillende medicin (opioider)
- medicin mod blærelidelser (tolterodin)
- antibiotika (rifampicin)
- Medicin til bedøvelse (anæstetika)

Kodein Stærk indeholder alkohol. Du må ikke tage Kodein Stærk, hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen.

### **Brug af Kodein Stærk sammen med mad og drikke**

Du kan tage Kodein Stærk i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Hvis du drikker alkohol forstærkes Kodein Stærk's sløvende bivirkning.

### **Graviditet og amning**

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

#### **Graviditet**

Da Kodein Stærk indeholder alkohol, må du under graviditet kun tage Kodein Stærk efter aftale med lægen.

De må ikke tage Kodein Stærk i de sidste 3 måneder før forventet fødsel. Tal med lægen.

#### **Amning**

Hvis du ammer, må du kun tage Kodein Stærk efter aftale med lægen, da Kodein Stærk indeholder alkohol.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Kodein Stærk virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.

Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

### **Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Kodein Stærk**

Kodein Stærk indeholder 5,7 vol% alkohol (ethanol), det vil sige op til 225 mg alkohol pr. dosis, svarende til 6 ml øl og 2,5 ml vin.

Du må ikke tage Kodein Stærk, hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen.

Kodein Stærk indeholder saccharose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

### **3. Sådan skal du tage Kodein Stærk DAK**

Tag altid Kodein Stærk nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Afmål medicinmængden i vedlagte målebæger.

#### **Den sædvanlige dosis er:**

##### **Hoste**

##### **Voksne**

5 ml 3 gange daglig.

##### **Børn**

Børn under 15 år må kun få Kodein Stærk efter lægens anvisning.

##### **Ældre**

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

##### **Nedsat nyre- og leverfunktion**

Det er nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisninger.

##### **Hvis du har taget for meget Kodein Stærk**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Kodein Stærk, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er nedsat bevidsthedsniveau evt. bevistløshed og vejrtrækningsbesvær, eventuelt stop af vejrtrækning, blåfarvning af ansigt og fingre på grund af iltmangel, lavt blodtryk, små pupiller og maveproblemer.

Ved alvorlige overdoseringer kan følgende symptomer forekomme; uregelmæssig vejrtrækning med vejrtrækningspauser, chok, lungeskader, påvirkning af hjerterytmen, muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin pga. nedbrydning af musklerne, forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga. forstyrrelser i hjernen.

##### **Hvis du har glemt at tage Kodein Stærk**

Hvis du har glemt en dosis Kodein Stærk, tag den da så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, spring da den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.

##### **Hvis du holder op med at tage Kodein Stærk**

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

## 4. Bivirkninger

Kodein Stærk kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

**Almindelige bivirkninger** (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

**Ikke alvorlige:** Svimmelhed, døsighed, kvalme, opkastning, forstoppelse.

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

**Alvorlige:** Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og hals og besvimelse på grund af overfølsomhed (anafylaktisk shock), svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle, kramper.

**Ikke alvorlige:** Opstemthed, lavt blodtryk, nældefeber.

**Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

**Alvorlige:** Voldsomme mavesmerter i øvre del af maven og feber på grund af akut betændelse i bugspytkirtlen, forgiftning af nyren (nefrotoksicitet).

**Ikke alvorlige:** Allergi, risiko for afhængighed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger som ikke er nævnt her.

### Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er beskrevet i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk), eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

## 5. Opbevaring

Opbevar Kodein Stærk utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Tag ikke Kodein Stærk efter den udløbsdato, der står på etiketten.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## 6. Yderligere oplysninger

### Kodein Stærk DAK 8 mg/ml oral opløsning indeholder

Det virksomme indholdsstof er codeinphosphathemihydrat. De øvrige indholdsstoffer er ethanol 5,7 vol% og rensset vand. Søddestof er saccharose.

**Udseende og pakningsstørrelser**

Kodein Stærk DAK 8 mg/ml oral opløsning er en farveløs til gulbrun, klar opløsning med lugt af sprit.

Kodein Stærk DAK 8 mg/ml oral opløsning findes i flasker à 200 ml.

**Indehaver af markedsføringstilladelsen**

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

**Fremstiller**

Nycomed Pharma AS

Solbærveien 5

N-2409 Elverum

Seneste indlægsseddel kan ses på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

**Denne indlægsseddel blev sidst revideret april 2013**