

Indlægsseddel: Information til brugeren

Alomide® 1 mg/ml, øjendråber, opløsning

Lodoxamid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Alomide øjendråber til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
- Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Alomide
3. Sådan skal du bruge Alomide
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Alomide hæmmer allergiske reaktioner i øjnene.. Alomide indeholder det aktive indholdsstof lodoxamid.

Du kan bruge Alomide

- mod allergisk betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjet, der kommer på bestemte tidspunkter af året, og som viser sig ved at øjnene løber, klør og er røde og øjenlågene hævede
- mod betændelseslignende tilstand (inflammation) på grund af anden form for overfølsomhed (allergi)

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Alomide.

Brug ikke Alomide

- hvis du er allergisk over for lodoxamid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Alomide (angivet i punkt. 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Lodoxamid må kun bruges til at dryppe i øjnene.

Du vil muligvis opleve ubehag i øjet, såsom en brændende fornemmelse eller svie, når du starter behandlingen med Alomide. Disse symptomer vil som regel aftage, men hvis de varer ved, bedes du spørge din læge til råds.

Hvis du tager anden medicin, bedes du også læse punktet ”Brug af anden medicin sammen med Alomide”.

Brug af anden medicin sammen med Alomide

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, har gjort det for nylig eller muligvis vil bruge det i fremtiden.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du må ikke bruge Alomide, mens du er gravid eller ammer, medmindre din læge vurderer, at det er nødvendigt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Alomide påvirker ikke evnen til at køre bil eller arbejde med maskiner

Hvis dit syn bliver midlertidigt sløret efter at du har brugt Alomide, skal du vente med at køre bil eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Alomide indeholder benzalkoniumklorid

Hvis du bruger kontaktlinser:

Brug af kontaktlinser frarådes under behandling af en betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjet. Hvis du gerne må bruge kontaktlinser skal du tage kontaktlinserne ud (hårde og bløde), inden du bruger Alomide og vente mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

Alomide indeholder et konserveringsmiddel (benzalkoniumklorid), som kan give øjenirritation og er kendt for at misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser.

3. Sådan skal du bruge Alomide

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er

Voksne og børn over 4 år: 1-2 dråber i det/de angrebne øje/øjne 4 gange daglig.

Børn under 4 år

Du må kun bruge Alomide til børn under 4 år efter aftale med en læge.


Lindring af symptomer som kløe, tåreflåd, rødme og pus kommer normalt indenfor en uge. Det kan være nødvendigt at behandlingen fortsætter i 4 uger. Følg altid lægens anvisning.

Selvom dine symptomer forsvinder, skal du fortsætte behandlingen, så længe som lægen har fortalt dig, for at undgå at sygdommen blusser op igen.


Alomide må kun bruges til at dryppe i øjnene.

Sådan bruger du Alomide korrekt:

Hvis sikkerhedsringen omkring hættens sidder løst, når flasken åbnes, skal den fjernes, før du bruger øjendråberne.




1



2



3



4

1. Hent flasken med Alomide.
2. Vask dine hænder og sæt dig foran et spejl.
3. Skru hættten af flasken.
4. Hold flasken med bunden i vejret mellem tommelfingeren og langefingeren (billede 1).
5. Læn hovedet tilbage. Træk ned i det nedre øjenlåg med en ren finger, indtil der dannes en "lomme" mellem det nedre øjenlåg og dit øje. Dråben skal placeres der.
6. Hold spidsen tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør de nemmere.
7. Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, øjenomgivelser eller andre overflader med pidsen af flasken. Det kan forurene øjendråberne i flasken.
8. Klem ikke om flasken da den er designet på en sådan måde, at et let tryk i bunden af flasken er alt, der skal til (billede 2).
9. Tryk let på flaskens bund for at frigøre en dråbe Alomide ad gangen (billede 3).
10. Efter brug af Alomide skal du lukke øjet, og forsigtigt trykke med en finger mod øjenkrogen in mod næsen i 2 minutter (billede 4). Det forhindrer, at Alomide optages i resten af kroppen.
11. Hvis du bruger Alomide i begge øjne, gentages trin 4 til 10 for det andet øje.
12. Skru hættten godt fast på flasken umiddelbar efter brug.

Hvis en dråbe ikke rammer øjet, så prøv igen.

Hvis du bruger andre øjenpræparater så som øjensalve eller -gel, skal der gå mindst 5 minutter imellem Alomide og de øvrige præparater. Øjensalve og -gel skal bruges sidst.

Hvis du har taget for meget Alomide

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Alomide, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har brugt for meget Alomide, skal du skylle det hele væk med lunkent vand. Dryp ikke flere dråber i øjnene, før det er tid til næste dosis.

Hvis du ved et uheld kommer til at sluge Alomide, skal du straks kontakte lægen, apotekspersonalet eller skadestuen.

Symptomer på en oral overdosis kan omfatte: fornemmelse af varme, rødmen af huden, kvalme, opkastning, sveden, mavekrampe, hovedpine, svimmelhed, træthed, løs afføring, blodtryksstigning, som vender tilbage til det normale efter kort tid.

Hvis du har glemt at tage Alomide

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis det snart er tid til næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

Hvis du holder op med at tage Alomide

Du må ikke holde op med at tage medicinen før tid, heller ikke selvom dine symptomer er forsvundne. Hvis du holder op med at tage medicinen for hurtigt, kan dine symptomer vende tilbage.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Reaktioner i øjet: ubehag i øjet.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

Reaktioner i øjet: tørhed, kløe eller rødme i øjet, sløret syn, skorpedannelse på øjenlåg, øget tåreproduktion, blodoverfyldning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

Generelle bivirkninger: hovedpine, svimmelhed og træthed, kvalme, varmekølelse

Reaktioner i øjet: øjenirritation eller øjensmerter, hævelse omkring øjet, rødme og tåredannelse pga. allergi, hævelse i øjet, sekret fra øjet, synsforstyrrelser (uklart syn), øjenlågslidelse (epiteliopati), trætte øjne, hævede øjenlåg, øjenirritation og sløret syn (keratopati), hvide aflejringer på øjets overflade (hornhinden).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede):

Reaktioner i øjet: betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjet, nedsat syn, arvæv på hornhinden, betændelseslignende tilstand (inflammation) i øjenlåsranden, symptomer for forkammerceller, hornhindebetændelse, beskadigelse på hornhinden, rifter i hornhinden

Generelle bivirkninger: allergi, dødsghed, dårlig smag i munden, nysen, ubehag i maven, udslæt, tørhed i næsen.

Ikke kendte (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data):

Generelle bivirkninger: unormal pulsstigning.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med dine læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Alomide utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Kassér flasken 4 uger efter åbning.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Alomide indeholder:

- Aktivt stof: lodoxamid. Hver ml opløsning indeholder lodoxamidotrometamol svarende til 1 mg lodoxamid.
- Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), mannitol (E421), hypromellose, natriumcitrat, citronsyremonohydrat, dinatriumedetat-dihydrat, tyloxapol, natriumhydroxid og/eller saltsyre (til at justere pH) og rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Alomide er en klar, farveløs opløsning, der leveres i en 10 ml plastflaske (DROPTAINER) med skruelåg.

Pakningsstørrelse: 1 x 10 ml

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR
Storbritannien.

Fremstiller

S.A. Alcon-Couvreur N.V.
Rijksweg 14
2870 Puurs
Belgien.

Repræsentant for Danmark

Alcon Nordic A/S
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Tlf: 3636 4300

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2015.