

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Kodipar® 500 mg/30,6 mg filmovertrukne tabletter Paracetamol / Codein

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Kodipar® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Kodipar®
3. Sådan skal du tage Kodipar®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Kodipar® er et smertestillende lægemiddel til behandling af akutte, kortvarige smerter.

Lægen kan have givet dig Kodipar® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE KODIPAR®

Tag ikke Kodipar® hvis du:

- er overfølsom over for paracetamol, codein eller et af de øvrige indholdsstoffer
- har stærkt nedsat leverfunktion

Vær ekstra forsigtig med at tage Kodipar®



Tal med lægen inden du tager Kodipar®, hvis du:

- har nedsat lever- eller nyrefunktion
- lider af kronisk alkoholisme
- har vejrtrækningsbesvær eller astma
- er afhængig af morfin eller morfinlignende lægemidler (opioider)

- har nedsat binyrebarkfunktion (Addisons sygdom)
- har øget kranietryk (på grund af væskeophobning, f.eks. efter et slag)
- har nedsat stofskifte
- har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller urinrørsforsnævring
- har akutte, voldsomme mavesmerter
- har svækket ernæringstilstand, f.eks. på grund af et alkoholmisbrug, appetitløshed eller fejlnæring
- er ældre eller svagelig

Kodipar® kan virke vanedannende. Vanemæssig brug af smertestillende lægemidler kan medføre nyresvigt.

Hvis du tager anden medicin samtidig med Kodipar®, skal du sikre dig, at denne ikke indeholder paracetamol, da der kan være risiko for overdosering. Overskrides den anbefalede dosis, kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen med Kodipar®.

Kodipar® har en sløvende bivirkning, som forstærkes, hvis du drikker alkohol.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen, hvis du er i behandling med anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin)
- medicin mod kvalme og opkastning (metoclopramid, domperidon)
- blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin)
- beroligende medicin eller sovemedicin (barbiturater, benzodiazepiner, hypnotika)
- medicin mod for megen mavesyre eller mavesår
- muskelafslappende medicin
- epilepsimedicin (phenytoin, carbamazepin)
- medicin mod urinsyreigt (probenecid)
- medicin mod tuberkulose (rifampicin)
- medicin mod infektion (chloramphenicol)

Brug af Kodipar® sammen med mad og drikke

Du kan tage Kodipar® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Hvis du drikker alkohol forstærkes Kodipar®'s sløvende bivirkning.

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Kodipar® efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Kodipar® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Kodipar® virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.
Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE KODIPAR®

Tag altid Kodipar® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletterne med rigelig væske; du kan evt. dele eller knuse tabletterne.

Den sædvanlige dosis er **Voksne**

1 – 2 tabletter 1 – 4 gange daglig. Højest 8 tabletter i døgnet. Behandlingen må strække sig over maksimalt 5 døgn.

Børn

Børn under 15 år må kun få Kodipar® efter lægens anvisning.

Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det er nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Kodipar®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Kodipar®, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering kan være bleghed, kvalme, opkastning, anoreksi, mavesmerter, varig leverskade, leversvigt, akut nyresvigt, hjernebetændelse, uregelmæssig hjerterytme, betændelse i bugspytkirtlen, vejrtrækningsbesvær, for lavt blodsukker, blålig hud, kramper (hos børn), døsighed, koma, død.

Hvis du har glemt at tage Kodipar®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Kodipar®

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Kodipar® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Døsighed; hovedpine; kvalme; forstoppelse; opkastning; svedeture; træthed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Vejtrækningsbesvær (hos patienter med øget kranietryk).

Ikke alvorlige: Svimmelhed; synsforstyrrelser (ved høje doser); mundtørhed; galdevejsproblemer.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Leverforgiftning; leverskade som kan resultere i leversvigt; ændring i blodets sammensætning.

Ikke alvorlige: Allergisk reaktion; øresusen; stakåndethed; mavesmerter; udslæt; nældefeber; kløe; rødme i huden; søvnforstyrrelser.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Væskeophobning under huden og i slimhinder især ved læber og hals; pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse på grund af overfølsomhed (anafylaksi); voldsomme mavesmerter og feber på grund af akut betændelse i bugspytkirtlen; blodmangel; nyreskade; vejtrækningsbesvær.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Ved høje doser kan der forekomme besvimelse (kan være alvorlig) og opstemthed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Kodipar® utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for Kodipar®.

Brug ikke Kodipar® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kodipar® 500 mg/30,6 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktive stoffer: 500 mg paracetamol og 30,6 mg codeinphosphathemihydrat.

Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose (E 464), magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse, mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520) og talcum (E 553b).

Farvestof: Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Kodipar® er en hvid, oval, filmovertrukken tablet med delekærv.

Kodipar® findes i pakningsstørrelser à 20, 40 og 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.Indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2011