

INDLÆGSSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Koffein-fenazon DAK tabletter 50/500 mg
Caffein/phenazon

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Koffein-fenazon DAK uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Koffein-fenazon DAK
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Koffein-fenazon DAK
3. Sådan skal du tage Koffein-fenazon DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Koffein-fenazon DAK er et smertestillende lægemiddel til behandling af svage smerter.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Koffein-fenazon DAK for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE KOFFEIN-FENAZON DAK

Tag ikke Koffein-fenazon DAK hvis du:

- er overfølsom over for caffein, phenazon eller et af de øvrige indholdsstoffer
- lider af en arvelig stofskiftesygdom (porfyri)
- har mangel på enzymet glucose-6-phosphat dehydrogenase
- har svært nedsat nyrefunktion
- har frisk blødning fra mave-tarmkanalen (blodigt opkast og/eller sort afføring)
- tidligere har haft astma, væskeophobning under huden især ved læber og hals, nældefeber, snue eller andre allergiske reaktioner udløst af acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler
- samtidig er i behandling med det smertestillende lægemiddel ketorolac
- er gravid

Vær ekstra forsigtig med at tage Koffein-fenazon DAK

Tal med lægen inden du tager Koffein-fenazon DAK, hvis du:

- har eller har haft sygdomme relateret til mave-tarmkanalen
- har eller har haft mavesår
- har nedsat leverfunktion
- har forhøjet blodtryk eller en hjertelidelse, som forværres af væskeophobning

- har eller har haft knoglemarvs- eller blodsygdomme
- er i behandling med blodfortyndende medicin.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.

Brug af anden medicin

Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder især:

- blodfortyndende medicin
- vanddrivende medicin
- hjertemedicin (adenosin)
- medicin mod infektion (ciprofloxacin, ofloxacin, levofloxacin)
- smertestillende medicin (ketorolac)
- medicin, der bruges i forbindelse med organtransplantation (ciclosporin)
- medicin mod alkoholmisbrug (disulfiram)
- medicin mod psykoser (clozapin)

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nyligt. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Koffein-fenazon DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Koffein-fenazon DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Koffein-fenazon DAK, hvis du er gravid.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Koffein-fenazon DAK, da Koffein-fenazon DAK går over i modermælken. Tal med lægen.

Vær opmærksom på at du under længerevarende behandling med Koffein-fenazon DAK kan have sværere ved at blive gravid. Din behandling bør derfor være så kortvarig som mulig og i lavest mulig dosis.

Trafik og arbejdssikkerhed

Koffein-fenazon DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE KOFFEIN-FENAZON DAK

Hvis din læge har ordineret Koffein-fenazon DAK dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 - 2 tabletter højst 3 gange daglig i højst 1 - 2 uger.

Tag tabletten med rigelig væske. Du kan eventuelt dele eller knuse tabletten

Børn

Du må kun bruge Koffein-fenazon DAK til børn under 15 år efter aftale med en læge.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Nedsat leverfunktion: Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Kontakt lægen.

Nedsat nyrefunktion: Hvis du har svært nedsat nyrefunktion, må du ikke tage Koffein-fenazon DAK.

Hvis du har taget for mange Koffein-fenazon DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Koffein-fenazon DAK, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tegn på overdosering kan være kvalme, opkastning, angst, rystelser, krampeanfald, hurtig puls, ændret hjerterytme, lavt blodtryk, lavt kaliumindhold i blodet, ændring af blodets surhedsgrad, overstadighed og senere dødsghed, koma, høj legemstemperatur, shock. Yderst sjældent ses leverbeskadigelse.

Hvis du har glemt at tage Koffein-fenazon DAK

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. BIVIRKNINGER

Koffein-fenazon DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Alvorlige: Overfølsomhedsreaktioner (især hos personer med astma, kroniske luftvejsinfektioner eller overfølsomhed over for andre smertestillende lægemidler),

Ikke alvorlige: Hurtig puls, rystelser, hovedpine, kvalme, mavesmerter, opkastning, irritation af maveslimhinden, oppustethed, øget vandladning, uro, søvnløshed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Tinnitus.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Alvorlig nyrepåvirkning

Ikke alvorlige: Rødmen af huden, nældefeber, udslæt, synsforstyrrelse.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Blodmangel med gulsot

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Koffein-fenazon DAK utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Koffein-fenazon DAK ved almindelig temperatur.
Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De / du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Koffein-fenazon DAK tabletter 50/500 mg indeholder:

De virksomme indholdsstoffer i Koffein-Fenazon DAK er 50 mg caffein og 500 mg phenazon. De øvrige indholdsstoffer er kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), og vandfri kolloid silica (E 551).

Udseende og pakningsstørrelser

Koffein-fenazon DAK er hvide, ovale tabletter med delekærv.

Koffein-fenazon DAK findes pakningsstørrelser à 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk
Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Revideret marts 2012