

INDLÆGSSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Magnesia DAK 500 mg, filmoverttrukne tabletter

Magnesiumoxid

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer

- Du kan få Magnesia DAK uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Magnesia DAK.
- Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 8 dage.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnesia DAK
3. Sådan skal du tage Magnesia DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Magnesia DAK har en afførende virkning og virker neutraliserende på mavesyren.

Du kan bruge Magnesia DAK ved:

- forstoppelse
- mavesår
- sår på tolvfingertarmen
- for megen mavesyre
- halsbrand
- sure opstød og svien i maven
- katar i spiserøret

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Magnesia DAK for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MAGNESIA DAK

Tag ikke Magnesia DAK, hvis du:

- er overfølsom over for magnesium eller et af de øvrige indholdsstoffer
- har nedsat nyrefunktion

Vær ekstra forsigtig med at tage Magnesia DAK

Tal med lægen hvis du:

- har mavesår, da Magnesia DAK kan dække over mere alvorlige sygdomme

- tager Magnesia DAK i længere tid, da langvarig brug af Magnesia DAK kan ændre kroppens indhold af kalk og fosfat

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du er i behandling med:

- D-vitamin (calcitriol)
- antibiotika (ciprofloxacin, lomefloxacin, moxifloxacin, norfloxacin og ofloxacin, tetracyklin)
- medicin mod malaria (chloroquin)
- medicin, der nedsætter immunforsvaret (mycophenolatmofetil)
- medicin (estramustin) mod kræft i blærehalskirtlen (prostata)
- antabus (disulfiram)

Der bør gå 2 timer mellem indtagelse af Magnesia DAK og:

- hjertemedicin (digoxin, sotalol)
- medicin mod svampeinfektion (itraconazol, ketoconazol)
- medicin mod gigt (penicillamin)
- medicin mod urinsur gigt (allopurinol)
- medicin til behandling af osteoporose (alendronat, etidronat)
- enterotabletter, da Magnesia DAK kan hæmme virkningen af denne type medicin.

Dosis af følgende lægemidler skal tilpasses, hvis du også tager Magnesia DAK (kontakt lægen):

- smertestillende og blodfortyndende medicin (acetylsalicylsyre)
- hjertemedicin (flecainid)
- medicin til behandling af mani (lithium)
- allergimedicin (pseudoephedrin)
- smertestillende medicin (diflunisal)

Da Magnesia DAK hæmmer optagelsen af jern, skal der være et tidsinterval på mindst 1½ time mellem indtagelse af Magnesia DAK og jern.

Brug af Magnesia DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Magnesia DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan tage Magnesia DAK under graviditet.

Amning

Du kan tage Magnesia DAK, selv om du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Magnesia DAK påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MAGNESIA DAK

Hvis din læge har ordineret Magnesia DAK til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Forstoppelse: 2 – 3 tabletter efter behov.

Ved for megen mavesyre og katar i spiserøret: 1 - 2 tabletter efter behov.

Mavesår og sår på tolvfingertarmen: 2 – 3 tabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltiderne samt ved sengetid.

Det er vigtigt, at du sørger for at drikke rigelig med vand, da dette har betydning for den afførende virkning. Den afførende virkning indtræder efter 6 – 8 timer.

Børn:

Børn under 15 år må kun få Magnesia DAK efter lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Magnesia DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Magnesia DAK, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tegn på overdosering er kvalme, opkastning, ansigtsrødmen, påvirkning af centralnervesystemet og åndedrætsorganerne, muskelsvagthed, nedsatte reflekser og lammelse, for lavt blodtryk, langsom puls og hjertestop.

Hvis du har glemt at tage Magnesia DAK

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Magnesia DAK

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Magnesia DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Hovedpine, diaré, luftafgang fra tarmen, mavesmerter, utilpashed, kvalme, opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Magnesiumforgiftning (hos personer med nedsat nyrefunktion), som viser sig ved sløvhed, muskellammelse eller hjertesvigt.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Magnesia DAK utilgængeligt for børn.

Glas: Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Blister: Opbevar ikke Magnesia DAK ved temperaturer over 30 °C.

Anvend ikke Magnesia DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Magnesia DAK 500 mg filmovertukne tabletter indeholder

Aktivt stof: Magnesiumoxid tilsat som magnesiumhydroxid.

Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose (E 464), kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), povidon (E 1201), propylenglycol (E 1520), silica kolloid vandfri (E 551) og talcum (E 553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Magnesia DAK er en hvid, oval, filmovertrukken tablet.

Magnesia DAK findes i pakningsstørrelser à 40, 100 og 250 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har De yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er De velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2009