

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Magnyl® DAK 500 mg tabletter **acetylsalicylsyre**

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Magnyl DAK uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Magnyl DAK.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnyl DAK
3. Sådan skal du tage Magnyl DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Magnyl DAK (herefter kaldet Magnyl) er et smertestillende lægemiddel mod svage smerter f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt gigttildelser og andre betændelseslignende tilstande.

Magnyl kan også bruges ved akutte eller kroniske hjertesygdomme til at forebygge dannelsen af blodpropper.

Hvis din læge har sagt at du skal tage Magnyl for noget andet skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Magnyl DAK

Tag ikke Magnyl hvis du:

- er overfølsom over for acetylsalicylsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer
- tidligere har fået allergiske eller astma-lignende symptomer ved brug af smertestillende medicin (af typen NSAID eller salicylater)
- har mavesår (blodigt opkast og/eller sort afføring)
- har tendens til blødning f.eks. på grund af K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt antal blodplader
- har stærkt nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion
- er gravid i 7. – 9. måned

Børn under 15 år med feber må ikke få Magnyl.

Vær ekstra forsigtig med at tage Magnyl

Vær opmærksom på følgende:

- Du må ikke tage Magnyl sammen med smertestillende medicin (NSAID) i længere tid. Det kan øge risikoen for bivirkninger.
- Ældre må normalt ikke tage Magnyl i længere tid på grund af risiko for blødning fra mave og tarm.
- Magnyl kan give åndenød, astmaanfald eller andre overfølsomhedsreaktioner som kløe og nældefeber, f.eks. hvis du har astma, høfeber, næsepolypper, eller andre kroniske luftvejssygdomme.
- Magnyl kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid.

Tal med lægen inden du tager Magnyl, hvis du:

- har astma, vejrtrækningsbesvær eller allergiske lidelser
- har eller har haft mave-tarmsygdom, f.eks. mavesår eller blødning fra mave eller tarm.
- har fordøjelsesbesvær med halsbrand eller sure opstød (dyspepsi)
- har nedsat lever- eller nyrefunktion
- samtidig er i behandling med anden blodfortyndende medicin som vitamin K-antagonister eller heparin

Magnyl må ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.



Hvis du skal opereres, skal du stoppe behandlingen med Magnyl nogle dage før operationen. Det gælder også, hvis du f.eks. skal have trukket en tand ud. Spørg din læge.

Oplys altid ved blod- eller urinprøvekontrol, at du er i behandling med Magnyl. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald under behandlingen med Magnyl.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- medicin mod for megen mavesyre (syreneutraliserende medicin)
- medicin til behandling af sukkersyge
- blodfortyndende medicin (phenprocoumon, warfarin, clopidogrel, ticlopidin, heparin)
- visse typer hjertemedicin (ACE hæmmere, abciximab, tirofiban, eptifibatid, quinidin)

- vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton)
- smertestillende medicin (COX-2 hæmmere, NSAID f.eks ibuprofen). Du skal tage Magnyl mindst 2 timer før du tager ibuprofen.
- medicin mod urinsur gigt (probenecid, sulfinpyrazon)
- medicin mod leddegigt, svær psoriasis eller kræft (methotrexat)
- medicin mod grøn stær (acetazolamid)
- medicin mod epilepsi (valproat)
- binyrebarkhormoner
- medicin mod mani og depression (SSRI)
- vaccine mod skoldkopper
- naturlægemidler eller kosttilskud, der indeholder Ginkgo biloba

Fortæl lægen at du er i behandling med Magnyl hvis du skal:

- vaccineres mod skoldkopper (Varicella)

Brug af Magnyl sammen med mad og drikke

Du kan tage Magnyl i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Magnyl, hvis du er gravid i 7. – 9. måned. I de første 6 måneder af graviditeten kan Magnyl, anvendes i så kort tid som mulig og i lavest mulige dosis og kun efter lægens anvisning.

Kvinder der planlægger at blive gravide

Hvis du planlægger at blive gravid, skal du være opmærksom på, at du under længerevarende behandling med Magnyl kan have sværere ved at blive gravid. Din behandling bør derfor være så kortvarig som mulig og i lavest mulige dosis.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Magnyl hvis det er aftalt med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Magnyl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Magnyl

Hvis din læge har ordineret Magnyl til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletterne med rigelig væske. Du kan evt. dele eller knuse tabletterne.

Den sædvanlige dosis er:

Smertetilstande:

Voksne: 1 – 2 tabletter højst 4 gange dagligt.

Børn over 2 år: 50 mg pr. kg kropsvægt i døgnet fordelt på 2–3 doser i højst 2 dogn.

Gigttilidelser

Voksne: 6 – 8 tabletter i døgnet, fordelt på 2–3 doser.

Børn over 2 år: 50 – 100 mg pr. kg kropsvægt i døgnet.

Magnyl må ikke anvendes til børn under 2 år uden lægens anvisning.

Børn under 15 år med feber må ikke få Magnyl.

Ældre

På grund af risiko for blødning i mave-tarmsystemet bør du undgå langvarig brug af Magnyl. Følg altid lægens anvisning, da lægen har vurderet, hvad der er bedst for dig.

Nedsat lever- og nyrefunktion:

Det kan være nødvendigt at justere dosis. Kontakt lægen.

Ved svært nedsat lever- eller nyrefunktion bør Magnyl ikke anvendes.

Hvis du har taget for mange Magnyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Magnyl, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Tegn på overdosering (ved høje doser gennem længere tid) kan være:

Feber, hurtig vejrtrækning, tinnitus, søvnligtede sløvhedstilstand, mild dehydrering, kvalme, opkastning, forstyrrelse af kroppens syre-base-balance.

Tegn på en pludselig eller svær forgiftning, som følge af overdosering kan være:

lavt blodsukker (især hos børn), hjernelidelse (forvirring, svær hovedpine, uro og påvirket bevidsthed), koma, lavt blodtryk, vand i lungerne, kramper, blødningsforstyrrelse, væske i hjernen, uregelmæssig hjerterytme. Doser over 300 mg/kg kan give nedsat nyrefunktion, og doser over 500 mg/kg kan være dødelige.

Hvis du har glemt at tage Magnyl

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

4. Bivirkninger

Magnyl kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Ikke alvorlige: Blodet er længere tid om at størkne, mavesmerter, sure opstød, halsbrand.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1–10 ud af 100 behandlede):

Alvorlige: Vejrtrækningsbesvær hos astmapatienter.

Ikke alvorlige: Tendens til blødninger, hovedpine, søvnløshed, irritation samt smerter eller ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen, kvalme, opkastning, diarré.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlige: Skjulte indre blødninger, allergisk reaktion (anafylaksi), væskeophobning under huden især ved læber og hals, blødende sår i den øvre del af mave-tarmkanalen og blodigt opkast, samt sort afføring.

Ikke alvorlige: Svimmelhed, døsighed, tinnitus, åndenød, nældefeber.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Blødninger i hjernen, blødning fra den øvre del af mave-tarmkanalen, hul på tarmen.

Ikke alvorlige: Blodmangel, gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer hos patienter med medfødt glucose-6-phosphat dehydrogenase, midlertidigt tab af hørelsen (dosisrelateret), lavt blodsukker, blødende betændte blodkar med feber, forstyrrelser i nyrefunktionen.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Forstyrrelser i dannelsen af de forskellige blodlegemer, Reyes syndrom udtrykt ved feber og ændring i blodets sammensætning, blodmangel (aplastisk anæmi), afskalning af huden.

Ikke alvorlige: Øget tendens til infektioner (for få hvide blodlegemer), betændelse i munden eller spiserøret, sår i nedre del af mave-tarmkanalen, forsnævring af tarmen, tarmbetændelse, forværring af irriteret tyktarm, mild leverbetændelse i forbindelse med virus sygdom (dosisrelateret), blæreformet udslæt og betændelse på huden, rødmen af huden, udslæt.

Magnyl kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. på grund af påvirkning af leveren og forandringer i blodet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Magnyl utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Magnyl ved almindelig temperatur.

Brug ikke Magnyl efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Magnyl DAK 500 mg tabletter indeholder:

Det virksomme indholdsstof er acetylsalicylsyre 500 mg. De øvrige indholdsstoffer er kartoffelstivelse, magnesiumhydroxid, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse, mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460).

Udseende og pakningsstørrelser

Magnyl DAK er ovale, hvide tabletter med delekærv.

Magnyl DAK findes i pakningsstørrelser à 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Takeda Pharma A/S

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2013