

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Marevan[®] 2,5 mg tabletter warfarinnatrium

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Marevan[®] til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Marevan[®]
3. Sådan skal du tage Marevan[®]
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Marevan[®] anvendes til forebyggelse og behandling af blodpropper. Marevan[®] virker ved at nedsætte blodets evne til at størkne.

Lægen kan have givet dig Marevan[®] for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE MAREVAN[®]

Tag ikke Marevan[®] hvis du:

- er overfølsom (allergisk) over for warfarinnatrium eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
- er gravid i 1.- 3. måned eller er i de sidste fire uger af graviditeten
- har stærkt nedsat leverfunktion
- har øget tendens til blødning og
 - blødninger i maven, tarmene eller har åreknuder i spiserøret
 - alvorlige sår inklusive operationssår
 - udtalt åreforkalkning eller alvorligt forhøjet blodtryk
 - betændelse i hjertet, som skyldes bakterier
 - skal have taget prøve af rygmarvs-/hjernevæsken.

Du må ikke tage naturlægemidler, der indeholder prikbladet perikon, mens du er i behandling med Marevan[®].

Vær ekstra forsigtig med at tage Marevan[®]

Vær opmærksom på følgende:

- Ved behandling med Marevan[®] er risikoen for blødninger større. Risikoen bliver dog mindre, hvis behandlingen er velkontrolleret. Lægen vil derfor kontrollere dit blods evne til at størkne, når du begynder behandlingen med Marevan[®] og løbende under hele behandlingen.
- Hvis du skal opereres eller have trukket en tand ud, skal du fortælle lægen eller tandlægen, at du er i behandling med Marevan[®].
- Virkningen af Marevan[®] kan ændres af pludselig sygdom som f.eks. diaré eller opkastninger. Kontakt derfor lægen, hvis du bliver syg.
- Ved samtidig behandling med smertestillende medicin (NSAID-præparater og acetylsalicylsyre) har du en større blødningsrisiko, især fra maven og tarmen. Tal med lægen.
- Hvis du har erfaring for, at du reagerer anderledes end andre på medicin, skal du tale med lægen. Det kan også gælde for Marevan[®].
- Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Marevan[®]. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- medicin mod hjerte- og kredsløbsslidelser (amiodaron, propafenon, bosentan, abciximab, eptifibatid, clopidogrel, heparin, tirofiban)
- medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin, simvastatin, fluvastatin, gemfibrozil, rosuvastatin)
- hormoner (testosteron, skjoldbruskkirtelhormoner)
- medicin mod infektion (penicillin, rifampicin, miconazol, ciprofloxacin, azithromycin, clarithromycin, erythromycin, chloramphenikol, sulfamethoxazol)
- medicin mod svamp (fluconazol, itraconazol, ketoconazol, metronidazol)
- medicin mod HIV virus (ritonavir, nevirapin)
- medicin mod mavesår (cimetidin)
- smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, paracetamol, phenylbutazon, NSAID-præparater, tramadol)
- medicin mod gigts (leflunomid)
- medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, fosphenytoin)
- medicin mod depression (amitriptylin, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin)
- medicin i forbindelse med cancerbehandling (aminoglutethimid, azathioprin, fluorouracil, capecitabin, imatinib, ifosfamid, tamoxifen, aprepitant)
- medicin til alkoholafvænning (disulfiram)
- naturlægemidler (prikbladet perikum, ginseng)
- kosttilskud, der indeholder A, E og K-vitamin, coenzym Q10

Brug af Marevan[®] sammen med mad og drikke

Du skal tage Marevan[®] tabletter med et glas vand.

Undgå alkohol, da alkohol kan påvirke effekten af Marevan[®]. Større kostændringer (for eksempel til vegetarkost) kan have indflydelse på effekten af Marevan[®]. Tal med lægen.

Effekten af Marevan[®] påvirkes, hvis du indtager tranebær, spiser avocado eller mad, som indeholder K-vitamin (for eksempel kål, broccoli og spinat).

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Marevan[®] i de første 3 måneder eller i de sidste 4 uger af graviditeten. I den mellemliggende periode, må du kun tage Marevan[®] efter aftale med lægen, da det kan forårsage misdannelser og blødninger hos fosteret og i enkelte tilfælde fosterdød.

Amning

Du må gerne amme, når du tager Marevan[®].

Trafik- og arbejdssikkerhed

Marevan[®] påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Marevan[®]

Marevan[®] indeholder lactose. Kontakt derfor lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE MAREVAN[®]

Tag altid Marevan[®] nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tag tabletten på samme tidspunkt hver dag.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Dosis er individuel og er afhængig af din sygdom, og hvordan du reagerer på Marevan[®]. Din læge bestemmer derfor, hvilken dosis du skal have, og hvor længe du skal have den. Behandlingen kræver hyppig kontrol med blodprøver, hvor blodets evne til at størkne måles (INR-måling).

Børn:

Dosis afhænger af barnets vægt og tilstand. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Marevan[®]

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Marevan[®], end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på at du har taget for mange Marevan[®] kan være: Øget tendens til blødning, næseblod, tandkødsblødning, bleghed, blodansamling omkring led og balder, blod i urin og afføring, rygsmerte, blødende læber, slimhindeblødning, mavesmerter, opkastning og udslæt med små hudblødninger. Senere kan opstå lammelse (på grund af hjerneblødning), besvimmelse på grund af massive blødninger og død.

Hvis du har glemt at tage Marevan[®]

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Marevan[®]

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Marevan[®] kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Blødning: For eksempel næseblod, let ved at få blå mærker, blod i urinen, ophostning af blod, tandkødsblødning, maveblødning, blødning fra skeden, forlængelse af eksisterende blødning efter operation eller tilskadekomst (kan være alvorlig).

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Øget følsomhed over for det aktive indholdsstof efter langvarig behandling.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Bleghed og træthed på grund af blodmangel (kan være alvorlig), opkastning, mavesmerter, kvalme og diaré.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Gulsot (alvorlig), smerter over lænden eventuelt også med feber eller blod i urinen på grund af nyrebetændelse eller nyresten (alvorlig), overfølsomhedsreaktioner (kan være alvorlig), betændelse i blodkar (kan være alvorlig), eksem, udslæt, nældefeber, kløe og hårtab.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Kolesterolansamling i blodet, som kan give blodpropper (alvorlig).

Marevan[®] kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver af for eksempel leverfunktion og kolesterol, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Marevan[®] utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Brug ikke Marevan[®] efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Marevan[®] 2,5 mg tabletter indeholder

Aktivt stof: Warfarinnatrium.

Øvrige indholdsstoffer: Calciumhydrogenphosphatdihydrat, lactose, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse, povidon (E 1201).

Farvestof: Indigotin (E 132).

Udseende og pakningsstørrelser

Marevan[®] tabletter er lyseblå og markeret med et kryds.

Marevan[®] tabletter fås i pakninger à 100, 250 og 500 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret marts 2009