

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Strattera® 10 mg, 18 mg, 25 mg og 60 mg hårde kapsler Atomoxetin

Det er vigtigt, at du ved dette om din medicin

Denne medicin bruges til behandling af ADHD

- ADHD står for "Attention Deficit Hyperactivity Disorder"
- Medicinen hjælper på aktiviteten i din hjerne. Den kan hjælpe med at forbedre din opmærksomhed, forbedre din koncentrationsevne og kan gøre dig mindre impulsiv.
- Du bør også få anden hjælp for ADHD samtidig med denne medicin.

Læs afsnit 1 for flere oplysninger.

Før du tager denne medicin, skal du tale med din læge, hvis du:

- Har psykiske problemer
- Har problemer med hjertet eller kredsløbet
- Har alvorlige problemer med blodkarrene i din hjerne, som f.eks. slagtilfælde.

Læs afsnit 2 for flere oplysninger.

Når du tager denne medicin:

- Gå regelmæssigt til læge, da din læge skal kontrollere, hvordan medicinen virker.
- Du må ikke stoppe med at tage medicinen uden først at have talt med din læge.
- Hvis du tager medicinen i mere end 1 år, kan din læge stoppe behandlingen for at se, om du stadig har brug for den.
- De mest almindelige bivirkninger hos børn og unge er: Hovedpine, mavepine, ingen sultfølelse, kvalme eller opkastning, søvnighed, forhøjet blodtryk, forhøjet puls.
- De mest almindelige bivirkninger hos voksne er: Kvalme, mundtørhed, hovedpine, ingen sultfølelse, problemer med at sove, forhøjet blodtryk, forhøjet puls.

Læs afsnit 3 og 4 for flere oplysninger.

Kontakt straks din læge, hvis noget af følgende sker:

- Dit humør og hvordan du har det, ændrer sig
- Du oplever problemer med dit hjerte f.eks. hurtig eller unormal hjerterytme.

Læs afsnit 2 og 4 for flere oplysninger.

Resten af denne indlægsseddel indeholder flere detaljer og andre vigtige oplysninger om sikker og effektiv brug af denne medicin.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du eller dit barn har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Denne indlægsseddel er skrevet i afsnit:

Afsnit 1 til 6 er til forældre og andre voksne (sometider kaldet "dine væger").

Det sidste afsnit er et særligt afsnit for børn og unge.

Alle afsnit er dog skrevet, så de kan læses af eller sammen med barnet eller den unge, som tager medicinen.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Strattera®
3. Sådan skal du tage Strattera®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.VIRKNING OG ANVENDELSE

Anvendelse

Strattera® indeholder atomoxetin og bruges til behandling af ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Det bruges til

- børn på 6 år og ældre

- unge

- voksne

Det bruges kun som en del af den samlede behandling af sygdommen, som også kræver behandling, der ikke omfatter medicin, som f.eks. vejledning og adfærdsterapi.

Det er ikke beregnet til behandling af ADHD hos børn under 6 år, da man ikke ved, om lægemidlet virker eller er sikkert at bruge hos disse.

Hos voksne bruges Strattera® til at behandle ADHD, når symptomerne er

meget generende og påvirker arbejdet eller det sociale liv, og når der har været symptomer på sygdommen i barndommen.

Virkning

Strattera® øger mængden af noradrenalin i hjernen. Noradrenalin er et kemisk stof, der produceres naturligt i hjernen. Noradrenalin øger opmærksomheden og mindsker impulsiviteten og hyperaktiviteten hos patienter med ADHD. Dette lægemiddel er ordineret for at hjælpe med at kontrollere symptomerne på ADHD. Dette lægemiddel er ikke centralt stimulerende og er derfor ikke vanedannende.

Når du er begyndt at tage dette lægemiddel, kan der gå nogle få uger, før du oplever en forbedring af symptomerne.

Om ADHD

Børn og unge med ADHD kan have:

- Svært ved at sidde stille og
- svært ved at koncentrere sig.

De kan ikke gøre for, at de ikke kan disse ting. Mange børn og unge kæmper med dette. Men med ADHD kan det skabe problemer i hverdagen. Børn og unge med ADHD kan have svært ved at lære og ved at læse lektier. De kan have svært ved at opføre sig pænt derhjemme, i skolen og andre steder. ADHD påvirker ikke barnets eller den unges intelligens.

Voksne med ADHD kan have svært ved at gøre de samme ting, som børn har svært ved, og det kan betyde, at de har problemer med:

- Arbejde
- Forhold
- Lavt selvværd
- Uddannelse

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE STRATTERA®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Strattera®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for atomoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Strattera® (angivet i afsnit 6).
- hvis du har taget et lægemiddel, som kaldes en monoaminoxidase hæmmer (MAO-hæmmer), f.eks. phenelzin, inden for de sidste to uger. En MAO-hæmmer bruges somme tider mod depression og andre psykiske lidelser. Hvis du tager Strattera® sammen med en MAO-hæmmer, kan du få alvorlige bivirkninger, eller det kan være livstruende. Du skal også vente mindst 14 dage med at tage en MAO-hæmmer, efter at du er stoppet med at tage Strattera®.
- hvis du har øjensygdommen snærvinklet glaukom ("grøn stær", der er forhøjet tryk i øjet).
- hvis du har alvorlige hjerteproblemer, som kan påvirkes af en stigning i puls eller blodtryk, da dette kan være en virkning af Strattera.
- hvis du har alvorlige problemer med blodkarrene i hjernen, som f.eks. slagtilfælde, svækkelse og udposning på et blodkar (aneurisme) eller hel eller delvis tillukning af blodkar.
- hvis du har en tumor i binyrerne (fæokromocytom)

Du må ikke tage Strattera®, hvis noget af det ovenstående gælder for dig.

Tal med din læge eller med apotekspersonalet inden du tager Strattera, hvis der er noget du er usikker på, da Strattera® kan forværre disse problemer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Strattera®, hvis du har:

- Tanker om at begå selvmord eller om at forsøge at begå selvmord.
- Problemer med dit hjerte (herunder hjertefejl) eller hjertebanken. Strattera® kan øge din puls (hjerterefrekvensen). Pludselig død er forekommet hos patienter med hjertefejl.
- Højt blodtryk. Strattera® kan øge blodtrykket.
- Lavt blodtryk. Strattera® kan forårsage svimmelhed eller besvimelse hos mennesker med lavt blodtryk.
- Problemer med pludselige ændringer i blodtryk eller hjerterefrekvens.
- Hjertekarsygdom eller tidligere har haft et slagtilfælde.
- Leverproblemer. Du skal muligvis have en lavere dosis.
- Psykotiske symptomer herunder hallucinationer (hører stemmer eller ser ting, som ikke findes), vrangforestillinger og mistænksomhed.
- Mani (opstent følelse eller overspændt, hvilket medfører unormal adfærd) og ophidselse.
- Aggressive følelser.
- Uvenlige og vrede (fjendtlige) følelser.
- Haft epilepsi eller har haft krampeanfald af anden grund. Strattera kan øge hyppigheden af krampeanfald.
- Et anderledes humør end du plejer (humørsvingninger) eller føler dig meget trist.
- Gentagne og svært kontrollerbare trækninger hvor som helst i kroppen, eller du gentager lyde eller ord.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet inden du starter behandlin-

gen, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Det er vigtigt fordi Strattera® kan forværre disse problemer. Din læge vil kontrollere, hvordan medicinen påvirker dig.

Undersøgelser, som din læge vil udføre, inden du begynder at tage Strattera®

Disse undersøgelser udføres for at afgøre, om Strattera® er den rette medicin til dig.

- Din læge vil måle
- dit blodtryk og din puls (hjerterefrekvens) før og under behandlingen med Strattera®
- din højde og vægt under behandlingen med Strattera®, hvis du er et barn eller en teenager

Din læge vil tale med dig om:

- du bruger anden medicin
- der er tilfælde af pludselig, uforklarlig død i familien
- andre helbredsproblemer (såsom hjerteproblemer), som du eller din familie måtte have

Det er vigtigt, at du giver så mange oplysninger som muligt. Det vil hjælpe din læge til at afgøre, om Strattera® er den rette medicin til dig. Din læge kan beslutte, at det er nødvendigt med flere undersøgelser, før du begynder at tage denne medicin.

Brug af anden medicin sammen med Strattera®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er din læge, som beslutter, om du må tage Strattera® sammen med andre former for medicin, og i visse tilfælde kan det være nødvendigt for din læge at justere din dosis eller øge din dosis meget langsomt.

Strattera® må ikke bruges sammen med medicin, som kaldes MAO-hæmmere (monoaminoxidase- hæmmere), som bruges mod depression. Se afsnit 2 "Tag ikke Strattera®".

Hvis du tager anden medicin, kan Strattera® påvirke, hvor godt disse virker eller forårsage bivirkninger. Tal med din læge eller apotekspersonalet inden du tager Strattera®, hvis du tager nogen af følgende lægemidler:

- medicin, der øger blodtrykket eller som bruges til at behandle blodtrykket
- medicin mod depression f.eks. imipramin, venlafaxin, mirtazapin, fluoxetin eller paroxetin
- visse midler mod hoste og forkølelse, som indeholder lægemidler, der kan påvirke blodtrykket. Det er vigtigt, at du spørger apotekspersonalet til råds, når du køber denne type produkter
- nogle former for medicin, der bruges til at behandle psykiske lidelser
- medicin, der er kendt for at øge risikoen for krampeanfald
- visse lægemidler, der medfører, at Strattera® bliver i kroppen i længere tid end normalt (såsom quinidin og terbinafin)
- salbutamol (mod astma) kan give dig en følelse af, at dit hjerte galoperer, når du tager det via munden eller som indsprøjtning. Men det vil ikke forværre din astma.

Nedenstående lægemidler kan medføre en øget risiko for en unormal hjerterytme, når de tages sammen med Strattera®:

- medicin der bruges til at kontrollere hjerterytmen,
- medicin som ændrer koncentrationen af salte i blodet,
- medicin til forebyggelse og behandling af malaria,
- visse typer antibiotika (såsom erythromycin og moxifloxacin)

Tal med din læge eller apotekspersonalet, hvis du er i tvivl om noget af den medicin du tager, indgår i listen ovenfor.

Graviditet, amning og fertilitet

Det vides ikke, om Strattera® kan påvirke det ufødte barn eller udskilles i modermælken.

- Strattera® bør ikke bruges under graviditet, med mindre din læge har rådet dig til det.
- Du skal enten undgå at tage Strattera®, hvis du ammer eller stoppe med at amme.

Hvis du:

- er gravid eller ammer,
- har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,
- planlægger at amme dit barn skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Strattera®.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig træt, søvngig eller svimmel efter du har taget Strattera®. Det skal du tage hensyn til, hvis du kører bil eller arbejder med tunge maskiner, indtil du ved, hvordan Strattera® virker på dig. Hvis du føler dig træt, søvngig eller svimmel, skal du ikke køre bil eller arbejde med risikable maskiner.

Vigtig information om kapslernes indhold

Strattera® kapsler er ikke beregnet til at blive åbnet, da kapslens indhold

kan irritere øjet. Hvis indholdet af kapslerne kommer i kontakt med øjet, skal øjet straks skylles grundigt med vand. Kontakt også din læge eller skadestuen. Hænder og anden hud, som kan være kommet i kontakt med indholdet af kapslerne, skal også vaskes så hurtigt som muligt.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE STRATTERA®

- Tag altid Strattera® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet. Du skal som regel tage Strattera en eller to gange dagligt (morgen og sen eftermiddag eller tidlig aften).
- Din læge kan ændre det til, at du skal tage medicinen to gange om dagen, hvis du føler dig søvngig eller utilpas, når du tager det en gang dagligt.
- Du kan tage kapslerne enten sammen med eller uden mad.
- Kapslerne må ikke åbnes, og indholdet af kapslerne må ikke fjernes og indtages på anden vis.
- Tag medicinen på samme tidspunkt hver dag. Det gør det lettere at huske at tage den.

Så meget skal du tage

Hvis du er et barn eller ung (6 år eller ældre):

Din læge vil fortælle dig, hvor meget Strattera® du skal tage og vil beregne dosis efter din vægt. Din læge vil sædvanligvis starte dig op på en lavere dosis og så øge til den mængde af Strattera®, som du behøver i forhold til din vægt:

- Legemsvægt op til 70 kg: Total daglig start-dosis på ca. 0,5 mg pr. kg legemsvægt i mindst 7 dage. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på ca. 1,2 mg pr. kg legemsvægt dagligt.
- Legemsvægt over 70 kg: Total daglig start-dosis på 40 mg i mindst 7 dage. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på 80 mg dagligt. Den højeste daglige dosis, som din læge vil udskrive, er 100 mg.

Voksne

- Behandlingen bør startes med en total daglig dosis på 40 mg i mindst 7 dage. Din læge kan så øge dosis til den anbefalede vedligeholdelsesdosis på 80 mg – 100 mg dagligt. Den højeste daglige dosis, som din læge vil udskrive, er 100 mg

Hvis du har leverproblemer, kan din læge udskrive en lavere dosis.

Hvis du har taget for meget Strattera®

Kontakt øjeblikkeligt lægen eller skadestuen, hvis du har taget mere af Strattera®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Fortæl, hvor mange kapsler du har taget. De mest almindelige symptomer rapporteret i forbindelse med overdosering er symptomer fra mave-tarmkanalen, søvnighed, svimmelhed, rysten og unormal opførsel.

Hvis du har glemt at tage Strattera®

Hvis du har glemt en dosis, skal du tage den hurtigst muligt, men du må ikke tage mere end den totale daglige dosis inden for 24 timer. Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Strattera®

Der er normalt ikke bivirkninger, når du stopper behandlingen med Strattera®, men dine symptomer på ADHD kan komme igen. Du bør ikke stoppe behandlingen uden at have talt med din læge om det.

Din læge vil gøre følgende, mens du er i behandling

Din læge vil foretage visse undersøgelser

- før du starter – for at sikre, at Strattera® er sikkert og gavnligt for dig
- efter du er startet – de vil blive udført mindst hver 6. måned, men måske oftere.

De vil også blive udført når din dosis ændres. Undersøgelserne omfatter:

- måling af højde og vægt for børn og unge
- måling af blodtryk og puls
- kontrol af, om du har problemer eller om bivirkninger er blevet værre under behandlingen med Strattera®.

Langtidsbehandling

Strattera® skal ikke nødvendigvis tages hele livet. Hvis du tager Strattera® i mere end et år, vil din læge vurdere din behandling, for at se, om du stadig har brug for medicinen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Selv om nogle mennesker får bivirkninger synes de fleste, at Strattera® hjælper dem. Din læge vil fortælle dig om disse bivirkninger.

Visse bivirkninger kan være alvorlige. Søg straks læge, hvis du får nogen af følgende bivirkninger:

Ikke almindelige (kan ske op til 1 ud af 100)

- hurtig hjertebanken eller en følelse heraf, unormal hjerterytme
- tanker om eller trang til at begå selvmord

- aggressiv følelse
- uvenlig og vrede følelser (fjendtlighed)
- humørsvingninger eller -ændringer
- alvorlige allergiske reaktioner med symptomer som
 - hævelse i ansigt og svælg
 - besvær med at trække vejret
 - nældefeber (små hævede, kløende pletter på huden)
- kramp
- psykotiske symptomer herunder hallucinationer (såsom at høre stemmer eller se ting, som ikke findes), vrangforestillinger eller mistænksomhed

Børn og unge under 18 år har en øget risiko :

- tanker om eller trang til at begå selvmord (kan ske for op til 1 ud af 100)
- humørsvingninger eller -ændringer (kan ske for op til 1 ud af 10)

Risikoen hos voksne er lavere (kan ske for op til 1 ud af 1000) for bivirkninger såsom:

- kramp
- psykotiske symptomer herunder hallucinationer (såsom at høre stemmer eller se ting, som ikke findes), vrangforestillinger eller mistænksomhed

Sjældent (kan ske for op til 1 ud af 1000):

- leverskade

Du skal stoppe med at tage Strattera® og straks ringe til din læge, hvis du oplever følgende:

- mørk urin
- hud eller øjne bliver gule
- mavesmerter, hvor du er øm, når du trykker på den højre side af maven, lige neden for ribbenene
- føler dig syg (har kvalme) af ukendt årsag
- træthed
- kløe
- influenzalignende symptomer.

Andre indberettede bivirkninger omfatter følgende. Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis de bliver alvorlige.

Meget almindelige bivirkninger (kan ske for flere end 1 ud af 10)

BØRN og UNGE over 6 år ,

- hovedpine
- ondt i maven
- nedsat appetit (ingen sult-følelse)
- at man føler sig utilpas (kvalme)
- opkastning
- søvnighed
- forhøjet blodtryk
- forhøjet puls

Hos de fleste patienter forsvinder disse efter nogen tid.

VOKSNE

- at man føler sig utilpas (kvalme)
- mundtørhed
- hovedpine
- nedsat appetit (ingen sultfølelse)
- problemer med at falde i søvn, med at sove og med at vågne tidligt om morgenen
- forhøjet blodtryk
- forhøjet puls

Almindelige bivirkninger (kan ske for op til 1 ud af 10)

BØRN og UNGE over 6 år

- irritabel eller ophidset
- søvn-problemer herunder at vågne tidligt
- depression
- følelse af tristhed eller håbløshed
- nervøs følelse
- tics
- store pupiller (det mørke midtpunkt i øjet)
- svimmelhed
- forstoppelse
- appetitløshed
- urolig mave, fordøjelsesbesvær
- opsvulmet, rødlig og kløende hud
- udslæt
- følelse af dovenskab (letargi)
- træthed
- vægttab
- brystmerter

VOKSNE

- ophidselse
- nedsat interesse for sex
- søvnforstyrrelse

- depression
- følelse af tristhed eller håbløshed
- nervøs følelse
- svimmelhed
- en unormal smag eller en smagsændring i munden, som ikke vil gå væk
- rysten
- snurren eller følelsesløshed i hænder og fødder
- søvnighed, døsighed, træthed
- forstoppelse
- mavesmerter
- fordøjelsesbesvær
- luft i maven (flatulens)
- opkastning
- hedeure eller opblussen
- hjertebanken eller følelsen af at have hjertebanken
- opsvulmet, rødlig og kløende hud
- øget svedtendens
- udslæt
- vandladningsproblemer såsom ikke at kunne lade vandet, hyppig, besværet eller smertefuld vandladning
- betændelse i prostata (prostatitis)
- lyskesmerter hos mænd
- rejsningsproblemer (ikke i stand til at opnå en erektion)
- forsinket orgasme
- besvær med at bibeholde en rejsning
- menstruationssmerter
- følelse af svaghed eller manglende energi
- træthed
- følelse af dovenskab (letargi)
- kulderystelser
- følelse af irritation og uro
- tørst
- vægttab

Ikke almindelige bivirkninger (kan ske for op til 1 ud af 100)

BØRN og UNGE over 6 år

- besvimelse
- rysten
- migræne
- unormale fornemmelser i huden, såsom brændende, prikkende, kløende eller snurrende fornemmelser
- snurren og følelsesløshed i hænder og fødder
- kramp
- hjertebanken eller følelsen af at have hjertebanken (forlænget QT)
- åndenød
- øget svedtendens
- hudkløe
- følelse af svaghed eller manglende energi
- Sløret syn.

VOKSNE

- rastløshed
- tics
- besvimelse
- brystmerter
- åndenød
- migræne
- snurren og følelsesløshed i hænder og fødder
- unormal hjerterytme (forlænget QT)
- kolde finger og tæer
- hævede røde pletter (nældefeber)
- muskelkramp
- vandladningstrang
- unormal eller manglende orgasme
- uregelmæssig menstruation
- manglende sædafgang
- Sløret syn.

Sjældne bivirkninger (kan ske for op til 1 ud af 1000)

BØRN og UNGE over 6 år

- dårligt blodomløb, som gør tæer og fingre følelseløse og blege (Raynaud's fænomen)
- vandladningsproblemer såsom hyppig, besværet eller smertefuld vandladning
- forlænget, smertefuld rejsning
- lyskesmerter hos drenge

VOKSNE

- dårligt blodomløb, som gør tæer og fingre følelseløse og blege (Raynaud's fænomen)
- forlænget, smertefuld rejsning

Påvirkning af væksten

Nogle børn oplever en nedsat vækst (vægt og højde) når de starter med

at tage Strattera®. Men ved langtidsbehandling opnår børn alligevel en aldersvarende vægt og højde. Din læge vil holde øje med dit barns højde og vægt over tid. Hvis dit barn ikke vokser eller tager på i vægt som forventet, kan din læge vælge at nedsætte dit barns dosis eller midlertidigt stoppe behandlingen med Strattera®.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Strattera® utilgængeligt for børn.
Brug ikke Strattera® efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
Spørg på apoteket hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Strattera® indeholder:

- Aktivt stof: atomoxetinhydrochlorid svarende til 10 mg, 18 mg, 25 mg og 60 mg atomoxetin.
- Øvrige indholdsstoffer: pregelatineret majsstivelse, dimeticon,
- Kapselskallen indeholder: natriumlaurilsulfat og gelatine, og farvestofferne: gul jernoxid E172 (18 mg og 60 mg), titandioxid E171 (10 mg, 18 mg, 25 mg og 60 mg), indigocarmin E132 (25 mg og 60 mg).
- Edible Black Ink SW-9008 eller Edible Black Ink SW-9010 (shellac og sort jernoxid E172)

Udseende og pakningsstørrelser

10 mg hårde kapsler (hvid, mærket Lilly 3227/10 mg)
18 mg hårde kapsler (guld/hvid, mærket Lilly 3238/18 mg)
25 mg hårde kapsler (blå/hvid, mærket Lilly 3228/25 mg)
60 mg hårde kapsler (blå/gul, mærket Lilly 3239/60 mg)
Strattera® kapsler findes i pakningsstørrelser på 7, 14, 28 eller 56 kapsler.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ChemVet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg

Ompakning og frigivelse

ChemVet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg

Denne indlægsseddel blev senest revideret januar 2017.

Den nyeste indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.
Strattera® er et registreret varemærke, som tilhører Eli Lilly koncernen.

<----->

Oplysninger til børn og unge

Disse oplysninger vil hjælpe dig med at lære de vigtigste ting om din medicin, der hedder Strattera®.
Hvis du ikke kan lide at læse, kan du få din mor, far eller en anden voksen, som du kender godt (nogle gange kaldes de "værger") til at læse den højt for dig og svare på dine spørgsmål.
Det kan være en hjælp at læse teksten i små bidder ad gangen.

Hvorfor får jeg denne medicin?

Medicinen kan hjælpe børn og unge med "ADHD".

- ADHD kan gøre, at du:
- løber for meget rundt
- har svært ved at høre efter
- handler hurtigt uden at tænke over, hvad der sker bagefter (impulsiv)
- Det påvirker din evne til at lære, til at få venner og det påvirker, hvordan du opfatter dig selv. Det er ikke noget, du kan gøre for.

Mens du tager medicinen

- Udover at tage medicinen vil du også få hjælp til at håndtere din ADHD, f.eks. ved at tale med specialister i ADHD.
- Medicinen kan hjælpe dig. Men den kurerer ikke ADHD.
- Du skal til kontrol-besøg hos din læge flere gange om året. Det er for at være sikker på, at medicinen virker, og at du vokser og udvikler dig, som du skal.
- Piger skal straks fortælle lægen, hvis de tror, at de er gravide. Vi ved ikke, hvordan medicinen påvirker det ufødte barn. Hvis du dyrker sex, skal du

tale med din læge om prævention.

Nogle mennesker må ikke tage denne medicin

Du må ikke tage denne medicin, hvis du:

- har taget medicin, der kaldes monoaminoxidase-hæmmere (MAOI) f.eks. phenelzin, indenfor de sidste to uger.
- har en øjensygdom, som hedder snærvinklet glaukom ("grøn stær", forhøjet tryk i øjet)
- har alvorlige problemer med hjertet
- har alvorlige problemer med blodkarrene i din hjerne
- har en tumor i binyrerne

Nogle mennesker skal tale med lægen, inden de begynder at tage denne medicin

Du skal tale med din læge, hvis du:

- er gravid eller ammer
- tager anden medicin. Din læge har brug for at vide, hvilken medicin du tager
- har tanker om at gøre skade på dig selv eller andre
- har problemer med, at dit hjerte slår for hurtigt eller springer slag over, når du ikke er i bevægelse
- hører stemmer eller ser ting, som andre ikke hører og ser
- har problemer med, at du hurtigt bliver vred

Hvordan skal jeg tage min medicin (kapsler)?

- Synk din medicin med vand. Du kan tage medicinen enten med eller uden mad
- Kapslerne må ikke åbnes. Hvis kapslen går i stykker, og du får indholdet på huden eller i øjnene, skal du hente hjælp hos en voksen
- Din læge vil fortælle dig, hvor mange gange om dagen du skal tage din medicin
- Det er lettere at huske at tage medicinen, hvis du tager den på samme tid hver dag
- Du må ikke stoppe med at tage medicinen uden at have talt med din læge først

Mulige bivirkninger

Bivirkninger er uønskede ting, som kan ske, når du tager medicin. Hvis du oplever noget af det, som står herunder, skal du med det samme fortælle det til en voksen, som du kender godt. Den voksne kan så tale med din læge. De vigtigste ting, som du kan komme ud for, er:

- Dit hjerte banker hurtigere end normalt
- Du får tanker om selvmord eller lyst til at begå selvmord
- Du føler dig aggressiv
- Du føler dig meget ked af det eller dit humør er anderledes end normalt (humør-svingninger)

Tegn på en allergisk reaktion (overfølsomhed), som f.eks. udslæt, kløe eller nældefeber, hævelser i ansigtet, læberne, tungen eller andre steder på kroppen, stakåndethed, hvæsende vejrtrækning eller svært ved at trække vejret

- Kramper
- Du ser, føler eller hører ting, som andre ikke gør
- Leverskade: Ondt i maven og maven er øm, når du trykker på den i højre side lige under ribbenene.

Da medicinen kan gøre dig træt, er det vigtigt, at du ikke dyrker udendørs-sport som f.eks. ridning, cykling, svømning eller klatrer i træer. Du kan komme til skade eller kan skade andre.

Hvis du på nogen måde føler dig utilpas, når du tager din medicin, skal du straks fortælle det til en voksen, som du kender godt.

Andre ting, du skal huske på

- Sørg for at gemme din medicin på et sikkert sted, så ingen andre kan tage det. Især yngre søskende.
- Medicinen er kun til dig, så lad ikke andre tage den. Den hjælper måske dig, men kan være til skade for andre.
- Hvis du glemmer at tage din medicin, skal du ikke tage to kapsler næste gang. Bare tag en kapsel næste gang, som du plejer.
- Hvis du kommer til at tage for meget medicin, skal du med det samme fortælle det til din mor, far eller en anden voksen.
- Det er vigtigt, at du ikke tager for meget medicin, da du kan blive syg.
- Du må ikke stoppe med at tage medicinen, før din læge har sagt, at det er ok.

Hvem skal jeg spørge, hvis der er noget, jeg ikke forstår?

Din mor, far, en anden voksen du kender godt, din læge, sygeplejerske eller apoteks-personalet vil kunne hjælpe dig.