

Indlægsseddel: Information til brugeren

Quetiapin Accord 25 mg filmovertrukne tabletter
Quetiapin Accord 100 mg filmovertrukne tabletter
Quetiapin Accord 200 mg filmovertrukne tabletter
Quetiapin Accord 300 mg filmovertrukne tabletter

quetiapin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Quetiapin Accord til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Kontakt lægen hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Quetiapin Accord
3. Sådan skal De tage Quetiapin Accord
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Quetiapin Accord indeholder et stof, der hedder quetiapin. Det tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes antipsykotika. Quetiapin Accord kan anvendes til behandling af forskellige sygdomme, f.eks.:

- Skizofreni: hvor De hører eller føler måske ting, der ikke er der, tror på ting, der ikke er sande, eller føler Dem usædvanligt mistænksom, angst, forvirret, skyldig, anspændt eller deprimeret.
- Mani: hvor De kan føle Dem meget opstemt, opløftet, ophidset, begejstret eller hyperaktiv eller have dårlig dømmekraft, som omfatter aggressiv eller destruktiv opførsel.
- Bipolar depression: hvor De føler Dem ked af det eller deprimeret, har skyldfølelse, mangler energi, mister appetitten eller har svært ved at sove.

Deres læge vil måske fortsætte med at ordinere Quetiapin Accord til Dem, selv om De får det bedre.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Quetiapin Accord

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Quetiapin Accord:

- hvis De er allergisk over for quetiapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).
- hvis De tager et af følgende lægemidler:
 - visse lægemidler mod HIV
 - lægemidler, der indeholder azoler (mod svampeinfektioner)
 - erythromycin eller clarithromycin (mod infektion)

- nefazodon (mod depression).

Hvis De er usikker, så tal altid med Deres læge eller apoteket, inden De tager Quetiapin Accord.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med Deres læge eller apotekspersonalet, før De tager Quetiapin:

- hvis De eller nogen i Deres familie har eller har haft hjerteproblemer, for eksempel hjerterytmeforstyrrelser, svækket hjertemuskel eller betændelse i hjertet eller hvis De tager medicin, der kan have indvirkning på Deres hjerterytme.
- hvis De har lavt blodtryk.
- hvis De har haft et slagtilfælde, specielt hvis De er ældre.
- hvis De har problemer med leveren.
- hvis De har haft krampeanfald.
- hvis De har sukkersyge eller har risiko for at få det. Hvis dette er tilfældet, kan det være, at Deres læge kontrollerer Deres blodsukterniveau, mens De tager Quetiapin Accord.
- hvis De ved, at De tidligere har haft et lavt antal hvide blodceller (som måske eller måske ikke har været forårsaget af andre lægemidler).
- Hvis De er en ældre, dement person (nedsat hjernefunktion). Quetiapin-tabletter må ikke tages af ældre demente personer, fordi lægemiddelgruppen, som Quetiapin-tabletter tilhører, kan øge risikoen for slagtilfælde, og i nogle tilfælde dødsfald, hos ældre personer med demens.
- hvis De er en ældre person med Parkinsons sygdom/parkinsonisme.
- hvis De eller nogen i Deres familie har haft blodpropper, da denne type medicin kan medføre dannelse af blodpropper.
- hvis De har eller har haft en tilstand hvor De stopper med at trække vejret i en kort periode under Deres normale nattesøvn (kaldet "søvnapnø") og tager medicin, som nedsætter den normale aktivitet af hjernen ("depressiva").
- hvis De har eller har haft, en tilstand hvor De ikke kan tømme Deres blære fuldstændigt (urinretention), har forstørret prostata, blokering i tarmene eller øget tryk inde i øjet. Disse tilstande er nogen gange forårsaget af medicin (kaldet "antikolinerg medicin"), som påvirker den måde nerveceller virker på for at behandle visse medicinske tilstande.
- hvis De har eller har haft problemer med alkohol- eller stofmisbrug

Tal med Deres læge med det samme, hvis De får følgende efter at have taget Quetiapin-tabletter:

- En kombination af feber, alvorlig muskelstivhed, sveder meget eller har nedsat bevidsthed (en tilstand, der kaldes "malignt neuroleptikasyndrom"). Øjeblikkelig medicinsk behandling kan være nødvendig.
- Ufrivillige bevægelser, specielt i ansigtet eller tungen.
- Bliver svimmel eller pludselig føler Dem træt. Dette kan forøge risikoen for ulykker (fald) for ældre patienter.
- Krampeanfald.
- Langvarig og smertefuld erektion (priapismus).

Disse tilstande kan skyldes denne type lægemidler.

Tal med Deres læge hurtigst muligt, hvis De har:

- feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen, eller enhver anden infektion, da dette kan resultere i et meget lavt antal hvide blodceller. Dette kan medføre behandlingsstop med Quetiapin og/eller at der skal gives behandling
- forstoppelse sammen med vedholdende mavesmerter, eller forstoppelse, som ikke har reageret på behandling, da dette kan medføre en mere alvorlig blokering af tarmene.

Selvmodstanker og forværring af Deres depression

Hvis De er deprimeret, har De måske nogle gange tanker om at skade Dem selv eller begå selvmord. Disse tanker kan øges, når De begynder på at tage Deres medicin, da der går noget tid, inden denne

type lægemidler virker, normalt omkring to uger, men nogle gange længere tid. Disse tanker kan også forværres, hvis De pludselig stopper med at tage Deres medicin. Det er sandsynligt, at De vil have lettere ved at få sådanne tanker, hvis De er en ung, voksen person. Information fra kliniske forsøg viser, at der er en øget risiko for selvmordstanker og/eller selvmordsadfærd hos yngre voksne under 25 år med depression.

Hvis De på noget tidspunkt har tanker om at skade Dem selv eller begå selvmord, skal De straks kontakte Deres læge eller tage på hospitalet. Det kan være en hjælp at fortælle en slægtning eller en god ven, at De er deprimeret, og bede dem læse denne indlægsseddel. Bed dem sige til, hvis de mener, symptomerne bliver værre, eller de er bekymret over andre ændringer i Deres adfærd.

Lægemedelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)

Udbredt udslæt, høj kropstemperatur, forhøjede leverenzymmer, blodabnormiteter (eosinofili), forstørrede lymfeknuder og involvering af andre organer (lægemedelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer, der også er kendt som DRESS eller lægemiddeloverfølsomhedssyndrom). Stop med at bruge Quetiapin Accord, hvis De udvikler disse symptomer, og kontakt straks din læge eller søg straks lægehjælp.

Vægtøgning

Der er set vægtforøgelser hos patienter, der tager Quetiapin Accord. De og Deres læge skal kontrollere Deres vægt regelmæssigt.

Børn og unge

Quetiapin er ikke til brug hos børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Quetiapin-tabletter:

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De tager anden medicin eller har taget det for nylig eller overvejer at tage det.

De må ikke tage Quetiapin Accord, hvis De tager et af følgende lægemidler:

- visse lægemidler mod HIV.
- lægemidler, der indeholder azoler (mod svampeinfektioner)
- medicin mod infektioner (som f.eks. erythromycin eller clarithromycin)
- nefazodon (mod depression).

Fortæl det til lægen, hvis De tager et af følgende lægemidler:

- lægemidler mod epilepsi (f.eks. phenytoin eller carbamazepin).
- lægemidler mod forhøjet blodtryk.
- barbiturater (mod søvnbesvær).
- Thioridazin eller lithium (andet antipsykotika).
- lægemidler, der påvirker hjerterytmen, f.eks. lægemidler, der skaber en ubalance i elektrolytterne (lave niveauer af kalium eller magnesium i blodet, såsom vanddrivende midler (diuretika) eller visse former for antibiotika (medicin mod infektioner).
- medicin, der kan medføre forstoppelse.
- medicin (kaldet "antikolinerg medicin"), der påvirker den måde nerveceller virker på for at behandle visse medicinske tilstande.

Tal med Deres læge, før De stopper med at tage Deres medicin.

Brug af Quetiapin Accord sammen med mad, drikke og alkohol:

- Quetiapin kan tages med eller uden mad.
- Pas på med hvor meget alkohol De indtager. Dette skyldes, at den kombinerede virkning af Quetiapin Accord og alkohol kan gøre Dem søvnig.
- Drik ikke grapefrugtjuice, når De tager Quetiapin Accord, da det kan påvirke virkningen af lægemidlet.

Graviditet og amning:

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge til råds, før De tager dette lægemiddel. De bør ikke tage Quetiapin-tabletter under graviditet, medmindre De har aftalt det med Deres læge. De må ikke tage Quetiapin-tabletter, hvis De ammer.

De følgende abstinenssymptomer kan forekomme hos nyfødte, hvis moderen har taget quetiapin-tabletter i det sidste trimester (de sidste tre måneder af graviditeten): rysten, muskelstivhed og/eller -svaghed, døsighed, ophidselse, vejrtrækningsproblemer og spiseproblemer. Hvis Deres barn får et eller flere af disse symptomer, skal De kontakte lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Deres tabletter kan gøre Dem søvnig. De må ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før De ved, hvordan tabletterne påvirker Dem.

Quetiapin Accord indeholder lactose

Quetiapin Accord indeholder lactose, der er en sukkerart. Hvis Deres læge har fortalt Dem, at De ikke kan tåle visse sukkerarter, skal De tale med lægen, før De tager dette lægemiddel.

Indvirkning på narkotikatestning af urin

Hvis De skal have taget en urinprøve til narkotikatestning, kan behandling med Quetiapin Accord kombineret med bestemte testmetoder medføre, at prøven testes positiv for metadon samt nogle stoffer til behandling af depression, som hedder tricykliske antidepressiva (TCA), selvom De hverken tager metadon eller TCA'er. Skulle dette ske, kan der foretages en mere specifik test.

3. Sådan skal De tage Quetiapin Accord

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket. Deres læge vil bestemme, hvilken dosis De skal starte med. Vedligeholdelsesdosis (daglig dosis) vil afhænge af Deres sygdom og behov, men vil normalt være mellem 150 mg og 800 mg.

- De skal tage tabletten én gang dagligt ved sengetid eller to gange dagligt afhængig af Deres sygdom.
- Synk tabletterne hele med et glas vand.
- De kan tage tabletterne med eller uden mad.
- Drik ikke grapefrugtjuice, når De tager Quetiapin Accord. Det kan påvirke lægemidlets effekt.
- Stop ikke med at tage tabletterne, selvom De føler, at De har det bedre, medmindre Deres læge siger, De skal stoppe.

Leverproblemer

Deres læge vil muligvis ændre Deres dosis, hvis De har problemer med leveren.

Ældre

Deres læge vil muligvis ændre Deres dosis, hvis De er en ældre person.

Brug til børn og unge under 18 år

Quetiapin Accord må ikke tages af børn og unge under 18 år.

Hvis De har taget for mange Quetiapin Accord

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Quetiapin Accord, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas).

Hvis De tager flere Quetiapin Accord, end Deres læge har ordineret, kan De føle Dem søvnig, svimmel og få uregelmæssig hjerterytme. Kontakt straks Deres læge eller tag til nærmeste hospital. Tag tabletterne med Dem.

Hvis De har glemt at tage Quetiapin Accord

Hvis De glemmer at tage en dosis, så tag den, så snart De kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på at være tid til den næste dosis, så vent bare indtil da. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis De holder op med at tage Quetiapin Accord

Hvis De pludselig stopper med at tage Quetiapin tabletter, kan det være, at De får svært ved at sove, eller De kan få kvalme eller hovedpine, diarré, opkastning, bliver svimmel eller irriteret. Deres læge kan derfor foreslå at mindske Deres dosis gradvist, før De stopper behandlingen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Svimmelhed (kan medføre fald), hovedpine, tør mund.
- Søvnighed (forsvinder oftest med tiden, når De fortsætter med at tage Quetiapin Accord) (kan føre til faldulykker).
- Seponeringssymptomer (symptomer som forekommer, når De stopper med at tage quetiapin), kan omfatte søvnløshed, kvalme, hovedpine, diarré, opkastning, svimmelhed og irritabilitet. Gradvis nedtrapning over en periode på mindst 1 til 2 uger tilrådes.
- Vægtøgning.
- Ufrivillige muskelbevægelser. Der kan være problemer med at få gang i musklerne, rysten, rastløshed eller muskelstivhed uden smerte.
- Ændring i indholdet af visse typer fedt (triglycerider og totalcholesterol) i blodet.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

- Hurtig hjertebanken
- Følelse af at hjertet slår meget kraftigt, meget hurtigt eller springer slag over
- Forstoppelse, irriteret mave (fordøjelsesbesvær)
- Følelse af at være svag
- Hævelser i armene eller ben
- Fald i blodtryk når De rejser Dem op. De kan føle Dem svimmel eller besvime (kan medføre fald)
- Øget blodsukterniveau
- Sløret syn
- Abnorme drømme og mareridt
- Øget sultfølelse
- Irritabilitet
- Tale- og sprogforstyrrelser
- Selvmordstanker og forværring af depression
- Stakåndethed
- Opkastning (primært hos ældre)
- Feber
- Ændring i indholdet af skjoldbruskkirtelhormoner i blodet
- Nedsat antal af visse typer blodlegemer
- Stigning i indholdet af leverenzymen i blodet
- Stigning i indholdet af hormonet prolaktin i blodet. Stigning i prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre:
 - Brysthævelse og uventet dannelse af brystmælk hos mænd og kvinder

- Udebleven eller uregelmæssig menstruation hos kvinder.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

- Krampeanfald
- Overfølsomhedsreaktioner, der kan omfatte hævede knuder (kvadler), hævelse af huden og hævelse omkring munden
- Besvimelse (kan føre til fald)
- Ubehagelig følelse i benene (uro i benene).
- Synkebesvær
- Ukontrollable bevægelser, hovedsageligt i ansigt og tunge
- Problemer med seksualfunktionen
- Tilstoppet næse
- Diabetes
- Ændringer i hjertets elektriske aktivitet (såkaldt forlængelse af QT-interval), hvilket kan måles vha. et elektrokardiogram
- En langsommere hjerterytme end normalt. Dette kan forekomme ved påbegyndelse af behandlingen og kan være forbundet med lavt blodtryk og besvimelse
- Vandladningsbesvær
- Nedsat antal røde blodlegemer
- Nedsat indhold af natrium i blodet
- Forværring af eksisterende diabetes

Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

- En kombination af feber, svedeture, muskelstivhed, følelse af stærk døsighed eller besvimelse (en lidelse, der hedder malignt neuroleptikasymptom).
- Gulfarvning af hud og øjne (gulsot).
- Leverbetændelse (hepatitis).
- En langvarig og smertefuld erektion (priapismus).
- Menstruationsforstyrrelser.
- Blodpropper i venerne, særligt i benene (symptomer på dette inkluderer hævelse, smerte og rødmen af benet), som gennem blodårerne kan transporteres til lungerne og forårsage smerter i brystet og problemer med at trække vejret. Hvis De får nogle af disse symptomer, skal De straks søge læge.
- At De går, taler eller udfører andre aktiviteter, mens de sover.
- Fald i kropstemperatur (hypotermi).
- Øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk (galaktore).
- Betændelse i bugspytkirtlen.
- En tilstand (kaldet metabolisk syndrom), hvor De kan have en kombination af 3 eller flere af følgende bivirkninger: Øget fedt rundt omkring maven, et nedsat indhold af "godt kolesterol" (HDL-C), øget fedtindhold i blodet (triglycerider), højt blodtryk og en stigning i blodsukker
- Kombination af feber, influenzalignende symptomer, ondt i halsen eller enhver anden infektion med meget lavt antal hvide blodceller, en tilstand der kaldes agranulocytose
- Blokering af tarmen
- Forhøjet kreatinfosfokinase (et stof fra musklerne)

Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

- Alvorligt udslæt, blærer eller røde pletter på huden
- En alvorlig allergisk reaktion (anafylakse), som kan medføre åndedrætsbesvær eller chok
- Pludselig hævelse af huden, som regel omkring øjnene, læber og hals (angioødem)
- Alvorligt blæreformet udslæt på huden, omkring munden, i øjne og omkring kønsdelene (Stevens-Johnsons syndrom).
- For stor udskillelse af et hormon, der kontrollerer urinmængden.
- Nedbrydning af muskelfibre og muskelsmerter (rhabdomyolyse).

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke anslås ud fra de foreliggende data):

- Hududslæt med uregelmæssige, røde pletter (såkaldt erythema multiforme).
- Pludselig alvorlig allergisk reaktion med symptomer såsom feber, blærer på huden og hudafskalning (toksisk epidermal nekrolyse).
- Abstinenssymptomer kan forekomme hos nyfødte, hvor mødrene har anvendt Quetiapin Accord under graviditeten.
- Slagtilfælde

Den gruppe af lægemidler, som Quetiapin tilhører, kan forårsage problemer med hjerterytmen, som kan være alvorlige og i værste fald medføre døden.

Nogle bivirkninger kan kun ses, når der tages en blodprøve. Det kan være ændringer i mængden af visse fedttyper (triglycerider og totalcholesterol) eller sukker i blodet, ændringer i mængden af skjoldbruskkirtelhormoner i blodet, øget mængde leverenzymmer, fald i mængden af visse typer blodlegemer, fald i mængden af røde blodceller, øget blod-kreatin-fosfokinase (et stof i musklerne), fald i mængden af natrium i blodet og stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet. Stigninger i hormonet prolaktin kan i sjældne tilfælde medføre følgende:

- Mænd og kvinder kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk (galaktoré).
- Kvinder kan få manglende eller uregelmæssig menstruation.

Det kan være, at Deres læge tager blodprøver ind imellem.

Yderligere bivirkninger hos børn og unge:

De samme bivirkninger, der indtræder hos voksne, kan også forekomme hos børn og unge.

Følgende bivirkninger ses dog oftere hos børn og unge eller er ikke set hos voksne:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

- Stigninger i mængden af et hormon, der kaldes prolaktin. Stigninger i mængden af hormonet prolaktin i blodet kan i sjældne tilfælde medføre følgende:
 - Dreng og piger kan få øget brystudvikling og uventet produktion af brystmælk.
 - Piger kan få manglende eller uregelmæssig menstruationen.
- Øget appetit.
- Opkastning.
- Ufrivillige muskelbevægelser. Disse omfatter vanskeligheder med at påbegynde muskelbevægelser, rysten, følelse af rastløshed eller muskelstivhed uden smerte.
- Forhøjet blodtryk.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

- Følelse af svaghed, besvimelse (kan medføre fald).
- Tilstoppet næse
- Følelse af irritation.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.
- Brug ikke Quetiapin Accord efter den udløbsdato, der står på kartonen eller blisterpakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Quetiapin Accord indeholder:

Det aktive stof er quetiapin.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 25 mg /100 mg/200 mg/300 mg quetiapin (som quetiapin hemifumarat).

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletterne: Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon K 30, magnesiumstearat, natriumstivelsesglycolat (type A), calciumhydrogen-phosphatdihydrat.

Filmovertræk:

25 mg:

Hypromellose 6cP
Titandioxid
Macrogol 400
Gul jernoxid
Rød jernoxid

100 mg:

Hypromellose 6cP
Titandioxid
Macrogol 400
Gul jernoxid

200 mg:

Hypromellose E-5
Macrogol 400
Titandioxid

300 mg:

Hypromellose E-5
Macrogol 400
Titanoxid

Udseende og pakningsstørrelse

25 mg tabletter er pink, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, jævne på begge sider.

100 mg tabletter er gule, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, jævne på begge sider.

200 mg tabletter er hvide til offwhite, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, jævne på begge sider.

300 mg tabletter er hvide til offwhite, kapselformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, mærket med '300' på den ene side og jævn på den anden.

PVC/aluminiumfolieblister i pakker med 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 og 100 tabletter per karton.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare B.V.
Winthontlaan 200
3526 KV Utrecht
Holland

Fremstiller:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Storbritannien

Laboratori FUNDACIO DAU,
C/ De la letra C, 12-14,
Poligono Industrial de la Zona Franca,
08040 Barcelona,
Spanien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,
ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

ACCORD-UK LTD
WHIDDON VALLEY, BARNSTAPLE, DEVON, EX32 8NS,
Storbritannien

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets navn	Lægemidlets navn
Storbritannien	Quetiapine 25/100/150/200/300 mg Film-coated Tablets
Spanien	Quetiapina Combix 25/100/150/200/300 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Finland	Quetiapine Accord 25/100/200/300 mg tabletti, kalvopäällysteinen / filmdragerade tabletter
Holland	Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg filmomhulde tabletten
Portugal	Quetiapina Accord
Polen	Alcreno, 25/100/150/200/300 mg, tabletki powlekane
Danmark	Quetiapin Accord
Rumænien	Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg comprimate filmate
Sverige	Quetiapine Accord 25/100/200/300 mg filmdragerad tabletter
Ungarn	Quetiapine Accord 200/300 mg filmtabletta
Slovakiet	Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg filmom obalené tablety
Irland	Quetiapine 25/100/200/300 mg Film coated Tablet
Litauen	Quetiapine Accord 25/100/150/200/300 mg plėvele dengtos tabletės
Italien	Quetiapine AHCL 25/100/200/300 mg compresse rivestite con film
Bulgarien	Quetiapine Accord 25/100/200/300 mg филмирани таблетки

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2020.