

Selexid® 400 mg, filmovertrukne tabletter

pivmecillinamhydrochlorid

Selexid® er et registreret varemærke som tilhører LEO Pharma A/S.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Selexid® til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som De har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Selexid®
3. Sådan skal De tage Selexid®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Selexid® er et antibiotikum af penicillin-typen. Det bruges til at behandle urinvejsinfektioner og salmonellainfektioner (salmonellose) forårsaget af mecillinam-følsomme bakterier.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE SELEXID®

Tag ikke Selexid®, hvis De:

- er allergisk over for pivmecillinamhydrochlorid, andre penicilliner, cefalosporiner eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
- har en forsnævring af spiserøret.
- lider af en stofskiftesygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før De tager Selexid®, hvis De:

- lider af porfyri.
- er i behandling med valproat (mod epilepsi og mani), eller anden medicin af samme type.

Kontakt straks lægen, hvis De får langvarig eller blodig diarré under behandlingen med Selexid®. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis).

Vær opmærksom på følgende:

- Langvarig behandling øger risikoen for carnitin mangel (et naturligt stof kroppen har brug for).
- Tabletterne bør tages med mindst et halvt glas vand for at forhindre problemer i spiserøret.

Brug af anden medicin sammen med Selexid®

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med Deres læge, hvis De tager medicin mod:

- urinsyreigt (probenecid).
- kræft, psoriasis eller leddegigt (methotrexat).
- epilepsi eller mani (valproat eller anden medicin af samme type).
- infektioner (erythromycin, tetracykliner, beta-laktamantibiotika eller aminoglykosider).

Brug af Selexid® sammen med mad og drikke

Selexid® skal indtages med mindst et halvt glas vand. De kan tage Selexid® sammen med mad.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet

De kan tage Selexid® under graviditet.

Amning

De kan tage Selexid®, selvom De ammer.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Selexid® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE SELEXID®

Tag altid Selexid® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Vær opmærksom på, at De ikke kan bruge Selexid® 400 mg, filmovertrukne tabletter til alle de anførte doseringer.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 200-400 mg tre gange dagligt.

Brug til børn: Dosis afhænger af barnets vægt. Den sædvanlige dosis er 20 mg pr. kg legemsvægt pr. døgn fordelt på tre doser.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis De har taget for meget Selexid®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Selexid®, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er: Kvalme, opkastning og mavekatar.

Hvis De har glemt at tage Selexid®

De må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med Deres sædvanlige dosis. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at tage Selexid®

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse forårsaget af antibiotika. Kontakt lægen.
- Gulsot, sløvhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kan være alvorligt. Hvis De får gulsot, skal De kontakte læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Diarré, opkastning, maveproblemer, kvalme, mavesmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Hovedpine, svimmelhed, træthed.
- Hududslæt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis De får feber, skal De straks kontakte læge.
- Sår i munden eller spiserøret.
- Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i spiserøret. Tal med lægen.
- Nældefeber.
- Kløe.

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Muskelsvaghed eller tab af muskelmasse, træthed, nedsat energi. Disse symptomer kan skyldes mangel på et stof i kroppen, der kaldes carnitin.

Selexid® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverfunktion, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk) eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

- Opbevar Selexid® utilgængeligt for børn.
- Selexid® må ikke opbevares over 25 °C.
- Brug ikke Selexid® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Selexid® 400 mg filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof: Pivmecillinam 400 mg som pivmecillinamhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: MikrokrySTALLinsk cellulose, hydroxypropylcellulose, hypromellose, magnesiumstearat, simeticon emulsion, syntetisk paraffin.

Udseende og pakningsstørrelser:

Selexid® 400 mg er en hvid, kapselformet, filmovertrukket tablet.

Selexid® 400 mg filmovertrukne tabletter findes i pakningsstørrelsen 20 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet af:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2015.