

Indlægsseddel: Information til brugeren

Alfuzosin Copyfarm 2,5 mg filmovertrukne tabletter

alfuzosinhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alfuzosin Copyfarm
3. Sådan skal du tage Alfuzosin Copyfarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Alfuzosin Copyfarm tilhører en gruppe af medicin, som kaldes alfa-blokkere. Alfa-blokkere anvendes ved vandladningsproblemer, som skyldes lidelser i blærehalskirtlen (prostata). Alfa-blokkere får musklerne i prostata og blærehalsen til at slappe af. Det letter urinens udstrømning af blæren.

Alfuzosin Copyfarm er beregnet til behandling af vandladningsproblemer ved godartet forstørrelse af blærehalskirtlen (benign prostatahyperplasi).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Alfuzosin Copyfarm

Tag ikke Alfuzosin Copyfarm:

- hvis du er allergisk over for alfuzosin, andre quinazoliner (fx terazosin, doxazosin) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Alfuzosin Copyfarm (angivet i pkt. 6).
- hvis du lider af (har lidt af) svimmelhed, især når du rejser dig op fra siddende eller liggende stilling
- hvis du også bruger andre alfa1-blokkere som f.eks. doxazosin
- hvis du har alvorligt nedsat leverfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler:

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Alfuzosin Copyfarm.

Vær ekstra forsigtig med at tage Alfuzosin Copyfarm:

- hvis du har en tilstand, der påvirker kranspulsårerne (enhver behandling af nedsat blodforsyning til hjertemusklens bør fortsætte); hvis symptomerne på brystmerter (angina pectoris) vender tilbage eller bliver værre, bør behandlingen med Alfuzosin Copyfarm stoppes

- hvis du tilhører en af følgende patientgrupper:
 - ældre patienter
 - patienter med øget følsomhed over for alfa1- blokkere
 - patienter, der behandles med midler mod forhøjet blodtryk eller med nitrater (mod symptomer på hjertekrampe)
- nogle patienter kan inden for de første par timer, efter de har taget tablettene, opleve et fald i blodtrykket, når de rejser eller sætter sig op, især hvis de sætter eller rejser sig op fra liggende stilling. Hvis dette opstår, skal du ligge ned, indtil symptomerne er forsvundet helt. Det optræder som regel i begyndelsen af behandlingen og er som oftest forbigående. Det er som regel muligt at fortsætte med behandlingen
- hvis du lider af medfødt eller erhvervet forandring i hjerteaktivitet (QT-forlængelse, som medfører EKG forandring) eller du anvender lægemidler, som også kan forlænge QT-intervallet i EKG.
- hvis du skal gennemgå en øjenoperation på grund af grå stær (uklar linse), så oplys øjenspecialisten inden operationen om, at du bruger eller tidligere har brugt Alfuzosin Copyfarm. Alfuzosin Copyfarm kan medføre komplikationer under operationen, der kan klares, hvis specialisten er informeret på forhånd
- hvis du er inkontinent (har ufrivillig vandladning).

Rådfør dig med lægen, hvis nogle af ovenstående advarsler gælder for dig eller tidligere har gjort det.

Brug af anden medicin sammen med Alfuzosin Copyfarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Interaktion betyder, at medicin indbyrdes indvirker på den virkning og/eller bivirkning, de har, når de bruges samtidigt. Interaktion kan forekomme, når Alfuzosin Copyfarm bruges sammen med:

- andre alfa1-blokkere og dopamin receptor agonister (anvendes til behandling af bl.a. Parkinsons sygdom) (samtidig brug bør undgås)
- blodtryksmedicin. Det kan være nødvendigt at justere dosis af denne medicin på grund af muligheden for et blodtryksfald
- nitratpræparater (medicin mod angina pectoris). Det kan være nødvendigt at justere dosis af denne medicin på grund af muligheden for et blodtryksfald
- præparater som f.eks. ketoconazol og itraconazol (til behandling af svampeinfektioner), clarithromycin og erythromycin (til behandling af bakterieinfektioner) eller ritonavir (til behandling af hiv). Disse præparater kan påvirke Alfuzosin Copyfarms virkning
- fuld bedøvelse. Hvis du skal gennemgå en operation, hvor der er brug for fuld bedøvelse, skal du informere narkoselægen, da dit blodtryk vil kunne falde til et for lavt niveau.

Brug af Alfuzosin Copyfarm sammen med mad og drikke

Alfuzosin Copyfarm kan tages med eller uden mad.

Graviditet og amning

Da Alfuzosin Copyfarm ikke bruges til kvinder, er dette afsnit ikke relevant.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Alfuzosin Copyfarm kan somme tider medføre svimmelhed eller generel svækkelse (se "Bivirkninger"). Hvis du har nogle af disse bivirkninger, må du tage hensyn til dette hvis du skal køre bil og/eller betjene maskiner, der kræver din fulde opmærksomhed.

Alfuzosin Copyfarm indeholder lactosemonohydrat

Alfuzosin Copyfarm indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Alfuzosin Copyfarm

Tag altid Alfuzosin Copyfarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Alfuzosin Copyfarm tabletterne skal synkes hele. Når du starter behandlingen, er det bedst, hvis du tager den første tablet, før du går i seng.

Hvis du bemærker, at Alfuzosin Copyfarm har en for stærk eller for svag virkning, så rådfør dig med lægen eller på apoteket.

Voksne:

Den sædvanlige dosis er én tablet a 2,5 mg tre gange dagligt. Lægen kan øge denne dosis til højst fire gange dagligt, hvis der er behov for det.

Ældre over 65 år og patienter der tager anden medicin mod forhøjet blodtryk:

Startdosis er én tablet a 2,5 mg to gange dagligt (morgen og aften).

Børn og unge (2-16 år):

Alfuzosin Copyfarm's effekt er ikke blevet påvist hos børn i alderen 2 til 16 år. Alfuzosin Copyfarm bør derfor ikke anvendes hos børn og unge i alderen 2 til 16 år.

Nedsat nyrefunktion:

Den sædvanlige daglige dosis er én tablet a 2,5 mg to gange dagligt (morgen og aften). Tag den første tablet om aftenen.

Mild til moderat nedsat leverfunktion:

Den sædvanlige daglige dosis er én tablet a 2,5 mg. Lægen kan øge denne dosis til én tablet a 2,5 mg to gange dagligt (morgen og aften).

Hvis du har taget for mange Alfuzosin Copyfarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Alfuzosin Copyfarm end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har taget for mange Alfuzosin Copyfarm tabletter, kan du få for lavt blodtryk. Lig ned på ryggen så meget som muligt, da det vil hjælpe med til at minimere bivirkningerne.

Hvis du har glemt at tage Alfuzosin Copyfarm

Tag tabletten, så snart du husker det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over og tag den næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Alfuzosin Copyfarm

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du skal omgående kontakte lægen, hvis du får følgende symptomer:

Hævet ansigt, tunge eller svælg; synkebesvær, vejrtrækningsbesvær og nældefeber (disse symptomer er meget sjældne; kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

- kvalme, mavesmerter, diarré og mundtørhed
- besvimelsestendens, svimmelhed (vertigo) og hovedpine
- lavt blodtryk (ortostatisk hypotention)
- kraftsløshed og utilpashed.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

- sløvhed og bevidsthedstab
- hurtig puls (takykardi) og hjertebanken
- synsforstyrrelser
- næseflåd (rhinitis)
- udslæt og kløe på huden
- inkontinens
- hedeture
- væskeophobning (ødemer) og brystmerter.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter):

- personer med forud eksisterende sygdom i hjertets blodårer kan enten opleve brystmerter (angina pectoris) for første gang eller forværring af forud eksisterende angina
- nældefeber
- leverskade.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

- fald i antal hvide blodlegemer (neutropeni)
- Intraoperativt Floppy Iris-syndrom (IFIS) – hvis du skal gennemgå en øjenoperation for grå stær (uklar linse) skal du informere din øjenspecialist inden operationen om, at du bruger eller tidligere har brugt Alfuzosin Copyfarm, da dine pupiller måske har svært ved at udvide sig og iris (den farvede del i øjet) kan blive slap under operationen
- abnorm hjerterytme (atrieflimmer)
- opkastning
- problemer med din lever
- vedvarende og smertefuld erektion (priapisme).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Alfuzosin Copyfarm utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.

Brug ikke Alfuzosin Copyfarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Alfuzosin Copyfarm indeholder:

Aktivt stof: alfuzosinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletterne: lactosemonohydrat; povidon; natriumstivelsesglycolat; cellulose, mikrokrystallinsk; magnesiumstearat.

Tabletovertræk: hypromellose; titandioxid (E171); lactosemonohydrat; macrogol; glyceroltriacetat.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Alfuzosin Copyfarm er hvide, runde, filmovertrukne tabletter, mærket "LFN" på den ene side og "2.5" på den anden side.

Pakningsstørrelser

Tabletterne fås i blisterpakninger a 30, 50, 60, 90, 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2015