

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Glukose SAD 100 g/l, 200 g/l og 500 g/l infusionsvæske, opløsning

Glucosemonohydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Glukose SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glukose SAD
3. Sådan skal du tage Glukose SAD
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Glukose SAD er kunstig ernæring (kulhydrater) til at give direkte i en blodåre.

Glukose SAD anvendes ved behov for energi i form af kulhydrater.

Du vil få Glukose SAD som en infusion i en blodåre (intravenøs anvendelse) af en læge eller sygeplejerske.

Lægen kan give dig Glukose SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE GLUKOSE SAD

Tag ikke Glukose SAD

- hvis du har dårligt fungerende nyrer (f.eks. nedsat glucosetolerans, oliguri eller anuri)
- hvis du har et højt niveau af kalium i blodet (hyperkaliæmi)
- hvis du har højt blodsukker (hyperglykæmi)
- hvis du har for meget syre i blodet (metabolisk acidose)
- hvis du har vand i lungerne (lungeødem)
- hvis du har akut dårligt hjerte
- hvis du har ubehandlet sukkersyge eller komplikationer (hyperosmolært koma, metabolisk stress) pga. sukkersyge
- hvis du har blødninger i rygmarven eller hjernen
- hvis du er dehydreret (stort væsketab)
- hvis du er overhydreret (overskud af væske i kroppen)
- hvis du er i en tilstand af akut shock og kollaps
- hvis du er desorienteret (delirium tremens)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Glukose SAD:

- hvis du har dårligt fungerende hjerte
- hvis du har dårligt fungerende lunger
- hvis du har ubalance i kroppens indhold af væske eller blod (hypervolumi)
- hvis du får medicin for hjertet (digoxin)
- hvis du har et lavt niveau af kalium i blodet (hypokaliæmi)
- hvis du er dehydreret (væskemangel)
- hvis du har haft en blodprop og nedsat blodforsyning i hjernen (akut iskæmisk apopleksi)
- hvis du har haft en blødning i hjernen (intrakranielt hypertensiv episode)
- hvis du er svært fejlerenæret (f.eks. i forbindelse med et alkoholmisbrug, faste over længere tid, anorexi eller graviditet med kvalme og opkastninger (eremesis gravidarum))

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Glukose SAD. Det kan påvirke prøveresultaterne. Dit blodsukker og din salt- og væskebalance bør kontrolleres regelmæssigt.

Hvis Glukose SAD gives hurtigt eller i store mængder, er det især vigtigt at måle mængden af kalium i blodet, samt dit blodsukker.

Hvis dit blodsukker bliver for højt, bør infusionshastigheden reguleres, eller du bør gives insulin. I tilfælde af at du får et for lavt niveau af fosfat i blodet, anbefales det, at du får et yderligere tilskud af fosfat.

Glukose SAD bør ikke gives gennem samme nål som blodtransfusion, da dette kan beskadige de røde blodlegemer eller bevirke, at de klumper sammen.

Glukose SAD bør indgives ved lav infusionshastighed, idet der er risiko for at en pludseligt stor mængde glukose i blodet vil påvirke cellernes væskebalance (osmotisk diurese).

Brug af anden medicin sammen med Glukose SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Glukose SAD sammen med mad og drikke

Glukose SAD kan gives uafhængigt af måltider.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du må gerne få Glukose SAD, hvis du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glukose SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Glukose SAD indeholder glucose

Denne medicin indeholder henholdsvis 100 g, 200 g og 500 g glucose pr. liter. Diabetespatienter skal tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE GLUKOSE SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Glukose SAD findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre. Du vil normalt få Glukose SAD af en læge eller sygeplejerske.

Doseringen er individuel og afhænger af dit væske- og energibehov. Lægen vil afgøre den rette dosis til dig.

Du må få Glukose SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Hvis du har brugt for meget Glukose SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Glukose SAD, vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.

Hvis du har fået for meget Glukose SAD, eller hvis det er givet for hurtigt, kan du få følgende symptomer:

- hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker og udskillelse af sukker i urinen
- overskud af væske i kroppen
- forstyrrelser i kroppens balance af elektrolytter og syre-base
- påvirket vandladning og udskillelse af sukker i urinen, som kan medføre dehydrering, højt blodsukker og påvirkning af serum
- vand i kroppen

Hvis du har glemt at bruge Glukose SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Glukose SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Almindelige (forekommer hos 1-10 ud af 100 behandlede) – meget almindelige (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede) bivirkninger:

Alvorlige: Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop. Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Alvorlige: Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige: Udskillelse af sukker (glukose) i urinen. Forøget urinmængde.

Forstyrrelser i elektrolyt- og væskebalance (herunder for lavt kalium, magnesium og fosfat i blodet).

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Hvis lægemidlet indgives forkert i blodåren, kan der ske udtrædning af opløsningen til vævet, hvilket kan give vævsskader (vævsnekrose).

Bivirkninger relateret til måden hvorpå lægemidlet indgives omfatter feber, betændelse ved stedet for indsprøjtning, lokal smerte eller lokal reaktion, irritation af blodårerne, blodprop i den åre, som medicinen er sprøjtet ind i eller årebetændelse ved stedet for indsprøjtning, udtrædning af lægemiddel fra blodåren til vævet, åndenød, for højt blodtryk og besværet vejrtrækning pga. øget blodmængde.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Glukose SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Glukose SAD efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Anv. inden. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar Glukose SAD i original yderpakning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Glukose SAD infusionsvæske indeholder:

Aktivt stof: Glucosemonohydrat

Øvrige indholdsstoffer:

For 100 g/l og 200 g/l: Vand til injektionsvæsker

For 500 g/l: Vand til injektionsvæsker, saltsyre (til justering af pH)

Udseende og pakningsstørrelser

Glukose SAD er en klar, farveløs til svagt gul væske.

Glukose SAD findes i pakningsstørrelser på:

- Glukose SAD, 100 g/l: 500 ml og 1000 ml infusionsbeholdere
- Glukose SAD, 200 g/l: 500 ml og 1000 ml infusionsbeholdere
- Glukose SAD, 500 g/l: 100 ml og 500 ml infusionsbeholdere

Alle ovenstående findes også i 10-stykspakninger.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Sygehusapoteket Region Nordjylland

Porsvej 1

9000 Aalborg

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2015.

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk

Vnr. 701268-01