

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Glukose-kaliumfosfat SAD 275 g + 3,4 g/l infusionsvæske, opløsning

Glucosemonohydrat og kaliumdihydrogenphosphat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Glukose-kaliumfosfat SAD til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Glukose-kaliumfosfat SAD
3. Sådan skal du tage Glukose-kaliumfosfat SAD
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Glukose-kaliumfosfat SAD er et lægemiddel til regulering af væske- og saltbalancen.

Glukose-kaliumfosfat SAD anvendes ved behov for kalium, fosfat samt energi i form af kulhydrater.

Du vil få Glukose-kaliumfosfat SAD som en infusion i en blodåre (intravenøs anvendelse) af en læge eller sygeplejerske.

Lægen kan give dig Glukose-kaliumfosfat SAD for noget andet. Spørg lægen.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE GLUKOSE-KALIUMFOSFAT SAD

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før du tager Glukose-kaliumfosfat SAD:

- hvis du har sukkersyge (diabetes)
- hvis du har komplikationer i forbindelse med sukkersyge (coma diabeticum)
- hvis du har dårligt fungerende nyrer
- hvis du er svært fejlerenær (f.eks. i forbindelse med et alkoholmisbrug, faste over længere tid, anorexi eller graviditet med kvalme og opkastninger (eremesis gravidarum))

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Glukose-kaliumfosfat SAD. Det kan påvirke prøveresultaterne.

For hurtigt tilførsel/infusion kan føre til glukose i urinen (glukosuri) og for højt blodsukker (hyperglykæmi). Normalt kan man omsætte 0,5-1 g glukose pr. kg kropsvægt i timen uden at udvikle for højt blodsukker. Ved tilførsel af større mængder er der risiko for udvikling af hyperglykæmisk nonketotisk koma.

Pludseligt ophør af infusion med glukose kan medføre for lavt blodsukker med symptomer.

For højt blodsukker viser sig ved hyppig vandladning, tørst og træthed. For lavt blodsukker giver symptomerne mathed, koldsved, sult, forvirring, evt. bevidstløshed og kramper.

Dette lægemiddel bør ikke gives gennem samme nål som blodtransfusion, da dette kan beskadige de røde blodlegemer eller bevirke, at de klumper sammen.

Brug af anden medicin sammen med Glukose-kaliumfosfat SAD

Fortæl altid lægen, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brug af Glukose-kaliumfosfat SAD sammen med mad og drikke

Glukose-kaliumfosfat SAD kan gives uafhængigt af måltider.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Du må gerne få Glukose-kaliumfosfat SAD, hvis du er gravid eller ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Glukose-kaliumfosfat SAD påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Glukose-kaliumfosfat SAD indeholder glucose

Denne medicin indeholder 275 g glucose pr. liter. Diabetespatienter skal tage hensyn hertil.

Glukose-kaliumfosfat SAD indeholder kalium

Denne medicin indeholder 25 mmol kalium pr. liter. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE GLUKOSE-KALIUMFOSFAT SAD

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Glukose-kaliumfosfat SAD findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre. Du vil normalt få Glukose-kaliumfosfat SAD af en læge eller sygeplejerske.

Du må få Glukose-kaliumfosfat SAD i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Dosering

Doseringen er individuel og afhænger af din alder, vægt og kliniske tilstand. Lægen vil afgøre den rette dosis til dig.

Den maksimale dosis er 550 mg glucosemonohydrat (~2 ml Glukose-kaliumfosfat SAD) pr kg kropsvægt i timen som infusion i en stor central vene. Der må dog højst gives 125 ml i timen.

Hvis du har brugt for meget Glukose-kaliumfosfat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du har fået for meget Glukose-kaliumfosfat SAD vil din læge eller sundhedspersonalet tage de nødvendige forholdsregler.

Hvis du har fået for meget Glukose-kaliumfosfat SAD, eller hvis det er givet for hurtigt, kan du få følgende symptomer:

- hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker og udskillelse af sukker i urinen
- påvirket vandladning og udskillelse af sukker i urinen, som kan medføre dehydrering, højt blodsukker og påvirkning af serum
- vand i lungerne

Hvis du har glemt at bruge Glukose-kaliumfosfat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at tage Glukose-kaliumfosfat SAD

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

Alvorlige: Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt pga. vand i lungerne. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige: Udskillelse af sukker (glukose) i urinen.

Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk) eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Glukose-kaliumfosfat SAD utilgængeligt for børn.

Brug ikke Glukose-kaliumfosfat SAD efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Anv. inden. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar Glukose-kaliumfosfat SAD i original yderpakning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Glukose-kaliumfosfat SAD infusionsvæske indeholder:

Aktivt stof: Glucosemonohydrat og kaliumdihydrogenphosphat

Øvrige indholdsstoffer: Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Glukose-kaliumfosfat SAD er en klar, farveløs til svagt gul væske.

Glukose-kaliumfosfat SAD findes i pakningsstørrelser på:

500 ml infusionsbeholdere og

1000 ml infusionsbeholdere

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amgros I/S

Dampfærgevej 22

2100 København Ø

amgros@amgros.dk

Fremstiller

Region Hovedstadens Apotek

Marielundvej 25

2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret marts 2015.

Seneste nye indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på www.produktresume.dk

Vnr. 701300-01