

Indlægsseddel: Information til brugeren

FUCICORT®

20 mg/g / 1 mg/g creme

Fusidinsyre/betamethason

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Fucicort til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort.
3. Sådan skal du bruge Fucicort.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

- Fucicort er et kombinationspræparat, som indeholder et antibiotikum (fusidinsyre) og et stærkt binyrebarkhormon (betamethasonvalerat). Det hører til gruppen af stærkt virkende glukokortikoider.
- Fucicort virker ved at hæmme bakteriers vækst, og virker ved at hæmme betændelse, dæmpe kløe, hævelse og ømhed.
- Du kan bruge Fucicort til behandling af allergisk kontakteksem og andre typer eksem, som er forårsaget af bakterier der er følsomme overfor fusidinsyre.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fucicort

Brug ikke Fucicort

- Hvis du er allergisk over for fucidinsyre, betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fucicort (angivet i punkt 6).
- Hvis du lider af en svampeinfektion, som er gået over i blodet (systemisk svampeinfektion).
- Hvis du har en hudsygdom, som skyldes svamp, bakterier eller virus enten ubehandlet eller hvor behandlingen ikke er under kontrol.
- Hvis du har hudsygdomme, som er relateret til tuberkulose, enten ubehandlet eller hvor behandlingen ikke er under kontrol
- Hvis du har Rosacea (hudsygdom i ansigtet med rødme, især på hage, næse, kinder og pande).
- Hvis du har eksem rundt om munden (perioral dermatitis).
- Til behandling af bumser.
- Til hudlidelser hos børn under 1 år, herunder eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Fucicort

- Brug ikke Fucicort længere end højst nødvendigt og ikke længere end lægen har sagt til dig, især ikke hos børn, da binyrebarkhæmning kan optræde. Behandlingen bør ikke overskride 2 uger.
- Undgå at få Fucicort i øjnene.
- Langvarig brug af Fucicort kan forårsage tynd hud, der let går i stykker/skør hud (hudatrofi).
- Overdreven brug af Fucicort, kan øge din risiko for, at blive resistent overfor antibiotika.
- Fucicort kan skjule mulige symptomer på infektion.
- Fucicort kan gøre dig mere modtagelig for infektion, forværre eksisterende infektion og aktivere en hvilende infektion. Hvis du oplever det bør du tale med din læge og skifte til en anden behandling.

Børn og unge

Fucicort skal bruges med forsigtighed hos børn. Undgå store mængder, lufttæt forbindelse og længerevarende behandling. Børn kan være mere følsomme for bivirkninger af kortikosteroider end voksne, hvor symptomerne

kan være øget risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse, f.eks. lungebetændelse, (reversibel hypothalamus-hypofyse-binyrebark akse (HPA akse)) eller rødt, rundt "måneansigt" (Cushings sygdom).

Brug af anden medicin sammen med Fucicort

Ingen kendte problemer.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun bruge Fucicort efter aftale med lægen.

Amning:

- Du kan bruge Fucicort i korte perioder, selv om du ammer. Spørg lægen.
- Du må ikke smøre Fucicort creme på brystet når du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucicort påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fucicort

- Denne medicin indeholder cetostearylalkohol og kaliumsorbat som kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem).
- Denne medicin indeholder chlorecresol som kan medføre allergisk reaktion.

3. Sådan skal du bruge Fucicort

Brug altid Fucicort nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

- Du må kun bruge Fucicort på betændt hud.
- Du skal vaske hænder, hver gang du har påsmurt cremen, med mindre du skal behandle hænderne

Den sædvanlige dosis er

Den anbefalede dosis er

Voksne og børn:

Påsmør et tyndt lag 2-3 gange daglig.

Hvis du har brugt for meget Fucicort

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har brugt mere Fucicort, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Ved langvarig og overdreven brug af binyrebarkhormon i mere end 3 uger, er din risiko for at få bivirkninger øget.

Hvis du har glemt at bruge Fucicort

- Har du glemt at påsmøre Fucicort creme, skal du blot fortsætte behandlingen som hidtil.

Hvis du holder op med at bruge Fucicort

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Systemiske bivirkninger af kortikosteroider, som betamethasonvalerat, omfatter:

- Binyrebarkhæmning især ved længere tids vedvarende behandling på huden. Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller alvorlig betændelse (f.eks. lungebetændelse). Ved akut, alvorlig sygdom, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Komplikationer ved påføring for tæt på øjet og hvis du er i risiko for at udvikle glaukom. Hovedpine, kvalme, synsnedsettelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet, glaukom (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Allergiske reaktioner.
- Kontakt eksem.
- Forværring af eksem.
- Brændende fornemmelse i huden.
- Kløe.
- Tør hud.
- Smerte og irritation på påføringsstedet.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Rødmen af huden (erytem).
- Nældefeber (urticaria).
- Udslæt, generelt udslæt.
- Hævelse på påføringsstedet.
- Blærer på påføringsstedet.

Bivirkninger forårsaget af behandling med stærke kortikosteroider omfatter:

- Tynd hud (hudatrofi).
- Eksem.
- Eksem rundt om munden.
- Striber på huden.
- Udvidelse af de små blodkar i huden (telangiectasia).
- Vedvarende rødme (rosacea).
- Rødmen af huden (erytem).
- Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigtet, på kroppen samt arme og ben (hypertrikose).
- Kraftig sveden (hyperhidrose).
- Affarvning af huden.
- Blødninger i huden kan også forekomme ved langvarig brug (ekchymose).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: [sst.dk](mailto:ssst.dk).

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar Fucicort utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Fucicort efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Opbevar ikke Fucicort ved temperaturer over 30 °C.
- Fucicort creme er holdbar i 3 måneder efter åbning af tuben
- Opbevar ikke Fucicort over 25 °C efter åbning af tuben.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fucicort 20 mg/g og 1 mg/g creme indeholder:

Aktive stoffer:

Fucidinsyre 20 mg/g

Betamethasonvalerat svarende til betamethason 1 mg/g

Øvrige indholdsstoffer:

Cetostearylalkohol, macrogolcetostearylether, paraffinolie, hvid blød paraffin, natriumhydroxid, natriumdihydrogenphosphat dihydrat, chlorcresol, all-*rac*-a-tocopherol, rensset vand,

Pakningsstørrelser:

Fucicort fås i:

Fucicort 20 mg/g / 1 mg/g i pakninger med 15 g og 30 g.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstillere

Indhaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstillere:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 03/2015