

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xylocain® 10 mg/dosis, kutanspray, opløsning lidocain

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Xylocain® kutanspray til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain® kutanspray
3. Sådan skal du bruge Xylocain® kutanspray
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Xylocain® kutanspray er lidocaine, som tilhører gruppen af lokalbedøvende lægemidler.

Xylocain® kutanspray anvendes til:

- Bedøvelse af huden samt bedøvelse af slimhinder i forbindelse med lægeundersøgelser og operationer i næse og svælg.
- Xylocain® kutanspray kan bruges til voksne og børn over 2 år.

Lægen kan have givet dig Xylocain® kutanspray for noget andet. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten..

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain® kutanspray

Brug ikke Xylocain® kutanspray, hvis:

- du er overfølsom (allergisk) over for lidocain eller andre lokalanalgetika af amidtypen eller over for et eller flere af hjælpestoffer. anført i punkt 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen, inden du bruger Xylocain® kutanspray, hvis du:

- har sår eller betændelse i området, hvorpå Xylocain® skal påføres.
- har epilepsi.
- lider af en hjerte-karsygdom eller andre hjerteproblemer så som forstyrrelse i hjertets ledningsevne (hjerteblok) eller hjerterytmeforstyrrelser (Wolff-Parkinson-White syndrom).
- har langsom puls eller for lavt blodtryk.
- har nedsat lever- eller nyrefunktion.
- eller nogen i din familie lider af porfyri (en arvelig sygdom i stoffskiftet).
- har generelt dårligt helbred eller er ældre.

Vær opmærksom på følgende:

- Brug af Xylocain® i mund og svælg, kan påvirke evnen til at synke. Dette kan øge risikoen for, at få Xylocain® ned i lufttrøret. Følelsesløshed af tunge eller mundslimhinde kan desuden øge risikoen for bidskader. Du bør vente med at spise og drikke til ca. 2 timer efter bedøvelsen.

Brug af andre lægemidler sammen med Xylocain® kutanspray

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Xylocain® kutanspray kan påvirke virkningen af anden medicin, ligesom anden medicin kan påvirke virkningen af Xylocain® kutanspray. Tal med din læge eller tandlæge, hvis du tager:

- medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmikum) så som amiodaron.
- anden lokalbedøvende medicin eller medicin, der ligner lidocain (amidtypen).

- cimetidin (mod mavesår).
- beta-blokkere (lægemiddel mod forhøjet blodtryk).
- fluvoxamin (lægemiddel mod depression).

Xylocaine kutanspray, opløsning, indeholder alkohol.

Hvis du er i behandling med disulfiram (Antabus) eller metronidazol (mod betændelse), må du ikke bruge Xylocain® uden først at tale med lægen.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Xylocain® kutanspray selvom du er gravid.

Amning

Du kan bruge Xylocain® kutanspray, selvom du ammer, dog ikke på brystvorterne lige før amning.

Vigtige informationer om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xylocain® kutanspray

Xylocain® indeholder ethanol

Dette lægemiddel indeholder 24,1 mg alkohol (ethanol 96%) per dosis svarende til 241 mg/ml. Det kan forårsage en brændende fornemmelse på skadet hud.

Xylocain® bør på grund af indholdet af ethanol ikke anvendes ved samtidig behandling med disulfiram eller metronidazol. Pga. indholdet af ethanol anbefales forsigtighed ved anvendelse til alkoholikere, børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Afhængigt af dosis kan lokalanalgetika have en meget let virkning på de mentale funktioner og kan kortvarigt forstyrre bevægelse og koordination. Vent med at køre bil eller betjene maskiner. Din læge eller tandlæge vil fortælle dig, hvornår det er sikkert for dig at køre bil eller betjene maskiner igen.

3. Sådan skal du bruge Xylocain® kutanspray

Brug altid Xylocain® kutanspray nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du vil normalt få Xylocain® af en læge eller tandlæge.

Appliceres direkte på hud eller slimhinde.

Den sædvanlige dosis er:

Dosis af Xylocain® kutanspray er individuel, og afhænger af den mængde smertelindring du behøver. Dosis vil derfor variere fra patient til patient, og er også afhængig af dennes alder og helbred.

Den sædvanlige dosis til voksne er mellem 20 og 200 mg (2-20 pust).

Brug til børn

Børn over 12 år, der vejer mindre end 25 kg: Dosering er individuel og afhænger af barnets vægt og fysiologiske tilstand.

Børn under 12 år: Dosering er individuel. Dosis bør ikke overstige 3 mg/kg ved anvendelse i struben, og 4-5 mg/kg ved anvendelse i næse, mund og svælg.

Til nyfødte og spædbørn anbefales en lidocain opløsning med lavere koncentration.

Ældre

Kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har brugt for meget Xylocain® kutanspray

Kontakt lægen, tandlægen eller apoteket, hvis du har anvendt mere Xylocain® kutanspray, end der står her eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er: prikkende, snurrende fornemmelse i læberne, følelsesløshed i tungen, uklarhed, skærpet hørelse, susen for ørerne (tinnitus), synsforstyrrelser, muskelrysten, bevidstløshed, kram-

peanfald og påvirkning af vejrtrækningen, for lavt blodtryk, langsom puls, hjerterytmeforstyrrelser og shock.

Hvis du har glemt at bruge Xylocain® kutanspray

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Xylocain® kutanspray
Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Allergiske reaktioner, som i alvorlige tilfælde medfører anafylaktisk shock (pludselig allergisk reaktion såsom hududslæt, hævelse, feber, åndedrætsbesvær og besvimelse). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Forbigående ondt i halsen, hæshed, mistet stemme.
- Reaktion på anvendelsesstedet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Xylocain® kan forårsage akutte symptomer på forgiftning ved overdosering eller ved høj koncentration i blodet efter hurtig absorption.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Xylocain® kutanspray utilgængeligt for børn.

Særlige opbevaringsbetingelser: Ingen.

Brug ikke Xylocain® kutanspray efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xylocain® 10 mg/dosis, kutanspray, opløsning indeholder:

Aktivt stof: Lidocain 10 mg/dosis.

Øvrige indholdsstoffer: Ethanol 96 %, macrogoler (macrogol 400), bananessens, menthol, saccharin, rensat vand.

Udseende og pakningsstørrelse:

Xylocain® fås i 50 ml glasflaske med pumpe-spray dosering og et kort plastik sprayrør (ca. 120 mm) .

Lange sterile sprayrør (ca. 230 mm) er tilgængelige i 50 stk. pakninger.

Sprayrørets spids er allerede bøjet til rette position, og der bør ikke ændres ved røret før brug. Spidsen på røret må ikke afkortes, da dette ødelægger sprayfunktionen.

Sprayrør bør ikke genbruges og bør kasseres direkte efter brug.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ChemVet Pharma ApS

A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg

Ompakket og frigivet af

ChemVet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg

Denne indlægsseddel er senest revideret august 2023.

Xylocain® er et registreret varemærke, der tilhører Aspen Pharma Trading Limited.