

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Noscapin DAK 25 mg filmovertrukne tabletter

Noscapin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Du kan få Noscapin DAK uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Noscapin DAK.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Noscapin DAK
3. Sådan skal du tage Noscapin DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Noscapin DAK er et hostestillende middel mod tør hoste uden slim.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Noscapin DAK for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE NOSKAPIN DAK

Tag ikke Noscapin DAK

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for noscapinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer

Vær ekstra forsigtig med at tage Noscapin DAK

- tal med lægen inden du tager Noscapin DAK, hvis du har hoste med slim
- du bør ikke tage Noscapin DAK samtidig med alkohol

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- nerve- eller sovemedicin
- blodfortyndende medicin (warfarin)

Brug af Noskapin DAK sammen med mad og drikke

Du kan tage Noskapin DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du bør ikke tage Noskapin DAK samtidig med alkohol.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Noskapin DAK efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Noskapin DAK efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Noskapin DAK kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Noskapin DAK

Noskapin DAK indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE NOSKAPIN DAK

Hvis din læge har ordineret Noskapin DAK til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Tabletterne kan synkes hele, deles eller knuses og tages sammen med rigelig væske. Til mindre børn er det en god idé at knuse og opløse tabletten i vand eller saft.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1 – 2 tabletter 3 gange daglig.

Børn over 2 år: ½ tablet 2 – 3 gange daglig.

Du må kun bruge Noskapin DAK til børn under 2 år efter aftale med lægen.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Noskapin DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Noskapin DAK, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er hududslæt, rødme, hovedpine, sløvhed, kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Noskapin DAK

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Noscapin DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Hovedpine, døsighed.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Hævelse af tunge, læber og ansigt, som kan medføre, at luftvejene blokeres (Quinckes ødem).

Ikke alvorlige: Nældefeber, overfølsomhedsreaktioner for eksempel i form af allergi.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Noscapin DAK utilgængeligt for børn.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.

Tag ikke Noscapin DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Noscapin DAK 25 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof: Noscapinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Crospovidon (E 1202), gelatine, hypromellose 15 (E 464), kartoffelstivelse, lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460), propylenglycol (E 1520), talcum (E 553b) og rensset vand.

Farvestof: Titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Noscapin DAK 25 mg er hvide, hvælvede, filmovertrukne tabletter med delekærv.

Noskapin DAK 25 mg findes i pakningsstørrelser à 20 og 50 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2011.