

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Nitroglycerin DAK 0,25 mg og 0,5 mg sublinguale resoribletter Glyceryltrinitrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Nitroglycerin DAK nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apoteket, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nitroglycerin DAK
3. Sådan skal du tage Nitroglycerin DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Du kan bruge Nitroglycerin DAK til at behandle og forebygge anfald af hjertesmerter (angina pectoris). Nitroglycerin DAK udvider blodkarrene i hjertet, så blodtilførslen og iltforsyningen til hjertet bliver bedre.

Hvis din læge har sagt, at du skal tage Nitroglycerin DAK for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nitroglycerin DAK

Tag ikke Nitroglycerin DAK hvis du:

- er allergisk over for glyceryltrinitrat, nitrater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Nitroglycerin DAK
- tager medicin mod impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil)
- har væske i hjertesækken (perikardietamponade)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du tager Nitroglycerin DAK, hvis du:

- har meget lavt blodtryk og tendens til svimmelhed eller besvimelse, når du rejser dig op
- lider af svær blodmangel, væskemangel eller har for lidt ilt i blodet
- har betændelse i hjertesækken
- har langsom puls

- har kredsløbskollaps
- lider af andre hjerte-kar sygdomme
- har forkalkninger i hjernens blodkar, for højt tryk i hjernen eller har haft hjerneblødninger eller kranietraumer
- har for højt stofskifte
- har dårlige nyrer
- har dårlig lever

Hvis du har øget tryk i øjet, bør du have trykket kontrolleret hos lægen.

Nitroglycerin DAK virker bedst, hvis du hvert døgn har en periode på 8 - 12 timer, hvor du ikke tager Nitroglycerin DAK eller andre nitrat-præparater.

Undgå alkohol, da Nitroglycerin DAK i kombination med alkohol forstærker alkohols blodtrykssænkende effekt.

Brug af anden medicin sammen med Nitroglycerin DAK

Tal med din læge, du hvis tager:

- slimløsnende medicin (acetylcystein)
- medicin mod impotens (sildenafil, tadalafil eller vardenafil)
- hjertemedicin og medicin mod forhøjet blodtryk (betablokkere, kalciumantagonister og vanddrivende midler)
- medicin mod migræne (dihydroergotamin)
- blodfortyndende medicin (heparin)
- medicin mod blodpropper (alteplase)
- medicin mod depression og andre psykiske lidelser

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Brug af Nitroglycerin DAK sammen med mad, drikke og alkohol

Undgå alkohol, da Nitroglycerin DAK i kombination med alkohol forstærker alkohols blodtrykssænkende effekt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Nitroglycerin DAK.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Nitroglycerin DAK efter aftale med lægen.

Amning

Du må ikke tage Nitroglycerin DAK, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nitroglycerin DAK kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Nitroglycerin DAK indeholder lactose, hvor advarsel er påkrævet

Nitroglycerin DAK indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Nitroglycerin DAK

Tag altid Nitroglycerin DAK nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Nitroglycerin DAK skal placeres under tungen. Så optages medicinen bedst og virker hurtigst.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 1 resoriblet (0,25 mg eller 0,5 mg) ved behov.

Ældre: 1 resoriblet (0,25 mg eller 0,5 mg) ved behov. Det er vigtigt at bruge den lavest mulige effektive dosis, da ældre har øget risiko for blodtryksfald.

Brug til børn og teenagere:

Nitroglycerin DAK må ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Det er vigtigt at tage Nitroglycerin DAK, så snart du får smerter eller trykken i brystet. Du kan også tage Nitroglycerin DAK før aktiviteter, som du ved vil udløse smerterne.

Læg resoribletten under tungen. Medicinen virker efter 1/2 - 2, højst 5 minutter. Hvis medicinen alligevel ikke virker efter 5 minutter, skal du tage endnu en resoriblet. Du må højst tage 3 resoribletter i løbet af 15 minutter.

Virkningen varer 10 - 30 minutter. Du skal så vidt muligt sidde eller ligge ned, når du tager medicinen. Så bliver du ikke så let svimmel, hvis dit blodtryk falder.

Du kan ikke bruge Nitroglycerin DAK, hvis du lider af mundtørhed.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Nitroglycerin DAK

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Nitroglycerin DAK end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Tegn på overdosering er kraftig rødmen i ansigtet, kraftig hovedpine, svimmelhed, hurtig puls, kvælningss fornemmelse, lavt blodtryk, besvimelse samt i sjældne tilfælde blåfarvning af hud og slimhinder.

Hos nogle få kan der opstå en shock lignende tilstand med kvalme, opkastning, svaghed, svedtendens og besvimelsesanfald.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Kortvarig hovedpine og rødmen ses i opstartsfasen hos op mod halvdelen af alle behandlede.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):
Hovedpine.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):
Døsighed, svimmelhed, svaghedsfornemmelse, lavt blodtryk, hurtig puls, forbigående rødmen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):
Forværring af hjertesmerter (alvorlig), kvalme, allergiske hudreaktioner.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):
Besvimelse, opkastning, huller i tænderne. Tendens til hurtig puls, svimmelhed og besvimelse når man rejser sig hurtigt op.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet (alvorlig), alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag (alvorlig).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Nedsat iltmætning i blodet og iltmangel i hjertemuskulaturen hos patienter med sygdomme i kranspulsåren (alvorlig), smerter i øjet (alvorlig), stikkende eller brændende fornemmelse i munden eller halsen, hedeture.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

Opbevar Nitroglycerin DAK utilgængeligt for børn.

Resoribletterne bør blive i originalemballagen (med låget skruet fast til) for at hindre, at medicinen bliver uvirksom. Opbevares resoribletterne i en pilleæske, anbefales det at udskifte dem hver 3. dag. Opbevares en resoriblet frit på natbordet, skal den udskiftes dagligt.

Brug ikke Nitroglycerin DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nitroglycerin DAK 0,25 mg og 0,5 mg sublinguale resoribletter indeholder

Aktivt stof: Glyceryltrinitrat.

Øvrige indholdsstoffer: Agar (E406), lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E460) og talcum (E553b).

Udseende og pakningsstørrelser

Nitroglycerin DAK er runde, hvide, plane tabletter uden delekærv.

Nitroglycerin DAK 0,25 mg findes i pakningsstørrelser à 25 og 100 stk.

Nitroglycerin DAK 0,5 mg findes i pakningsstørrelser à 25 og 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Norge: Nitroglycerin Nycomed

Island: Nitroglycerin DAK

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2011.