

Hvis Ritalin LA ikke bruges korrekt

Hvis Ritalin LA ikke bruges korrekt, kan det resultere i abnorm adfærd. Det kan også betyde, at du begynder at blive afhængig af medicinen. Fortæl det til din læge, hvis du nogensinde har misbrugt eller været afhængig af alkohol, receptpligtig medicin eller narkotika.

Denne medicin er kun til dig eller dit barn. Du må ikke give den til andre, selvom deres symptomer ligner dine eller dit barns.

Hvis du har taget for mange Ritalin LA-kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Ritalin LA-kapsler end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med og fortæl, hvor meget der er taget. Symptomer på overdosering kan fx være: opkastning, føle sig urolig, rysten, ufrivillige bevægelser bliver værre, muskeltrækninger, anfald (kan efterfølges af koma), føle sig meget lykkelig, forvirring, se, føle eller høre ting, der ikke er virkelige (hallucinationer), sveden, rødmen, hovedpine eller høj feber, anderledes hjerterytme (langsom, hurtig eller ujævn), højt blodtryk, udvidede pupiller og tørhed i næse og mund.

Hvis du har glemt at tage Ritalin LA

Du må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du glemmer en dosis, skal du vente til tidspunktet for den næste dosis.

Hvis du holder op med at tage Ritalin LA

Hvis du pludselig holder op med at tage denne medicin, kan ADHD-symptomerne vende tilbage, eller bivirkninger som fx depression kan opstå.

Lægen vil måske gradvist nedsætte mængden af den daglige medicin, før du holder op med at tage Ritalin LA. Tal med din læge, før du holder op med at tage Ritalin LA.

Ting, som din læge vil gøre, når du er i behandling Din læge vil foretage nogle undersøgelser

- før du starter – for at sikre sig, at Ritalin LA er sikkert og vil hjælpe.
- når du er startet – undersøgelserne vil blive foretaget mindst hver 6. måned, men muligvis oftere. De vil også blive foretaget, når dosis ændres.
- Disse undersøgelser vil omfatte:
 - forespørgsel om din appetit
 - måling af højde og vægt (børn)
 - måling af vægt for voksne
 - måling af blodtryk og hjerterytme
 - forespørgsel om du har problemer med humøret, din psykiske tilstand, eller andre usædvanlige følelser. Eller om disse er blevet værre, mens du har taget Ritalin LA.

Langtidsbehandling

Det er ikke nødvendigt at blive ved med at tage Ritalin LA altid. Hvis du tager Ritalin LA i mere end et år, vil din læge stoppe behandlingen mindst en gang om året en kort tid. For børn kan det fx ske i en skoleferie. Det vil vise, om der stadig er brug for medicinen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Selvom nogle mennesker får bivirkninger, synes de fleste, at Ritalin LA hjælper dem. Din læge vil tale med dig om disse bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige. Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført nedenfor, skal du straks søge læge:

Almindelige (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- ujævn hjerterytme (palpitationer)
- humørforandringer eller humørsvingninger eller personlighedsændringer

Ikke almindelige (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- tanker om eller lyst til at begå selvmord
- ser, føler eller hører ting, der ikke er virkelige, disse er tegn på psykose
- ukontrolleret tale eller bevægelser (Tourettes syndrom)
- tegn på allergi, som fx udslæt, kløe eller nældefeber, hævelser i ansigtet, hævede læber, hævet tunge eller hævelser i andre kropsdele, stakåndethed, hvæsende åndedræt eller åndedrætsbesvær

Sjældne (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- følelse af usædvanlig opstemthed, hyperaktiv og uden hæmninger (mani)

Meget sjældne (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- hjerteanfald
- anfald (krampeanfald, krampetrækninger, epileptiske anfald)
- afskalning af huden eller purpurrøde pletter
- muskelkramper, som du ikke kan kontrollere, som påvirker dine øjne, hoved, hals, krop og nervesystem pga. midlertidig mangel på blodtilførsel til hjernen
- lammelse eller bevægelses- og synsproblemer, talebesvær (kan være tegn på problemer med blodkarrene i hjernen)
- nedsat antal blodlegemer (røde, hvide og blodplader), hvilket kan gøre dig mere modtagelig for infektioner og gøre,

at du lettere bløder og får blå mærker

- pludselig stigning af kropstemperaturen, meget højt blodtryk og alvorlige krampeanfald (Malignt neuroleptikasyndrom). Det er ikke sikkert, om denne bivirkning skyldes Ritalin LA eller andre lægemidler, der tages i kombination med Ritalin LA.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- uønskede tanker, som bliver ved med at vende tilbage
- uforklarlig besvimelse, brystsmertes, kortåndethed (kan være tegn på hjerteproblemer),

Hvis du får nogen af de bivirkninger, der er anført ovenfor, skal du straks søge læge.

Andre bivirkninger kan også forekomme; hvis de bliver alvorlige, skal du fortælle det til din læge eller på apoteket:

Meget almindelige (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

- nedsat appetit
- hovedpine
- nervøsitet
- søvnløshed
- kvalme
- tør mund

Almindelige (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- ledsmerter
- høj temperatur (feber)
- usædvanligt hårtab, eller at håret bliver tyndere
- usædvanlig søvniq eller døsigt
- appetitløshed
- angstanfald
- nedsat sexlyst
- tandpine
- kløe, udslæt eller hævet, rødt kløende udslæt (nældefeber)
- ekstrem megen sveden
- hoste, ondt i halsen eller irritation i næse og svælg, stakåndethed eller brystsmertes
- højt blodtryk, hurtig hjerterytme (takykardi), kolde hænder og fødder
- rysten eller skælven, svimmelhed, bevægelser, du ikke kan kontrollere, anspændelse, usædvanlig aktiv
- aggressivitet, uro, rastløshed, ængstelig, deprimeret, stresset, irriterabel, unormal adfærd, søvnproblemer, træthed.
- mavesmerter, diarré, ubehag i maven, fordøjelsesbesvær, tørst og opkastninger. Disse bivirkninger forekommer normalt i begyndelsen af behandlingen og kan mindskes ved at tage medicinen sammen med mad

Ikke almindelige (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- forstoppelse
- ubehag i brystet
- blod i urinen
- dobbeltsyn eller sløret syn
- muskelsmerter, muskeltrækninger, muskelstivhed
- forhøjede levertal (ses i blodprøver)
- vrede, lyst til at græde, overdreven bevidsthed om omgivelserne, anspændthed

Sjældne (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- ændringer i sexlyst
- at føle sig desorienteret
- udvidede pupiller, synsbesvær
- forstørrede bryster hos mænd
- rødme af huden, rødt, hævet hududslæt

Meget sjældne (Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- hjerteanfald
- pludselig død
- muskelkramper
- små, røde pletter på huden
- betændelse i eller blokerede arterier i hjernen
- unormal leverfunktion – herunder leversvigt og koma
- ændringer i prøveresultater – herunder lever- og blodprøver
- selvmordsforsøg, unormale tanker, manglende følelser eller sindsbevægelser, gøre tingene om og om igen, være besat af én ting
- fingre og tæer er følelsesløse, snurre og skifter farve (fra hvide til blå og derefter røde), når det er koldt (Raynauds syndrom)

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- migræne
- meget høj feber
- langsomme, hurtige eller ekstra hjerteslag
- et større krampeanfald (grand mal-krampeanfald)
- at tro ting, der ikke er sande, forvirring
- alvorlige mavesmerter, ofte sammen med kvalme og opkastning
- problemer med blodkarrene i hjernen (slagtilfælde, cerebral arthritis eller cerebral okklusion)
- impotens.

Virkninger på vækst

Når Ritalin LA tages i mere end et år, kan det medføre nedsat vækst hos nogle børn. Dette rammer færre end 1 ud af 10 børn.

- Der kan være manglende vægtøgning eller højdevækst.
- Din læge vil omhyggeligt holde øje med din højde og vægt, og hvor godt du spiser.
- Hvis du ikke vokser som forventet, kan behandlingen med Ritalin LA blive stoppet i en kort periode.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Sørg for at opbevare din medicin et sikkert sted, så der ikke er andre, der kan tage den, især yngre søskende. Brug ikke Ritalin LA efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning (beholder med børnesikret lukke). Hold beholderen tæt tillukket.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ritalin LA indeholder:

Aktivt stof: methylphenidathydrochlorid.

- Ritalin LA 10 mg indeholder 10 mg methylphenidathydrochlorid.
- Ritalin LA 20 mg indeholder 20 mg methylphenidathydrochlorid
- Ritalin LA 30 mg indeholder 30 mg methylphenidathydrochlorid
- Ritalin LA 40 mg indeholder 40 mg methylphenidathydrochlorid

Øvrige indholdsstoffer: ammoniummethacrylat copolymer, gelatine, methacrylsyre-methylmetacrylat copolymer, saccharosekugler, talcum, titandioxid (E 171), triethylcitrat, gul jernoxid (E 172) (kun 10 mg, 30 mg og 40 mg kapsler), sort jernoxid (E 172) (kun 10 mg og 40 mg kapsler), macrogol, rød jernoxid (E 172) (kun 10 mg og 40 mg kapsler).

Udseende og pakningsstørrelser

Ritalin LA, hårde kapsler med modificeret udløsning, fås i fire styrker: 10 mg, 20 mg, 30 mg og 40 mg.

Produktet fås i pakninger med 28 kapsler.

Ikke alle styrker og pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frigiver:

Tabb ´n Caps Pack ApS

Lejrvej 27

3500 Værløse

Ompakker

kohlpharma GmbH

Im Holzau 8

66663 Merzig

Tyskland

Fremstiller:

Novartis Pharma GmbH

90327 Nürnberg

Tyskland

Denne indlægsseddel blev senest ændret 04.2014