

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Pamol® 125 mg tabletter paracetamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Pamol nøjagtig som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, eller apotekspersonalet, eller sundhedspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pamol
3. Sådan skal du tage Pamol
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pamol tabletter 125 mg er et smertestillende lægemiddel til lindring af svage til moderate smerter hos børn. Pamol virker febernedsættende.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Pamol for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pamol

Tag ikke Pamol

- hvis du er allergisk over for paracetamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pamol (angivet i afsnit 6).
- hvis du har stærkt nedsat leverfunktion.

Advarsler og forsigtighedsregler

BØRN ELLER UNGE I HJEMMET?

Læs advarslen og vær omhyggelig med,
hvordan du opbevarer denne medicin.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Pamol. Pamol bør anvendes med forsigtighed, hvis du:

- har nedsat leverfunktion
- lider af kronisk alkoholisme

- har stærkt nedsat nyrefunktion

Hvis du får høj feber, tegn på infektion eller hvis dine symptomer varer i mere end 3 dage, skal du altid kontakte lægen.

Overskrides den anbefalede dosis kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis der er mistanke om overdosering, bør du straks søge læge.

Vanemæssig og samtidig brug af flere forskellige smertestillende lægemidler kan medføre nyreskader med risiko for nyresvigt.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Pamol. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Ved længerevarende brug af enhver type smertestillende medicin kan hovedpine blive værre og opstå hyppigere. Det kaldes medicin-overforbrugs-hovedpine. Kontakt din læge hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald.

Brug af anden medicin sammen med Pamol

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen inden du tager Pamol, hvis du er i behandling med en eller flere af følgende slags medicin:

- medicin mod urinsur gigt (probenecid)
- smertestillende medicin (salicylamid)
- medicin mod kvalme og opkastning (domperidon, metoclopramid)
- medicin mod forhøjet kolesterol (cholestyramin)
- blodfortyndende medicin (warfarin, andre coumariner)
- medicin mod epilepsi (carbamazepin, fenytoin)

For at undgå overdosering skal du sikre dig, at medicin du bruger samtidigt med Pamol ikke også indeholder paracetamol.

Brug af Pamol sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Pamol i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Et samtidigt kronisk forbrug af alkohol kan øge risikoen for leverforgiftning

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Pamol.

Graviditet

Du kan tage Pamol under graviditet.

Amning

Du kan tage Pamol, selvom du ammer.

Fertilitet

Paracetamol er vist ikke at have effekt på mandlig eller kvindelig fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pamol påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Pamol

Tag tabletten med rigelig væske. Du kan evt. dele eller knuse tabletten.

Brug altid Pamol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige daglige dosis til børn er: 50 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 – 4 doser, for eksempel:

10 kg: 1 tablet højst 4 gange i døgnet.

15 kg: 2 tabletter højst 3 gange i døgnet.

20 kg: 2 tabletter højst 4 gange i døgnet.

25 kg: 3 tabletter højst 3 gange i døgnet.

30 kg: 4 tabletter højst 3 gange i døgnet.

Det er vigtigt at overholde en dosering, der er tilpasset barnets vægt. Doseringen bør være jævnt fordelt over døgnet; herved undgås smerte- og feberudsving.

Du må kun bruge Pamol til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Nedsat lever- og nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Pamol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Pamol, end der står i denne indlægsseddel, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, appetitløshed, bleghed og mavesmerter.

Det er især børn, ældre samt personer med leversygdom, alkoholisme, alvorlig fejlnæring eller personer i behandling med lægemidler, som påvirker leveren, der har risiko for forgiftning ved overdosering.

Tag aldrig flere Pamol end anbefalet. En højere dosis øger ikke den smertestillende virkning, men kan i stedet medføre alvorlig leverskade. Symptomerne på leverskade opstår først efter nogle dage. Det er derfor meget vigtigt, at du straks kontakter din læge, hvis du har taget flere Pamol end anbefalet i denne indlægsseddel.

Hvis du har glemt at tage Pamol

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Bivirkninger som kan forekomme efter brug af Pamol

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):
Nældefeber, udslæt, påvirkning af leveren (alvorlig), herunder leverforgiftning og leversvigt, allergisk reaktion.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Overfølsomhedsreaktion f.eks. allergisk chok eller allergisk reaktion (alvorlig), almen sløvhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer)(alvorlig), blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader)(alvorlig) og påvirkning af luftvejene.

Ved langtidsbehandling er der risiko for nyreskader.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Pamol skal opbevares utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Pamol ved almindelig temperatur.

Brug ikke Pamol efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (Exp) er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Pamol 125 mg tabletter indeholder

Aktive stof: Paracetamol. Øvrige indholdsstoffer er kartoffelstivelse, magnesiumstearat (E 470b), mikrokrySTALLinsk cellulose (E 460) og povidon (E 1201).

Udseende og pakningsstørrelser

Pamol tabletter 125 mg er hvide, runde tabletter med delekærv på den ene side.

Pamol tabletter 125 mg findes i pakningsstørrelser à 20 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Denne indlægsseddel blev sidst revideret november 2013