MILPRO® VET

4 mg / 10 mg
16 mg / 40 mg

DA INDLÆGSSEDDEL

Veterinærlægemidlets navn: Milpro Vet, 4 mg/10 mg filmovertrukne tabletter til små katte og killinger
Milpro Vet, 16 mg/40 mg filmovertrukne tabletter til katte

Sammensætning: Hver tablet indeholder:

Aktive stoffer:

	Udseende:	Milbemycinoxim	Praziquantel
Milpro Vet, 4 mg/10 mg filmovertrukne tabletter til små katte og killinger	Ovale, mørkebrune tabletter med kødsmag og delekærv på begge sider.	4 mg	10 mg
Milpro Vet, 16 mg/40 mg filmovertrukne tabletter til katte	Ovale, røde til lyserøde tabletter med kødsmag og delekærv på begge sider.	16 mg	40 mg

Hjælpestoffer:

	Hjælpestoffer	Indhold
Milpro Vet, 4 mg/10 mg filmovertrukne tabletter til små katte og killinger	Jernoxid (E172)	0,3 mg
Milpro Vet, 16 mg/40 mg filmovertrukne tabletter til katte	Allurarød (E129)	0,1 mg
	Titandioxid (E171)	0,5 mg

Tabletterne kan deles i to.

Dyrearter: Katte.

Indikationer: Katte: Behandling af blandingsinfestationer med umodne og voksne cestoder (bændelorme) og nematoder (rundorme) af følgende arter:

Cestoder:

Echinococcus multilocularis
Dipylidium caninum
Taenia spp.,

Nematoder:

Ancylostoma tubaeforme
Toxocara cati

Veterinærlægemidlet kan også anvendes til forebyggelse af hjerteorm (*Dirofilaria immitis*), hvis samtidig behandling mod cestoder er nødvendigt.

Kontraindikationer

Milpro Vet, 4 mg/10 mg filmovertrukne tabletter til små katte og killinger	Milpro Vet, 16 mg/40 mg filmovertrukne tabletter til katte
Bør ikke bruges til katte, som er under 6 uger gamle og/eller som vejer mindre end 0,5 kg.	Bør ikke bruges til katte, som vejer mindre end 2 kg.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Se også afsnittet "Særlige advarsler".

Særlige advarsler: Særlige advarsler: Det anbefales derfor, at alle de dyr der lever i samme hus, behandles samtidigt. For at kunne udvikle et effektivt ormekontrolprogram bør de lokale epidemiologiske oplysninger og kattens levevilkår tages med i betragtningen, og det anbefales derfor at søge professionel rådgivning. Efter hyppig, gentagen brug af ormemidler af en bestemt gruppe kan resistens hos parasitten udvikles over for denne gruppe. Ved behandling mod *Dipylidium caninum* bør samtidig behandling af mellemværter såsom lopper og lus overvejes, for at forhindre geninfektion. Særlige forholdsregler vedrørende sikker anvendelse hos den dyreart, som lægemidlet er beregnet til: Der har ikke været udført undersøgelser med alvorligt svækkede katte, eller katte med alvorlig nedsat nyre- eller leverfunktion. Veterinærlægemidlet anbefales ikke til disse dyr, i så fald kun efter risikovurderingen foretaget den dyrlæge, der er ansvarlig for behandlingen. Undersøgelser har vist, at behandling af hunde med et stort antal cirkulerende mikrofilarier af og til kan føre til overfølsomhedsreaktioner, som f.eks. blege slimhinder, opkastning, rystelser, besværet vejrtrækning eller voldsom savlen. Disse reaktioner hænger sammen med frigivelse af proteiner fra døde eller døende mikrofilarier og er ikke en direkte toksisk effekt af veterinærlægemidlet. I mangel af data om katte med mikrofilariæmi må lægemidlet kun anvendes efter den ansvarlige dyrlæges vurdering af risiko og fordele. Tabletterne er tilsat smag. For at undgår indtagelse ved hændeligt uheld, skal tabletterne opbevares utilgængeligt for dyr. Ifølge god dyrlægepraksis bør dyr vejes for at sikre korrekt dosering. Sørg for at katte, der vejer mellem 0,5 kg og ≤ 2 kg, gives den rette styrke tablet (4 mg milbemycinoxim/10 mg praziquantel) og den korrekte dosis (½ eller 1 tablet) for hver vægtklasse (½ tablet til katte der vejer 0,5 kg til 1 kg; 1 tablet til katte der vejer mellem >1 og 2 kg). Særlige forholdsregler for personer, der administrerer lægemidlet til dyr: Håndtér ikke dette veterinærlægemiddel i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et af hjælpestofferne. Vask hænder efter brug. Halverede tabletter bør lægges tilbage i blisterkortet, som bør opbevares i æsken. I tilfælde af utilsigtet indtagelse ved hændeligt uheld, især hos børn, skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen. Andre forholdsregler: Echinococcose udgør en fare for mennesker. Da echinococcose er en anmeldelsespligtig sygdom ifølge Verdensorganisationen for Dyresundhed (WOAH), skal specifikke retningslinjer vedrørende behandling og opfølgning samt vedrørende beskyttelsesforanstaltninger for mennesker indhentes fra den relevante myndighed. Drægtighed og laktation: I en undersøgelse blev denne kombination af aktive stoffer påvist at være veltolereret af hunkatte til avl, herunder under drægtighed og diegivning. Må kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges risikovurdering, da der ikke er udført nogen specifik undersøgelse af veterinærlægemidlet under drægtighed og laktation. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Samtidig brug af praziquantel/milbemycinoxim og selamectin er vel tolereret. Der observeredes ingen interaktioner ved indgift af den anbefalede dosis af den makrocykliske lakton selamectin under behandling med den anbefalede dosis. I mangel af yderligere undersøgelser bør der udvises forsigtighed ved samtidig brug af veterinærlægemidlet og andre makrocykliske laktoner. Der er heller ikke udført undersøgelser med reproducerende dyr. Overdosis: I en undersøgelse hvor veterinærlægemidlet blev indgivet med en terapeutisk dosis på hhv. 1 gang, 3 gange og 5 gange den normale dosis i en varighed, der oversteg den terapeutiske indikation, dvs. 3 gange med 15 dages mellemrum, blev der set symptomer, som normalt ikke ses ved den anbefalede dosis (se afsnittet "Bivirkninger"), ved indgivelse af 5 gange den terapeutiske dosis efter anden og tredje behandling. Disse symptomer forsvandt spontant næste dag.

Bivirkninger: Katte:

Meget sjælden (<1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):
Overfølsomhedsreaktion[1] Systemiske lidelser[1] (f.eks. sløvhed) Neurologiske lidelser[1] (f.eks. ataksi, muskeltremor) Lidelser i fordøjelseskanalen[1] (f.eks. opkastning, diarré)

[1] Især hos unge katte.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et produkt. Kontakt i første omgang din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægssseddel, eller hvis du mener, at medicinen ikke har virket. Du kan også indberette bivirkninger til indehaveren af markedsføringstilladelsen eller den lokale repræsentant ved hjælp af kontaktoplysningerne sidst i denne indlægssseddel eller via det nationale bivirkningssystem: Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S - Websted: www.meldenbivirkning.dk

Dosering for hver dyreart, administrationsveje og administrationsmåde: Oral anvendelse.

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt. Mindste anbefalede dosis: 2 mg milbemycinoxim og 5 mg praziquantel pr. kg givet én gang som oral engangsdosis. Veterinærlægemidlet gives sammen med foder eller efter nogen foderindtagelse. Det er en lille tablet. For at gøre indtagelsen lettere, er tabletterne blevet tilsat kødsmag. Afhængig af kattens vægt er doseringen følgende:

Vægt	Milpro Vet, 4 mg/10 mg filmovertrukne tabletter til små katte og killinger	Milpro Vet, 16 mg/40 mg filmovertrukne tabletter til katte
0,5 - 1 kg	1/2 tablet	
> 1 – 2 kg	1 tablet	
2 – 4 kg		1/2 tablet
> 4 – 8 kg		1 tablet
> 8 – 12 kg		1 + 1/2 tablet

Veterinærlægemidlet kan anvendes som forebyggende behandling mod hjerteorm, hvis der samtidig er behov for behandling mod bændelorm. Veterinærlægemidlet forebyggende virkning varer i en måned. Ved forebyggende behandling mod hjerteorm foretrækkes brugen af præparater med ét aktivt stof. Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Oplysninger om korrekt administration: Ikke relevant.

Tilbageholdelsestid(er): Ikke relevant.

Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette veterinærlægemiddel. Halve tabletter bør opbevares i det originale blisterkort og bruges næste gang. Opbevar blisterkortet i den ydre æske. Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken eller blisterkortet efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den pågældende måned. Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage (for halve tabletter): 6 måneder.

Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse: Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald. Dette veterinærlægemiddel må ikke udledes i vandløb, da milbemycin oxime kan være farligt for fisk og andre vandorganismer. Benyt returordninger ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller relateret affald i henhold til lokale retningslinjer samt eventuelle nationale indsamlingsordninger, der er relevante for det pågældende veterinærlægemiddel. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet. Kontakt dyrlægen eller apotekspersonalet vedrørende bortskaffelse af overskydende lægemidler.

Klassificering af veterinærlægemidler

Veterinærlægemidlet udleveres kun på recept.

Markedsføringstilladelsesnumre og pakningsstørrelser

Milpro Vet, 4 mg/10 mg filmovertrukne tabletter til små katte og killinger: 52583
Milpro Vet, 16 mg/40 mg filmovertrukne tabletter til katte: 52584

Tilgængelige pakningsstørrelser:

Milpro Vet, 4 mg/10 mg filmovertrukne tabletter til små katte og killinger	Milpro Vet, 16 mg/40 mg filmovertrukne tabletter til katte
Papæske med 2 tabletter, bestående af 1 blisterkort med 2 tabletter Papæske med 4 tabletter, bestående af 2 blisterkort med 2 tabletter Papæske med 24 tabletter, bestående af 12 blisterkort med 2 tabletter	Papæske med 2 tabletter, bestående af 1 blisterkort med 2 tabletter Papæske med 4 tabletter, bestående af 2 blisterkort med 2 tabletter Papæske med 24 tabletter, bestående af 12 blisterkort med 2 tabletter Papæske med 48 tabletter, bestående af 24 blisterkort med 2 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Dato for seneste ændring af indlægssedlen: 07/2025

Der findes detaljerede oplysninger om dette veterinærlægemiddel i EU-lægemiddeldatabasen (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Kontaktoplysninger: Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse: VIRBAC - 1ère avenue 2065m LID 06516 Carros - Frankrig

Lokale repræsentanter og kontaktoplysninger til indberetning af formodede bivirkninger: VIRBAC Danmark A/S - Profilvej 1 - DK-6000 Kolding

Tlf: +45 75521244 - virbac@virbac.dk
Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette veterinærlægemiddel.

NO **PAKNINGSVEDLEGG**

Veterinærpreparatets navn: MILPRO VET 4 mg/10 mg filmdrasjerte tabletter til små katter og kattunger
MILPRO VET 16 mg/40 mg filmdrasjerte tabletter til katt

Innholdsstoffer: Hver tablett inneholder:

Virkestoffer:

	Utseende	milbemycinoksim	prazikvantel
MILPRO VET 4 mg/10 mg filmdrasjerte tabletter til små katter og kattunger	Mørkebrune, avlange tabletter med kjøttsmak og en delestrek på hver side.	4 mg	10 mg
MILPRO VET 16 mg/40 mg filmdrasjerte tabletter til katter	Rød til rosa, avlange tabletter med kjøttsmak og en delestrek på hver side.	16 mg	40 mg

Hjelpestoffer:

	Hjelpestoff	Mengde
MILPRO VET 4 mg/10 mg filmdrasjerte tabletter til små katter og kattunger	Jernoksid (E 172)	0,3 mg
MILPRO VET 16 mg/40 mg filmdrasjerte tabletter til katter	Allurarød AC (E 129) Titandioksid (E 171)	0,1 mg 0,5 mg

Tablettene kan deles i to.

Dyrearter som preparatet er beregnet til (målarter): Katt.

Indikasjoner for bruk: Katt: behandling av blandingsinfeksjoner forårsaket av immature og adulte cestoder (bendelorm) og adulte nematoder (rundorm) av følgende arter:

Bendelorm (cestoder):
Echinococcus multilocularis,
Dipylidium caninum,
Taenia spp.

Rundormer (nematoder):
Ancylostoma tubaeforme,
Toxocara cati

Preparatet kan også brukes til forebygging av hjerteorm (*Dirofilaria immitis*), dersom det er behov for samtidig behandling mot bendelorm.

Kontraindikasjoner

MILPRO VET 4 mg/ 10 mg filmdrasjerte tabletter til små katter og kattunger	MILPRO VET 16 mg/ 40 mg filmdrasjerte tabletter til katter
Skal ikke brukes til kattunger som er yngre enn 6 uker gamle og/eller katter som veier mindre enn 0,5 kg.	Skal ikke brukes til katter som veier mindre enn 2 kg.

Skal ikke brukes ved overfølsomhet for virkestoffene eller noen av hjelpestoffene. Se også avsnittet "Særlige advarsler".

Særlige advarsler: Særlige advarsler: Det anbefales å behandle alle dyr i samme husholdning samtidig. For å utvikle et effektivt behandlingsprogram ved ormeinfeksjon bør det tas hensyn til lokal epidemiologisk informasjon og leveforholdene for katten, og derfor anbefales det å søke profesjonell hjelp. Parasittresistens overfor en klasse av ormemidler kan oppstå som følge av hyppig, gjentatt bruk av et ormemiddel fra gjeldende klasse. Ved infeksjon med *Dipylidium caninum* bør samtidig behandling mot mellomverter, slik som loppe og lus, vurderes for å forhindre gjentatt infeksjon. Særlige forholdsregler for sikker bruk hos målartene: Det er ikke foretatt undersøkelser med alvorlig svekkede katter eller individer med alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Preparatet anbefales ikke til slike dyr, eller kun etter en nytte/risikovurdering gjort av behandlende veterinær. Undersøkelser har vist at behandling av hunder med et høyt antall sirkulerende mikrofilarier kan av og til føre til overfølsomhetsreaksjoner, som f.eks. bleke slimhinner, oppkast, skjelvinger, anstrengt åndedrett eller overdreven sikling. Disse reaksjonene henger sammen med frigjøring av proteiner fra døde eller døende mikrofilarier, og er ikke en direkte toksisk effekt av preparatet. Da det mangler data om katter med mikrofilariaemi, bør det kun brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av behandlende veterinær. Tablettene er smaksatt. For å unngå utilsiktet inntak bør tablettene oppbevares utilgjengelig for dyr. Ifølge god veterinærpraksis bør dyr veies for å sikre korrekt dosering. Forsikre deg om at katter som veier mellom 0,5 kg og ≤ 2 kg får riktig styrke tablett (4 mg milbemycinoksim /10 mg prazikvantel) og riktig dose (½ eller 1 tablett) for hver vektklasse (½ tablett for katter veier 0,5 kg til 1 kg; 1 tablett for katter som veier mellom 1 og 2 kg). Særlige forholdsregler for personen som håndterer preparatet: Ikke håndter dette preparatet ved overfølsomhet for virkestoffene eller noen av hjelpestoffene. Vask hender etter bruk. Delte tabletter legges tilbake i den åpne blisterpakningen som oppbevares i ytteremballasjen. Ved utilsiktet inntak av tablettene, særlig hos barn, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Andre forholdsregler: Ekinokokkose utgjør en fare for mennesker. Ettersom ekinokokkose er en meldepliktig sykdom til Verdensorganisasjonen for Dyrehelse (WOAH), skal bestemte retningslinjer fra den relevante kompetente myndighet vedrørende behandling og oppfølging samt relevante beskyttelsesordninger for personer, følges. Drektighet og diegivning: I en undersøkelse ble denne kombinasjonen av virkestoffer tolerert godt hos avlskatter, også under drektighet og diegiving. Da en spesifikk undersøkelse med dette preparatet ikke er utført, skal bruk under drektighet og diegiving kun skje i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon: Samtidig bruk av kombinasjonen prazikvantel/milbemycinoksim og selamektin tolereres godt. Det er ikke observert interaksjoner ved inntak av den anbefalte dosen av det makrosykliske laktonet selamektin ved behandling med kombinasjonen. I mangel av ytterligere undersøkelser bør det utvises forsiktighet ved samtidig bruk av preparatet og andre makrosykliske laktoner. Det er heller ikke foretatt slike undersøkelser med reproduserende dyr.
Overdosering: I en undersøkelse foretatt med preparatet administrert med 1x, 3x og 5x den terapeutiske dosen, og over en periode som overstiger den terapeutiske indikasjonen, dvs. 3 ganger med 15 dagers intervaller, ble tegn som sjelden ble rapportert ved den anbefalte dosen (se avsnittet "Bivirkninger"), observert ved 5 ganger den terapeutiske dosen etter andre og tredje behandling. Disse tegnene forsvant spontant etter en dag.

Bivirkninger: Katt:

Svært sjeldne (< 1 dyr / 10 000 behandlede dyr, inkludert isolerte rapporter):
Overfølsomhetsreaksjon[1] Systemiske lidelser[1] (f.eks. sløvhet) Nevrologiske lidelser[1] (f.eks. ataksi, muskeltremor) Fordøyelseskanallidelser[1] (f.eks. oppkast, diaré)

[1] Spesielt hos unge katter.

Det er viktig å rapportere bivirkninger. Det muliggjør kontinuerlig sikkerhetsovervåking av et preparat. Hvis du legger merke til noen bivirkninger, også slike som ikke allerede er nevnt i dette pakningsvedlegget, eller du tror at preparatet ikke har virket, vennligst kontakt, i første omgang, din veterinær for rapportering av bivirkningen. Du kan også rapportere om enhver bivirkning til innehaveren av markedsføringstillatelsen eller dens lokale representant ved hjelp av kontaktinformasjonen på slutten av dette pakningsvedlegget, eller via det nasjonale rapporteringssystemet ditt, Direktoratet for medisinske produkter:
www.dmp.no/bivirkningsmelding-vet.

Dosering for hver målart, tilførselsvei(er) og tilførselsmåte: Gis i munnen. For å sikre riktig dosering skal kroppsvekt bestemmes så nøyaktig som mulig. Minste anbefalte dose: 2 mg milbemycinoksim og 5 mg prazikvantel per kg gis i munnen én gang som engangsdose. Preparatet bør administreres sammen med eller etter fôring. Preparatet er en liten tablett. For å lette administrasjonen har preparatet en drasjering med kjøttsmak. Avhengig av kattens vekt er doseringen som følger:

Vekt	MILPRO VET 4 mg / 10 mg filmdrasjerte tabletter til små katter og kattunger	MILPRO VET 16 mg / 40 mg filmdrasjerte tabletter til katter
0,5 – 1 kg	1/2 tablett	
> 1 – 2 kg	1 tablett	
2 – 4 kg		1/2 tablett
> 4 – 8 kg		1 tablett
> 8 – 12 kg		1 + 1/2 tablett

Preparatet kan bli innsatt i et program for å forebygge forekomst at hjerteorm ved samtidig indikasjon mot bendelorm. Preparatets forebyggende virkning mot hjerteorm varer i en måned. For forebyggelse av hjerteorm er monovalente preparater foretrukket.

Opplysninger om korrekt bruk: Ikke relevant.

Tilbakeholdelsestider: Ikke relevant.

Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares utilgjengelig for barn. Dette preparatet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur. Delte tabletter oppbevares i originalblisterpakningen, og brukes ved neste administrasjon. Oppbevar blisterpakningen i ytteremballasjen. Bruk ikke dette preparatet etter den utløpsdatoen som er angitt på esken og blisterpakningen etter Exp. Utløpsdatoen er den siste dagen i den angitte måneden. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje (for halve tabletter): 6 måneder.

Avfallshåndtering: Du må ikke kvitte deg med preparatet via avløpsvann eller husholdningsavfall. Vann og vassdrag skal ikke kontamineres med dette preparatet, siden milbemycinoksim kan være farlig for fisk og andre vannlevende organismer. Bruk returordninger for avhending av ubrukt preparat eller avfall fra bruken av slike preparater, i samsvar med lokale krav og egnede nasjonale innsamlingssystemer. Disse tiltakene skal bidra til å beskytte miljøet. Spør veterinæren eller på apoteket hvordan du skal kvitte deg med preparater som ikke lenger er nødvendig.

Reseptstatus: Preparat underlagt reseptplikt.

Markedsføringstillatelsesnumre og pakningsstørrelser
MILPRO VET 4 mg/10 mg filmdrasjerte tabletter til små katter og kattunger: 13-9586
MILPRO VET 16 mg/40 mg filmdrasjerte tabletter til katter: 13-9587
Pakningsstørrelser:

MILPRO VET 4 mg/ 10 mg filmdrasjerte tabletter til små katter og kattunger	MILPRO VET 16 mg/ 40 mg filmdrasjerte tabletter til katter
Pappeske med 2 tabletter (1 blisterbrett med 2 delbare tabletter) Pappeske med 4 tabletter (2 blisterbrett med 2 delbare tabletter) Pappeske med 24 tabletter (12 blisterbrett med 2 delbare tabletter)	Pappeske med 2 tabletter (1 blisterbrett med 2 delbare tabletter) Pappeske med 4 tabletter (2 blisterbrett med 2 delbare tabletter) Pappeske med 24 tabletter (12 blisterpakninger med 2 delbare tabletter) Pappeske med 48 tabletter (24 blisterpakninger med 2 delbare tabletter)

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Dato for siste oppdatering av pakningsvedlegget
01.09.2025

Detaljert informasjon om dette preparatet er tilgjengelig i Unionens preparatdatabase (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

Kontaktinformasjon: Innehaver av markedsføringstillatelse og tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse: VIRBAC - 1ère avenue 2065m LID
06516 Carros - Frankrike
Lokale representanter og kontaktinformasjon for å rapportere mistenkte bivirkninger: VIRBAC Danmark A/S
Profilvej 1 - DK-6000 Kolding - Danmark
Tlf: +45 75521244 - virbac@virbac.dk
For ytterligere opplysninger om dette preparatet, ta kontakt med lokal representant for innehaver av markedsføringstillatelsen.

Virbac

GRAPHIC STUDIO CREA

INFOS MAJ en logo simplifié + QRDV9

PRODUCT NAME: MILPRO CHATS

COUNTRY: DK - NO
ITEM: LEAFLET
SKU MASTER: 306823 - 306825
ITEM CODE: 84394902
SKU DUPLICATE: 306822
ITEM CODE DUPLICATE: 84105305

TEXT SIZE: 9 PTS

GTD (MASTER): 3B5
DIMENSIONS: 140MM X 428MM
CARACTERISTIQUE DE L'UNITE DE RECEPTION : UNITAIRE
GTD (DUPLICATE): 3B6
DIMENSIONS: 140MM X 428MM
CARACTERISTIQUE DE L'UNITE DE RECEPTION : PAR PAQUET DE 12 SOUS ELASTIQUE

COLORS

FRONT & BACK

- BLACK

TEMPLATE (last version):

TEST	TEMPLATE	MOCK UP	PRINT FILE
☐	☐	☐	X

GRAPHIC DESIGNER :	DATE :
V1- MGROSSO	13/10/2025

UPDATED BY :	DATE :
V2- XX	XX

APPROVAL SIGNATURE