

## **INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN**

### **Pectyl® Stærke Brystdråber DAK oral opløsning** Opium/campher

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Pectyl Stærke Brystdråber DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

#### **Oversigt over indlægssedlen**

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pectyl Stærke Brystdråber DAK
3. Sådan skal du tage Pectyl Stærke Brystdråber DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

### **1. VIRKNING OG ANVENDELSE**

Pectyl Stærke Brystdråber DAK er et hostestillende lægemiddel. Du kan tage Pectyl Stærke Brystdråber DAK ved:

- irritationshoste, hvor andre lægemidler ikke virker
- hoste ved alvorlige sygdomme

Lægen kan have givet dig Pectyl Stærke Brystdråber DAK for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

### **2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PECTYL® STÆRKE BRYSTDRÅBER DAK**

**Tag ikke Pectyl® Stærke Brystdråber DAK :**

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for opium, campher, eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du har stærkt nedsat vejtrækningsfunktion.

**Vær ekstra forsigtig med at tage Pectyl® Stærke Brystdråber DAK**

Da Pectyl Stærke Brystdråber DAK indeholder alkohol, må børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme kun tage Pectyl Stærke Brystdråber DAK efter aftale med lægen.

Pectyl Stærke Brystdråber DAK kan være afhængighedsskabende.

Tal med lægen, inden du tager Pectyl Stærke Brystdråber DAK, hvis du har:

- nedsat hjertefunktion
- alvorlig nyrelidelse
- alvorlig leverlidelse
- epilepsi
- alkoholproblemer

### **Brug af anden medicin**

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- sovemedicin
- beroligende medicin
- medicin mod depression (tricykliske antidepressiva)

Pectyl Stærke Brystdråber DAK indeholder alkohol. Du må ikke tage Pectyl Stærke Brystdråber DAK, hvis du er i behandling med Antabus eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen.

### **Brug af Pectyl® Stærke Brystdråber DAK sammen med mad og drikkevarer**

Du kan tage Pectyl Stærke Brystdråber DAK i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt

### **Graviditet og amning**

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

#### **Graviditet**

Hvis du er gravid, må du kun tage Pectyl Stærke Brystdråber DAK efter aftale med lægen.

#### **Amning**

Hvis du ammer, må du ikke tage Pectyl Stærke Brystdråber DAK, da Pectyl Stærke Brystdråber DAK går over i modermælken. Tal med lægen.

#### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Kør ikke bil eller motorcykel og lad være med at cykle.  
Lad være med at arbejde med værktøj eller maskiner.

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Pectyl Stærke Brystdråber DAK virker sløvende, og at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

### **Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Pectyl® Stærke Brystdråber DAK**

Pectyl Stærke Brystdråber DAK indeholder saccharose (sukker). Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Pectyl Stærke Brystdråber DAK indeholder 43 vol% alkohol, det vil sige op til 1,7 g alkohol pr. dosis. Det svarer til 43 ml øl (5 vol%) eller 18 ml vin (12 vol %) pr. dosis.

Pectyl Stærke Brystdråber DAK er skadelig for alkoholikere.

Anvend kun denne medicin til børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme efter aftale med lægen. Tal med din læge, hvis du har fået at vide, at du ikke tåler alkohol.

### **3. SÅDAN SKAL DU TAGE PECTYL® STÆRKE BRYSTRÅBER DAK**

Tag altid Pectyl Stærke Brystdråber DAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

#### **Den sædvanlige dosis er**

Voksne: 5 ml 2 - 5 gange daglig.

#### **Ældre:**

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger

#### **Børn:**

Du må ikke bruge Pectyl Stærke Brystdråber DAK til børn.

#### **Nedsat nyre- og leverfunktion:**

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Anvend vedlagte målebæger.

#### **Hvis du har taget for meget Pectyl® Stærke Brystdråber DAK**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Pectyl Stærke Brystdråber DAK, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være sløvhed, åndedrætsbesvær eller -ophør, dyb bevidstløshed, svimmelhed, forvirring, hukommelsestab, kvalme, opkastning, kolik, hovedpine, varmefølelse, delirium, muskelsammentrækninger, epileptiske kramper, forhøjet blodsukker.

#### **Hvis du har glemt at tage Pectyl® Stærke Brystdråber DAK**

Hvis du har glemt en dosis Pectyl Stærke Brystdråber DAK, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis Pectyl Stærke Brystdråber DAK, så spring den glemte dosis Pectyl Stærke Brystdråber DAK over. Tag aldrig dobbelt dosis.

### **4. BIVIRKNINGER**

Pectyl Stærke Brystdråber DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

**Ikke almindelige bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

**Ikke alvorlige:** Forstoppelse og oppustethed

**Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

**Ikke alvorlige:** allergiske reaktioner, døsighed, kvalme, opkastning, svimmelhed, små pupiller, synsforstyrrelser, irritation i mave og tarm, hududslæt, nældefeber, besvær med at lade vandet, feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (Erythema multiforme).

**Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

**Alvorlig:** Ændring i hjerterytmen og nedsat hjertefunktion, svækket vejrtrækning, overfølsomhedsreaktioner (pludseligt hududslæt, vejrtrækningsbesvær, besvimelse), epileptiske krampeanfald, dyb bevidstløshed, delirium.

**Ikke alvorlig:** Højt blodsukker, afhængighed, hovedpine, hukommelsestab, forvirring, muskelssammentrækninger, varmekølelse, anfaldsvise mavesmerter, muskelsvaghed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk).

## 5. OPBEVARING

Opbevar Pectyl Stærke Brystdråber DAK utilgængeligt for børn.

Brug ikke Pectyl Stærke Brystdråber DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden

## 6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

**Pectyl® Stærke Brystdråber DAK oral opløsning indeholder:**

De virksomme indholdsstoffer i 1 ml Pectyl Stærke Brystdråber DAK er 1,8 mg campher og 2,7 mg opium.

De øvrige indholdsstoffer er 96% ethanol, rensat vand, benzoesyre og glycerol.

Sødestof: Saccharose.

Smagsstof: Anisolie.

**Udseende og pakningsstørrelser:**

Pectyl Stærke Brystdråber DAK oral opløsning er en klar, lys, gulbrun opløsning med lugt af lakrids og campher.

Pectyl Stærke Brystdråber DAK findes i 100 og 300 ml oral opløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

**Indehaver af markedsføringstilladelsen**

Nycomed Danmark ApS  
Langebjerg 1  
DK-4000 Roskilde

**Fremstiller**

Nycomed Pharma AS  
Solbærveien 5  
N-2409 Elverum

Hardu yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail [info@nycomed.dk](mailto:info@nycomed.dk)

Seneste indlægsseddel kan ses på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

**Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2012**