

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet, har givet dig. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder, bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Viscotears.
3. Sådan skal du bruge Viscotears.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

- Viscotears er en kunstig tårevæske.
- Viscotears virker ved at fugte øjet og danner en beskyttende hinde, som kan vare op til 6 timer.
- Du kan bruge Viscotears til behandling af nedsat tåre- eller slimproduktion (tørhed i øjnene).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Viscotears

Brug ikke Viscotears

- hvis du er allergisk over for carbomer, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Viscotears (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bruger Viscotears

- hvis du har øjensmerter, synsforstyrrelser, øjenirritation eller vedvarende røde øjne
- hvis tilstanden forværres eller varer ved
- hvis du bruger kontaktlinser:
Tag kontaktlinserne ud, inden du bruger Viscotears og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen. Viscotears indeholder et konserveringsmiddel (cetrimid), som kan misfarve bløde kontaktlinser.

Brug af anden medicin sammen med Viscotears

Ved brug af andre øjenpræparater skal der gå mindst 5 minutter efter brug af Viscotears inden administration af det andet præparat.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

Du kan bruge Viscotears under graviditet.

Amning:

Du kan bruge Viscotears, selvom du ammer.

Fertilitet:

Der foreligger ingen studier på påvirkning af kvindelig eller mandlig fertilitet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Viscotears påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis dit syn bliver midlertidigt sløret, efter du har brugt Viscotears, må du ikke køre bil eller arbejde med maskiner, før dit syn er klart igen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Viscotears

Ingen relevante informationer.

3. Sådan skal du bruge Viscotears

Brug altid Viscotears nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Brug kun Viscotears i øjet/øjnene

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 dråbe 3-4 gange daglig eller efter behov.

Brug til børn og unge:

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har brugt for meget Viscotears

Kontakt lægen, skadestuen eller på apoteket, hvis du har brugt mere Viscotears, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Viscotears.

Hvis du har glemt at bruge Viscotears

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Viscotears

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Midlertidigt sløret syn

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Irritation i øjet
- Tilklistrede øjenlåg

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Smerter i øjet, kløe i øjet, hævelse omkring øjet, rødmen i øjet
- Øget tåreproduktion
- Hævelse af øjet. Kontakt lægen
- Kontakteksem

Hyppigheden er ikke kendt:

- Overfølsomhed

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk).

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar Viscotears utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Viscotears efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Opbevar ikke Viscotears ved temperaturer over 25 °C.
- Må ikke bruges mere end en måned efter anbrud.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Viscotears 2 mg/g øjengel indeholder:

Aktivt stof:

Carbomer 2 mg/g

Øvrige indholdsstoffer:

Cetrimid, natriumhydroxid, sorbitol (E420) og vand til injektionsvæsker.

Pakningsstørrelser:

Viscotears fås i:

Viscotears 2 mg/g i pakninger med 10 g

Viscotears 2 mg/g i pakninger med 3x10 g

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1333, 25301 Hostivice, CZ


For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 06/2015

Teknisk brugervejledning til patienten

Sådan bruger du Viscotears korrekt:

1. Hent tuben med Viscotears
2. Vask dine hænder, og sæt dig evt. foran et spejl.
3. Skru låget af tuben.



4. Læn hovedet tilbage, og træk det nedre øjenlåg nedad.
5. Hold tubespiden tæt hen til øjet. Brug et spejl, hvis det gør det nemmere.
6. Undgå at berøre øjet eller øjenlåget, omgivende områder eller andre overflader med tubespiden.
7. Hold tuben lodret med spidsen pegende nedad – der ved dannes der en lille dråbe på spidsen og dråben dryppes i øjet (mellem nedre øjenlåg og øjet).
8. Hvis du bruger Viscotears i begge øjne, gentages trinene 4-7 for det andet øje.
9. Skru til sidst låget på tuben umiddelbart efter brug.

Hvis dråben ikke rammer øjet, så prøv igen.

Hvis du bruger anden øjenmedicin samtidig med Viscotears, skal der gå mindst 5 minutter mellem hver behandling. Viscotears skal altid dryppes i øjet som den sidste medicin.