

Indlægsseddel: Information til brugeren

Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm 80 mg/12,5 mg, 160 mg/12,5 mg og 160 mg/25 mg filmovertukne tabletter

valsartan/hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm
3. Sådan skal du tage Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm bruges til behandling af forhøjet blodtryk, som ikke kontrolleres tilstrækkeligt af et enkelt stof alene.

Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm indeholder to aktive stoffer, der kaldes valsartan og hydrochlorthiazid. Begge disse stoffer hjælper med, at kontrollere forhøjet blodtryk (hypertension).

- **Valsartan** tilhører en gruppe medicin, der kaldes 'angiotensin II-hæmmere', der hjælper med at sænke forhøjet blodtryk. Angiotensin II er et stof, som findes i kroppen og får blodkarrene til at trække sig sammen sådan, at blodtrykket stiger. Valsartan hæmmer virkningen af angiotensin II. Derved afslappes blodkarrene og blodtrykket falder.
- **Hydrochlorthiazid** tilhører en gruppe medicin, der kaldes thiaziddiuretika (også kendt som vanddrivende medicin). Hydrochlorthiazid øger den urinmængde, der udskilles, hvilket ligeledes sænker blodtrykket.

Forhøjet blodtryk øger belastningen af hjertet og blodkarrene. Hvis det ikke behandles, kan det føre til, at blodkarrene i hjernen, hjertet og nyrerne beskadiges, hvilket kan ende med hjerneblødning, hjertesvigt eller nyresvigt. Forhøjet blodtryk øger risikoen for hjerteanfald. Ved at sænke blodtrykket til et normalt niveau nedsættes risikoen for at få disse lidelser.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm

Tag ikke Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm:

- hvis du er allergisk over for valsartan, hydrochlorthiazid, sulfonamidderivater (stoffer der er kemisk beslægtede med hydrochlorthiazid) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm (angivet i pkt. 6).
- hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet (Det er også bedst, at undgå Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm tidligt i graviditeten - se afsnittet "Graviditet og amning").
- hvis du har en alvorlig leversygdom, ødelæggelse af de små galdegange i leveren (biliær cirrose), som fører til ophobning af galde i leveren (kolestase).
- hvis du har en alvorlig nyresygdom.
- hvis du ikke er i stand til at lade vandet.
- hvis mængden af natrium eller kalium i dit blod er lavere end normalt, eller hvis mængden af calcium i dit blod er højere end normalt på trods af behandling.
- hvis du har urinsyregigt.
- hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du også tager et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren.

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du fortælle det til din læge, inden du tager denne medicin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm:

- hvis du tager kaliumbesparende medicin, kaliumtilskud, salttilskud, der indeholder kalium, eller anden medicin, der øger mængden af kalium i dit blod, for eksempel heparin (blodfortyndende medicin). Din læge kan være nødt til, at måle indholdet af kalium i dit blod regelmæssigt.
- hvis mængden af kalium i dit blod er lav.
- hvis du har diarré eller voldsom opkastning.
- hvis du tager høje doser af vanddrivende medicin (diuretika).
- hvis du har en alvorlig hjertesygdom.
- hvis du lider af hjertesvigt eller har haft et hjerteanfald. Følg nøje de anvisninger din læge har givet for startdosis. Din læge vil måske også undersøge din nyrefunktion.
- hvis du lider af forsnævring af blodårerne til nyrene.
- hvis du for nylig har fået en ny nyre.
- hvis du lider af hyperaldosteronisme. Dette er en sygdom, hvor dine binyrer producerer for meget af hormonet aldosteron. Hvis dette gælder for dig frarådes det, at du tager Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm.
- hvis du har en lever- eller nyresygdom.
- hvis du har feber, udslæt og ledsmerter, som kan være tegn på systemisk lupus erythematosus (SLE, en såkaldt autoimmun sygdom).
- hvis du har sukkersyge, urinsyregigt, højt indhold af kolesterol eller fedt i blodet.
- hvis du har haft allergiske reaktioner ved brug af andre blodtrykssænkende medicin af denne type (angiotensin II-hæmmere), eller hvis du har allergi eller astma.
- hvis du får øget følsomhed af huden for lys.
- hvis du tidligere har oplevet hævelse af tunge og ansigt pga. en allergisk reaktion (angioødem), på grund af anden medicin (inkl. ACE-hæmmere). Hvis disse symptomer opstår, når du tager Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm, skal du øjeblikkeligt stoppe med at tage Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm og aldrig tage det igen. Se også afsnit 4.
- hvis du oplever synsnedsettelse eller øjensmerter. Dette kan være symptomer på et øget tryk inde i øjet og kan opstå inden for få timer til flere uger efter, du har taget Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm. Dette kan føre til varigt synstab, hvis du ikke behandles for det. Der kan være en højere risiko for, at du oplever disse symptomer, hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion over for penicillin eller sulfonamid (antibiotika).
- hvis du tager et af følgende lægemidler til behandling af for højt blodtryk:
 - en ACE-hæmmer (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), især hvis du har nyreproblemer
 - aliskiren.

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke tage Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end

3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet ”Graviditet og amning”).

Børn og unge

Brug af Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm til børn og unge (under 18 år) frarådes.

Brug af anden medicin sammen med Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Virkningen af behandlingen kan blive påvirket, hvis du tager Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm sammen med visse andre typer medicin. Det kan være nødvendigt at ændre dosis, at tage andre forholdsregler eller i nogle tilfælde stoppe med at tage den ene medicin. Dette gælder især for følgende medicin:

- medicin, som anvendes til behandling af visse typer psykiske lidelser (lithium)
- blodtryksnedsættende medicin f.eks. guanethidin, methyldopa, vasodilatorer (f.eks. nimodipin), betablokkere, ACE-hæmmere (f.eks. enalapril, lisinopril, ramipril), calciumantagonister (f.eks. diltiazem), angiotensin II receptorblokkere (f.eks. losartan, valsartan), aliskiren.
- medicin, der får blodkarrene til at trække sig sammen eller stimulerer hjertet, såsom noradrenalin eller adrenalin.
- visse smertestillende medicin og medicin mod betændelse (acetylsalicylsyre, NSAID'er og COX-2-hæmmere).
- medicin, der kan øge mængden af kalium i blodet, såsom kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger, kaliumbesparende vanddrivende medicin, heparin (blodfortyndende medicin).
- medicin der anvendes mod tuberkulose (rifampicin).
- medicin, der bruges ved organtransplantation for at undgå afstødning (cyclosporin).
- medicin som anvendes til behandling af HIV/AIDS (ritonavir).
- medicin, der kan mindske mængden af kalium i dit blod, såsom vanddrivende medicin, afføringsmidler eller penicillin.
- binyrebarkhormoner eller visse andre hormoner (ACTH).
- medicin mod hudlidelser indeholdende salicylsyre eller lignende stoffer.
- medicin mod svamp (amphotericin).
- medicin mod for meget mavesyre (carbenoxolon).
- medicin som kan fremkalde ”torsades de pointes” (uregelmæssig hjerterytme), såsom antiarytmika (til behandling af hjerteproblemer) og nogle antipsykotika.
- medicin der mindsker mængden af natrium i blodet, f.eks. antidepressiver, antipsykotika og antiepileptika.
- digoxin eller andre digitalisglykosider (mod hjerteproblemer).
- D-vitamin eller kalktilskud.
- medicin mod sukkersyge (lægemidler der tages gennem munden eller insulin).
- medicin der kan øge blodtrykket såsom diazoxid eller betablokkere (f.eks. metoprolol, bisoprolol).
- medicin til behandling af urinsyreigt, såsom probenecid, asulfinyprazon, allopurinol.
- antikolinerge lægemidler (medicin, der bruges til at behandle forskellige lidelser såsom mavekramper, urinblærekramper, astma, transportsyge, muskelskramper, Parkinsons sygdom og som hjælpemiddel til narkose), såsom atropin eller biperiden.
- amantadin, medicin, der bruges til forebyggelse af influenza.
- medicin, der bruges til behandling af forhøjet kolesterol (colestyramin og colestipol).
- medicin mod kræft, såsom methotrexat eller cyclophosphamid.
- muskelafslappende lægemidler, såsom tubocurarin.
- alkohol, sovemedicin og narkosemidler

Hvis du skal opereres, eller skal have foretaget en undersøgelse med indtagelse af kontraststoffer, er det vigtigt, at du fortæller lægen eller tandlægen, at du tager Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm.

Brug af Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Tabletterne skal tages med et glas vand.

Undgå at indtage alkohol, indtil du har talt med din læge. Alkohol kan få dit blodtryk til at falde mere og/eller øge risikoen for, at du bliver svimmel eller føler, at du er ved at besvime.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er, eller planlægger at blive gravid. Normalt vil din læge råde dig til at stoppe med at tage Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid og råde dig til at tage en anden medicin i stedet for Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm.

Du bør ikke tage Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm, hvis du ammer, og din læge kan vælge en anden behandling, hvis du ønsker at amme, især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du skal være sikker på, hvordan Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm påvirker dig, før du kører bil, bruger værktøj, betjener maskiner eller udfører andre aktiviteter, der kræver koncentration.

Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm kan, som megen anden medicin mod forhøjet blodtryk, i sjældne tilfælde give svimmelhed, træthed og påvirke evnen til at koncentrere sig.

3. Sådan skal du tage Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm

Tag altid Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Forhøjet blodtryk medfører ofte ingen symptomer. Mange føler sig helt raske. Det er derfor vigtigt, at du overholder dine lægebesøg, selvom du føler dig rask.

Din læge vil fortælle dig helt nøjagtigt, hvor mange Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm tabletter du skal tage. Afhængig af, hvordan du reagerer på behandlingen, vil din læge måske foreslå en højere eller lavere dosis.

- Den sædvanlige dosis er én tablet dagligt.
- Du må ikke ændre denne dosis, eller holde op med at tage tabletterne uden at tale med din læge.
- Medicinen skal tages på samme tidspunkt hver dag. Det anbefales at tage tabletterne om morgenen.
- Du kan tage tabletterne med eller uden mad, sammen med et glas vand.

Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm til alle de anførte doseringer.

Hvis du har taget for mange Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du oplever kraftig svimmelhed og/eller besvimer, skal du lægge dig ned og omgående kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm

Du må ikke stoppe med at tage din medicin, medmindre du har talt med din læge om det. Dit forhøjede blodtryk kan blive værre, hvis du holder op med at tage Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægebehandling:

Du skal straks kontakte din læge, hvis du får symptomer på angioødem (hyppighed ikke kendt), som f.eks:

- Hævelse af ansigt, tunge eller svælg
- Synkebesvær
- Kløende udslæt og vejrtrækningsbesvær.

De øvrige bivirkninger kan omfatte:

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter

- hoste
- lavt blodtryk
- væskeunderskud (symptomer som tørst, tør mund og tunge, sjældne vandladninger, mørk urin, tør hud)
- muskelsmerter
- træthed
- prikkende fornemmelse eller følelsesløshed
- sløret syn
- susen for ørerne (tinnitus).

Meget sjældne: kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter

- svimmelhed
- diarré
- ledsmerter.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- væske i lungerne (lungeødem) som kan give åndenød, hurtig rallende vejrtrækning, smerter eller ubehag i brystet samt hoste med skummende evt. blodigt opspyt.
- kvalme, opkastninger, almen sløjhed, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion.
- besvimelse
- lavt natriumindhold i blodet (undertiden med kvalme, træthed, forvirring, utilpashed, kramper)
- lavt kaliumindhold i blodet (undertiden med muskelsvaghed, muskelkramper, unormal hjerterytme)
- lavt antal hvide blodlegemer i blodet med symptomer som feber, infektioner i huden, ondt i halsen eller mundsår pga. infektion, svaghed (neutropeni)
- for meget bilirubin i blodet (hvilket i alvorlige tilfælde kan farve hud og det hvide i øjnene gul)
- for meget blodureanitrogen og kreatinin i blodet (hvilket kan være tegn på unormal nyrefunktion)

- for meget urinsyre i blodet (hvilket i alvorlige tilfælde kan give urinsyreregigt)

Bivirkninger, der er set med lægemidler der indeholder valsartan eller hydrochlorthiazid alene:

Valsartan

Ikke almindelige: kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter

- mavesmerter
- svimmelhed

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- allergiske reaktioner, udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorlig. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge kan det være livsfarligt.
- kvalme, opkastninger, almen sløjhed, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nyresvigt. feber, træthed og sløjhed pga. betændelse i blodkar.
- blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
- nedsat indhold af hæmoglobin og røde blodlegemer i blodet (som begge i alvorlige tilfælde kan give blodmangel).
- muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt kalium i blodet. Forhøjet kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Lavt niveau af natrium i blodet (hvilket kan udløse kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring).
- overfølsomhedsreaktion/allergiske reaktioner i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter (serumsygd).)
- udslæt, hævelser og kløe.
- forhøjede levertal.

Hydrochlorthiazid

Meget almindelige: kan forekomme hos flere end én ud af 10 patienter

- lavt kaliumindhold i blodet (undertiden med muskelsvaghed, muskelkramper, unormal hjerterytme)
- øget indhold af fedtstoffer (lipider) i blodet

Almindelige: kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter

- lavt indhold af natrium eller magnesium i blodet
- højt indhold af urinsyre i blodet
- nældefeber og andre typer udslæt
- appetitløshed
- mild kvalme og opkastning
- svimmelhed, besvimelse når man rejser sig op pga. lavt blodtryk
- impotens

Sjældne: kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter

- blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader).
- gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot).
- uregelmæssige hjerteslag
- tristhed (depression).
- højt indhold af calcium eller sukker i blodet
- sukker i urinen
- forværring af den metaboliske tilstand ved diabetes
- øget følsomhed af huden for lys
- forstoppelse, mave- og tarmbesvær, diarré
- hovedpine
- søvnforstyrrelser
- svimmelhed
- prikkende fornemmelse eller følelsesløshed

- synsnedsættelse

Meget sjældne: kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter

- vejtrækningsbesvær sammen med feber, hoste, stakåndethed, hiven efter vejret som kan skyldes f.eks. lungebetændelse eller væske i lungerne (lungeødem).
- træthed, blødning fra hud og slimhinder samt infektioner og feber pga. forandringer i blodet.
- almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).
- alvorlig blodmangel med gulsot.
- voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.
- Kraftig afskalning og afstødning af hud. Udslæt i ansigt, nyrebetændelse, feber, led- og muskelsmerter pga. bindevævssygdom.
- Feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar.
- Overfølsomhedsreaktioner.
- Forvirring, træthed, muskelspjæt og kramper, hurtigt åndedræt (hypokloræmisk alkalose)

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- kvalme, opkastninger, almen sløjhed, aftagende eller ophørt urinproduktion pga. nedsat nyrefunktion eller nyresvigt.
- Udslæt, rød hud, blæredannelse i læber, øjne eller mund, afskallende hud, feber (mulige symptomer på erythema multiforme)
- feber (pyreksi)
- svaghed (asteni)
- muskelkramper
- Nedsat syn eller øjensmerter på grund af øget tryk i øjet (mulige symptomer på akut lukketvinkel glaucom)
- Svaghed, rødmen og hyppige infektioner (aplastisk anæmi)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30°C. Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Brug ikke Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm indeholder:

- Aktive stoffer: valsartan og hydrochlorthiazid. En tablet indeholder 80 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid eller 160 mg valsartan og 12,5 mg hydrochlorthiazid eller 160 mg valsartan og 25 mg hydrochlorthiazid.
- Øvrige indholdsstoffer:
Tabletterne: cellulose, mikrokrySTALLINSK; crospovidon; magnesiumstearat; silica, kolloid vandfri.
Filmovertrek (80 mg/12,5 mg): hypromellose, macrogol 8000, talcum, titandioxid (E 171), rød jernoxid (E 172) og gul jernoxid (E 172).
Filmovertrek (160 mg/12,5 mg): hypromellose, macrogol 8000, talcum, titandioxid (E 171) og rød jernoxid (E 172).
Filmovertrek (160 mg/25 mg): hypromellose, macrogol 4000, talcum, titandioxid (E 171), rød jernoxid (E 172), gul jernoxid (E171) og sort jernoxid (171).

Udseende og pakningsstørrelser

Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm 80 mg/12,5 mg: Lys orange, oval filmovertrokken tablet med let hvælvet overflade med "HGH" præget på den ene side og "CG" på den anden side.

Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm 160 mg/12,5 mg: Mørkerød, oval filmovertrokken tablet med let hvælvet overflade med "HHH" præget på den ene side og "CG" på den anden side.

Valsartan/Hydrochlorthiazid Orifarm 160 mg/25 mg: Orangebrun, oval filmovertrokken tablet med let hvælvet overflade med "HXX" præget på den ene side og "NVR" på den anden side.

Pakningsstørrelser

80 mg/12,5 mg:

PVC/PE/PVDC/aluminiumsblistre: 28, 98 stk

160 mg/12,5 mg:

PVC/PE/PVDC/aluminiumsblistre: 28, 98 stk

160 mg/25 mg:

PVC/PE/PVDC/aluminiumsblistre: 28, 98 stk

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 07/2015