

Progesteron DAK suppositorier 200 mg

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis du har flere spørgsmål.
- Lægen har ordineret Progesteron DAK til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for dem, selvom de har de samme symptomer som dig.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Progesteron DAK
3. Sådan skal du bruge Progesteron DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Progesteron DAK indeholder det kvindelige kønshormon progesteron.

Progesteron DAK bruges ved utilstrækkelig produktion af progesteron i æggestokkene eller ved vævsforandringer i livmoderen (endometriose).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Progesteron DAK

Brug ikke Progesteron DAK hvis du:

- er overfølsom over for progesteron eller over for det øvrige indholdsstof hårdfedt
- har brystkræft eller kræft i kønsorganerne
- har blødning fra skeden af ukendt årsag
- har svært nedsat leverfunktion
- har tendens til blodpropper, årebetændelse eller hjerneblødning
- har en arvelig stofskiftesygdom (porfyri)
- lider af svær leversygdom
- har herpes i forbindelse med graviditet
- har gulsot i forbindelse med graviditet
- har tiltagende tab af hørelsen (otosklerose)
- lider af svær kløe

Særlige forholdsregler

Før du bruger Progesteron DAK, bør din læge foretage en gynækologisk undersøgelse. Lægen vil desuden spørge til tilfælde af brystkræft i din nærmeste familie, da brugen af Progesteron DAK øger risikoen for brystkræft. Lægen vil kontrollere dig regelmæssigt under behandlingen.

Progesteron DAK bør anvendes med forsigtighed, hvis du har:

- dårligt hjerte, nyrer eller lever
- epilepsi
- migræne
- astma
- eller tidligere har haft en depression
- tendens til at få blodpropper
- sukkersyge
- aborteret eller du tager p-piller

Kontakt lægen, hvis du får gennembrudsblødning eller anden uregelmæssig blødning.

Pigmentforandringer i ansigtet kan forværres, hvis du opholder dig i solen eller går i solarium.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Progesteron DAK.

Brug af anden medicin

Fortæl lægen hvis du er i behandling med anden medicin. Det kan være nødvendigt at justere dosis eller skifte til anden behandling. Det gælder:

- medicin mod epilepsi (phenemal, phenytoin, fosphenytoin, carbamazepin)
- medicin mod tuberkulose (rifampicin)
- medicin til behandling af sygdomme i immunforsvaret (ciclosporin)
- medicin mod astma (teophyllin)
- medicin mod svamp (ketoconazol)
- behandling med aktivt kul

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Progesteron DAK.

Amning

Du må ikke bruge Progesteron DAK.

3. Sådan skal du bruge Progesteron DAK

Voksne kvinder: 1 stikpille (200 mg) daglig i 10 dage fra dag 15. til 24. fra menstruationens første dag.

Stikpillen indføres i endetarmen med den flade ende først. Indføring sker lettest, når du enten sidder på hug, sidder foroverbøjet på toilettet eller ligger på siden i sengen.

Nedsat leverfunktion

Progesteron DAK må ikke anvendes ved svært nedsat leverfunktion. Følg lægens anvisninger.

Følg altid lægens anvisninger. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du brugt for mange Progesteron DAK?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har brugt flere Progesteron DAK, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tegn på at du har brugt for mange Progesteron DAK kan være kvalme, opkastning, døsighed og svimmelhed.

Har du glemt at bruge Progesteron DAK?

Hvis du har glemt en dosis Progesteron DAK, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis springes den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Progesteron DAK kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 -10 ud af 100 behandlede):

Ændring i appetit og vægt, svimmelhed, hovedpine, smerter i brysterne, manglende menstruation, smertefuld menstruation, hedeture, udflåd og sår på livmoderhalsen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Angst, nedsat koncentrationsevne, personlighedsændring, væskeophobninger, mavesmerter, kvalme, akne, udslæt, nældefeber, hårtab, muskelsmerter, rygsmerter, kramper i benene, nedsat sexlyst.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Gulsot (alvorlig).

Hyppighed ukendt

Brystkræft (alvorlig), langsom puls (alvorlig), besvimelse (alvorlig), hyppig natlig vandladning, forstoppelse, oppustethed, opkastning, mindre blødning i hud og slimhinder, bleghed og træthed på grund af blodmangel..

Søg omgående læge, skadestue eller ring eventuelt 112 ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Der kan i sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, kan du spørge lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under "bivirkninger" på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Progesteron DAK skal opbevares utilgængeligt for børn.
Stikpillerne skal opbevares ved temperaturer under 25 °C.
Brug ikke Progesteron DAK efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Progesteron DAK suppositorier 200 mg indeholder

Det virksomme indholdsstof er progesteron. Det øvrige indholdsstof er hårdfedt.

Udseende og pakningsstørrelser

Progesteron DAK er hvide stikpiller (suppositorier)
Progesteron DAK findes i pakninger à 10 stk.

Markedsføring i Danmark

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde

Fremstiller

OY Leiras Finland Ab
Industrigatan
FIN-10 600 Ekenäs

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret februar 2007