

Isosorbidmononitrat EuroPharma 60 mg, depottabletter

Isosorbidmononitrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid Isosorbidmononitrat EuroPharma nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Isosorbidmononitrat EuroPharma
3. Sådan skal du tage Isosorbidmononitrat EuroPharma
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Isosorbidmononitrat EuroPharma tilhører gruppen af medicin kaldet nitrater.

Denne type medicin afslapper og udvider blodkarrene omkring hjertet, hvorved blodet får nemmere ved at strømme til hjertet og rundt i kroppen. Din medicin er en depottablet, som langsomt frigiver medicinen i kroppen.

Isosorbidmononitrat EuroPharma anvendes som forebyggende behandling af angina pectoris (muskelkrampe i hjertet), men er **ikke** egnet til behandling af akut angina pectoris. Hvis du får et akut anfald af angina pectoris, bør du tage en anden mere passende medicin. Du må ikke stoppe med at tage Isosorbidmononitrat EuroPharma uden først at have konsulteret din læge.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ISOSORBIDMONONITRAT EUROPHARMA

Tag ikke Isosorbidmononitrat EuroPharma

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for isosorbidmononitrat, andre nitrater eller et af de øvrige indholdsstoffer i Isosorbidmononitrat EuroPharma (angivet i afsnit 6).
- hvis du har for lavt blodtryk
- hvis du har en sygdom i hjertesækken (perikarditis eller perikardial tamponade).
- hvis du tager sildenafil, der bruges til at behandle impotens.
- hvis du har svær forkalkning i hjernens blodkar.

Advarsler og forsigtighedsregler

Isosorbidmononitrat EuroPharma anvendes som forebyggende behandling af angina pectoris (muskelkrampe i hjertet), men er ikke egnet til behandling af akut angina pectoris.

Tal med lægen inden du tager Isosorbidmononitrat EuroPharma

- hvis du har en hjertelidelse som f.eks. sygdom i hjertemuskulaturen (kardiomyopati) eller sygdom i hjerteklappen.
- hvis du har alvorligt blodmangel.
- hvis du har lavt stofskifte (hypothyroidisme).
- hvis du har for højt tryk i kraniet.
- hvis du har problemer med blodcirkulationen i hjernen som ved f.eks. et slagtilfælde eller anden hjerneskade.
- hvis du har lavt blodtryk.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Du må ikke tage sildenafil og andre phosphodiesterase type-5 hæmmere til behandling af impotens, mens du er i behandling med Isosorbidmononitrat EuroPharma.

Fortæl det til lægen eller på apoteket, hvis du tager følgende medicin, der sænker blodtrykket og derved forstærker den blodtrykssænkende virkning.

- hjertemedicin kaldet betablokkere som f.eks. sotalol, carvedilol.
- hjertemedicin kaldet calciumkanalblokkere som f.eks. verapamil, amlodipin.
- vanddrivende medicin (diuretika) som f.eks. furosemid, hydrochlorthiazid
- medicin mod depression (kaldet tricykliske antidepressiva) som f.eks. mirtazapin, trimipramin.
- beroligende midler.
- alprostadiil (prostaglandin), et andet lægemiddel til behandling af impotens.
- dihydroergotamin (mod migræne).
- blodtrykssænkende lægemidler, da deres effekt kan være kraftigere (herunder karudvidende lægemidler (vasodilatorer), blodtrykssænkende medicin (antihypertensiva) og angiotensin II receptor-agonister).
- aldesleukin til behandling af kræft.

Brug af Isosorbidmononitrat EuroPharma sammen med mad og drikke

Du kan tage Isosorbidmononitrat EuroPharma med eller uden mad, men alkohol kan øge den blodtrykssænkende effekt og gøre dig døsig. Derfor bør brugen af alkohol undgås.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Isosorbidmononitrat EuroPharma.

Hvis du er gravid eller ammer, må du kun tage Isosorbidmononitrat EuroPharma efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du må ikke køre bil eller betjene maskiner, hvis du føler dig svimmel eller svag.

Isosorbidmononitrat EuroPharma indeholder lactose.

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ISOSORBIDMONONITRAT EUROPHARMA

Tag altid Isosorbidmononitrat EuroPharma nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Den sædvanlige startdosis er ½ (30 mg) Isosorbidmononitrat EuroPharma tablet en gang dagligt i de første 2-4 dage. Tabletten har en delekærv, der deler tabletten i to lige store dele. Herefter er den sædvanlige dosis 1 (60 mg) tablet dagligt om morgenen. Hvis nødvendigt, kan dosis øges til 2 (120 mg) tabletter dagligt, taget om morgenen.

Slug tabletten med ½ glas vand om morgenen. Tabletten må ikke knuses eller tygges, selvom du kan dele den i to.

Børn

Du må ikke give denne medicin til børn.

Hvis du har taget for mange Isosorbidmononitrat EuroPharma depottabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Isosorbidmononitrat EuroPharma depottabletter, end der står i denne information, eller flere tabletter end lægen har foreskrevet.

Symptomer på en overdosis kan være hovedpine, ophidselse og pirrelighed, rødmen, koldsved, opkastning, hurtig puls, hjertebanken, svimmelhed, besvimelse og lavt blodtryk. Meget store doser kan give blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet. Hvis du får lavt blodtryk, skal du lægge dig ned med benene opad, da dette kan hjælpe med at mindske symptomerne.

Kontakt straks din læge eller tag til nærmeste skadestue. Tag beholderen med, også selvom den er tom.

Hvis du har glemt at tage Isosorbidmononitrat EuroPharma

Hvis du har glemt at tage Isosorbidmononitrat EuroPharma må du ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis det snart er tid til den næste dosis, skal du blot fortsætte med at tage tabletterne som planlagt.

Hvis du holder op med tage Isosorbidmononitrat EuroPharma

Du må ikke stoppe med at tage tabletterne uden først at tale med lægen, da din angina pectoris kan vende tilbage eller forværres.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger, der skyldes Isosorbidmononitrat EuroPharma, forekommer som oftest i starten af behandlingen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

- Hovedpine

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- Svimmelhed.
- Lavt blodtryk.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Kvalme.

Isosorbidmononitrat EuroPharma, udg. 1

Ikke almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- Opkastning.
- Diarré.

Sjældne bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Besvimelse.
- Hududslæt.
- Kløe.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Denne medicin kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Brug ikke Isosorbidmononitrat EuroPharma efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Isosorbidmononitrat EuroPharma depottabletter indeholder:

- Aktivt stof: Isosorbidmononitrat 60 mg.
- Øvrige indholdsstoffer:
Tabletterne: Mikrokrystallinsk cellulose, tungt kaolin, magnesiumstearat, vandfri kolloid silica.
Tabletovertræk: Syntetisk paraffinvoks, hård paraffinvoks, hypromellose, titandioxid (E171), lactosemonohydrat, macrogol, gul jernoxid (E172), sort jernoxid (E172), rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Isosorbidmononitrat EuroPharma er gule, ellipseformede, filmovertrukne tabletter mærket med "IM" delekærv "60" på den ene side og delekærv på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store dele.

Isosorbidmononitrat EuroPharma fås i blisterpakninger med 30 og 100 depottabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen, ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Isosorbidmononitrat EuroPharma svarer til Fem-Mono Retard.