

INDLÆGSSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Salbuvent® 0,4 mg/ml oral opløsning
Salbutamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Salbuvent® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Salbuvent®
3. Sådan skal du tage Salbuvent®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Salbuvent® virker muskelafslappende og udvidende på luftvejene. Derved kan luften igen passere uhindret, og det bliver nemmere at trække vejret.

Du skal bruge Salbuvent® til behandling af astmaanfald, der udløses af anstrengelse eller til anden form for vejtrækningsbesvær. Virkningen er kortvarig.

Salbuvent® gives normalt i kombination med anden forebyggende behandling, afhængig af hvor hæmmet du er af din astma.

Lægen kan have givet dig Salbuvent® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE SALBUVENT®

Tag ikke Salbuvent® hvis du er overfølsom over for salbutamol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Salbuvent®

Gå jævnligt til lægen, så du får den mængde medicin, der passer til sværhedsgraden af din astma. Du skal helst ikke have anfald eller vågne om natten pga. astma.

Fortæl lægen hvis du får flere tegn på anfald (hoste og åndenød) eller hvis du ønsker at stoppe behandlingen.

Tal med lægen inden du tager Salbuvent®, hvis du:

- har sukkersyge
- har for højt stofskifte
- har alvorlige hjerte-kar-sygdomme, f.eks. for højt blodtryk eller høj, uregelmæssig puls

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Salbuvent®.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen hvis du tager:

- hjertemedicin og medicin mod forhøjet blodtryk (visse betablokkere, hjerteglykosider)
- visse lægemidler mod tilstoppet næse, allergi eller astma
- medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva)
- hormoner (kortikosteroider)
- vanddrivende medicin

Brug af Salbuvent® sammen med mad og drikke

Du kan tage Salbuvent® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Salbuvent® efter lægens anvisning. Salbuvent® kan hæmme veerne under fødslen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Salbuvent® hvis det er aftalt med lægen. Salbuvent® bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Salbuvent® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Salbuvent®

Salbuvent® oral opløsning indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Salbuvent® oral opløsning indeholder en mindre mængde alkohol, mindre end 100 mg pr. dosis.

Salbuvent® oral opløsning indeholder nipastat (konserveringsmiddel), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).

3. SÅDAN SKAL DU TAGE SALBUVENT®

Tag altid Salbuvent® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Afmål medicinen i et målebæger eller med en engangssprøjte.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 10 ml (4 mg) 3 - 4 gange daglig. Dosis kan eventuelt fordobles.

Børn 2 – 6 år: 2,5 – 5 ml (1 – 2 mg) 3 - 4 gange daglig.

Børn 6 – 12 år: 5 – 10 ml (2 – 4 mg) 3 - 4 gange daglig.

Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter og varer op til 6 timer.

Ved akut forværring af vejrtrækningen er øjeblikkelig lægehjælp nødvendig.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Salbuvent®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget mere Salbuvent®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Overdosering kan give rødmen i ansigtet, indre uro, hjertebanken, rysten på hænderne, kvalme, hurtig puls, svimmelhed, hovedpine, påvirkning af blodtrykket.

Hvis du har glemt at tage Salbuvent®

Du må ikke tage dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Salbuvent®

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Salbuvent®. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Salbuvent® kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):
Ikke alvorlig: Rysten.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):
Ikke alvorlige: Hovedpine, hurtig puls, hjertebanken, muskelkramper.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):
Ikke alvorlige: Anspændthed, nervøsitet, svimmelhed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Hurtig/evt. meget uregelmæssig puls og hjerterytme.

Ikke alvorlige: Kvalme, svimmelhed pga. lavt blodtryk, svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. nedsat kaliumindhold i blodet.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Overfølsomhedsreaktioner i form af pludseligt hududslæt, nældefeber, væskeophobning under huden især ved læber og hals, vejrtrækningsbesvær, lavt blodtryk, besvimelse.

Ikke alvorlige: Muskelspænding, hyperaktivitet hos børn.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevar Salbuvent[®] utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Salbuvent[®] ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Salbuvent[®] efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Salbuvent[®] oral opløsning 0,4 mg/ml indeholder

Det aktive stof er salbutamol. De øvrige indholdsstoffer er ethanol (0,5 vol%), natriumcitrat, saccharinnatrium (E 954), sorbitol (E 420), vand og citronsyre (E 330).

Konserveringsmiddel: Nipastat.

Smagsstof: Koncentreret jordbæressens.

Udseende og pakningsstørrelser

Salbuvent[®] oral opløsning er en klar væske med jordbærsmag.

Salbuvent[®] findes i pakningsstørrelser à 100 og 300 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Pharma

Solbærveien 5

N-2409 Elverum

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2011