

Dalacin® 10 mg/ml kutanopløsning

clindamycin

1542865907

Dalacin® er et registreret varemærke, som tilhører Pfizer Koncernen

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Dalacin® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Dalacin® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Dalacin®s virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Dalacin®
3. Sådan skal De bruge Dalacin®
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Dalacin®
6. Yderligere oplysninger

1. Dalacin®s virkning og hvad De skal bruge det til

Dalacin® kutanopløsning virker mod betændelse (antibiotikum).

De kan bruge Dalacin® til behandling af svære tilfælde af bumser (acne vulgaris).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Dalacin®

Brug ikke Dalacin® hvis:

- De er overfølsom over for clindamycin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin®.
- De er overfølsom over for lincomycin.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Dalacin®

Kontakt lægen hvis:

- De får kraftig eller vedvarende diaré.

Vær opmærksom på:

- De må ikke bruge Dalacin® omkring øjnene. De skal undgå at kutanopløsningen kommer i kontakt med øjne og mund. Hvis kutanopløsningen kommer i øjnene, skal De skylle øjnene grundigt med rindende vand.

- De bør kun bruge Dalacin®, hvis De har et meget kraftigt udbrud af bumser (acne) og De skal bruge Dalacin® i så kort tid som muligt. Ellers er der risiko for, at bakterierne bliver modstandsdygtige mod Dalacin®.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

De kan bruge Dalacin® sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun bruge Dalacin® efter lægens anvisning.

Amning:

Erfaringerne med Dalacin® er begrænsede. De bør derfor ikke bruge Dalacin®, hvis De ammer. Spørg lægen.

Hvis behandling er nødvendig skal amning ophøre. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Dalacin®

Dalacin® kutanopløsning indeholder:

- Isopropylalkohol, som kan give svie og irritation af øjne, slimhinder og beskadiget hud (rifter og sår).
- Propylenglycol, som kan give irritation af huden.

3. Sådan skal De bruge Dalacin®

Brug altid Dalacin® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Dosering

Til udvortes brug.

Voksne: Smør opløsningen i et tyndt lag på den angrebne hud 2 gange dagligt.

Børn: De må kun bruge Dalacin til børn efter lægens anvisning.

Ældre: De må kun bruge Dalacin® til ældre efter lægens anvisning.

Brugsanvisning:

- Rengør og aftør den angrebne hud.
- Vend flasken op og ned indtil applikatoren bliver fugtig.
- Dup applikatoren mod huden og smør kutanopløsningen på uden at gnide.
- Smør et tyndt lag af kutanopløsningen på den angrebne hud. Brug kun lidt kutanopløsning ad gangen.
- Undgå at få Dalacin® i øjne og mund.
- Hvis kutanopløsningen kommer i øjnene, skal De skylle øjnene grundigt med rindende vand.
- Hvis applikatoren bliver tør, skal De vende flasken op og ned og trykke indtil applikatoren bliver fugtig.

Hvis De har brugt for meget Dalacin® kutanopløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Dalacin®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Dalacin®.

Hvis De har glemt at bruge Dalacin®

Hvis De har glemt at bruge Dalacin®, brug den da så snart De kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste behandling, spring da den glemte dosis over. Brug ikke dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at bruge Dalacin®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

4. Bivirkninger

Dalacin® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter): Tyktarmsbetændelse. Alvorlig vedvarende diaré og smerter evt. med blod og slim i afføringen. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter): Tør hud, hudirritation, kløe.

Hyppigheden ikke kendt: Kontakteksem, fedtet hud, betændelse i hårsække, sviende øjne, mavesmerter, mave-tarmproblemer, diaré.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kræver behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Sådan opbevarer De Dalacin®

Dalacin® opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke Dalacin®, efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Dalacin® kutanopløsning 10 mg/ml indeholder: Aktivt stof: Clindamycin som clindamycinphosphat. Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol, isopropylalkohol, natriumhydroxid, saltsyre, rensed vand.

Dalacin®s udseende og pakningsstørrelse:

Dalacin® er en klar væske. Dalacin® findes i pakningsstørrelserne 30 ml og 60 ml (2 x 30 ml). Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark:

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2007