

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Salina DAK, oral opløsning Ekstrakt af lakridsrod

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

- Salina DAK er et naturlægemiddel. For at opnå den bedste virkning skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Salina DAK.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Hvis du ikke får det bedre i løbet af en uge, eller hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.
- Tal med apoteket eller din læge, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Salina DAK
3. Sådan skal du tage Salina DAK
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Salina DAK er et naturlægemiddel, der virker slimløsnende ved hoste i kortere perioder.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE SALINA DAK

Tag ikke Salina DAK hvis:

- du er overfølsom over for lakrids eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
- du har lavt kaliumindhold i blodet, f.eks. hvis du tager vanddrivende medicin eller bruger afføringsmiddel
- du har forhøjet blodtryk
- dit hjerte har svært ved at pumpe blodet rundt i kroppen
- du har svært nedsat nyrefunktion
- du har skrumpelever

Vær ekstra forsigtig med at tage Salina DAK

Salina DAK bør ikke anvendes i mere end 4 - 6 uger.

Salina DAK skal tages med forsigtighed, hvis dit hjerte slår uregelmæssigt (arytmier).

Salina DAK er skadelig for alkoholikere.

Da Salina DAK indeholder alkohol, må børn, gravide og ammende kvinder samt patienter med epilepsi eller leversygdomme kun tage Salina DAK efter aftale med lægen.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol at du er i behandling med Salina DAK, da det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, andre naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

- vanddrivende medicin
- hjertemedicin (digoxin)
- medicin mod infektion (metronidazol)
- binyrebarkhormoner
- medicin til alkoholafvænning (disulfiram)

Brug af Salina DAK sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Salina DAK uafhængigt af måltiderne.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Da Salina DAK indeholder alkohol, må du kun bruge Salina DAK efter aftale med lægen.

Amning

Da Salina DAK indeholder alkohol, må du kun bruge Salina DAK efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Salina DAK påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Salina DAK

Denne medicin indeholder 1,1 vol% alkohol, dvs. op til 135 mg alkohol pr. dosis svarende til 3,3 ml øl eller 1,4 ml vin pr. dosis.

Mængden af alkohol i denne medicin kan ændre virkningen af anden medicin. Du må ikke tage Salina DAK, hvis du er i behandling med Antabus[®] eller metronidazol (mod betændelse). Tal med lægen.

Salina DAK indeholder methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216), som kan give allergiske reaktioner - også efter behandlingens afslutning.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE SALINA DAK

Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens anvisning.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 15 ml 3 – 4 gange daglig. Brug vedlagte målebæger til at afmåle medicinen med. Kontakt lægen hvis der ikke ses bedring inden for en uge.

Ældre: Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Følg lægens anvisning.

Børn: Der er ingen børnedosering, idet erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig. Du må kun bruge Salina DAK til børn under 2 år efter aftale med en læge.

For at undgå forstyrrelser i saltbalancen, væskeophobning i kroppen og blodtryksforhøjelse bør du ikke anvende Salina DAK i mere end 4 – 6 uger.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisning.

Har du taget for meget Salina DAK?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget mere Salina DAK, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag flasken med.

Tegn på overdosering kan være forhøjet blodtryk, forstyrrelser i saltbalancen (kan for eksempel vise sig ved væskeophobning i kroppen), hovedpine, muskelsvaghed, træthed, uregelmæssig hjerterytme, hjertesvigt.

Har du glemt at tage Salina DAK?

Hvis du har glemt en dosis Salina DAK, tag den da så snart du kommer i tanke om det. Er det tæt på tidspunktet for næste dosis, springes den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Salina DAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):
Allergiske reaktioner.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige allergiske reaktioner, forhøjet blodtryk, forstyrrelse i væske-/saltbalancen, forstyrrelse i hjerterytmen.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved alvorlige bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Salina DAK utilgængeligt for børn.
Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperatur for dette lægemiddel.
Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Salina DAK, oral opløsning indeholder

Aktivt stof i 1 ml: 98,5 mg vandig ekstrakt af lakridsrod (3:1) svarende til 4,64 mg glycyrrhizinsyre pr. ml.

Øvrige indholdsstoffer: Ethanol, koncentreret ammoniakopløsning, polysorbat 80 og rensset vand.

Smagsstoffer: Ammoniumchlorid og pebermynteolie.

Konserveringsmidler: Methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216).

Udseende og pakningsstørrelser

Salina DAK er en klar/næsten klar, sortbrun væske.

Produktet findes i pakningsstørrelser à 200 ml, 300 ml og 500 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Pharma AS

Solbærveien 5

2409 Elverum, Norge

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2009