

Dancor® 10 mg tabletter

nicorandil

0924245902

Dancor® svarer til lægemidlet Angicor®

Dancor® er et registreret varemærke, som tilhører Merck KGaA.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Dancor® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Dancor® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Dancor®
3. Sådan skal De bruge Dancor®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Dancor® tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes perifere vasodilatorer.

Dancor® virker forebyggende mod smerter i brystet, der skyldes forsnævninger i kranspulsårerne.

Dancor® indeholder det aktive stof nicorandil, der virker afslappende på blodkarrene i kranspulsårerne, hvorved blodgennemstrømningen i de forsnævrede kranspulsårer forbedres.

Dancor® anvendes til at forebygge hjerte-kramper (angina pectoris).

Lægen kan have givet Dem Dancor® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE DANCOR®

Tag ikke Dancor® hvis:

- De er overfølsom overfor nicorandil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dancor®.
- De lider af kredsløbskollaps pga. hjerte-lidelse, blodprop i hjertet, blodprop i lungerne, rytmeforstyrrelser i hjertet, hjertesvigt.
- De lider af alvorligt nedsat funktion i venstre side af hjertet.
- De lider af lavt blodtryk.
- De samtidig anvender medicin mod erektil dysfunktion/impotens (fx sildenafil, tadalafil, vardenafil).

Vær ekstra forsigtig med at tage Dancor®

Tal med lægen, hvis:

- De samtidig er i behandling med blodtrykssænkende medicin
- De har nedsat blodvolumen
- De har for lavt blodtryk
- De har akut opstået blodprop i hjertet med nedsat funktion i venstre side af hjertet
- De har væske i lungerne
- De får vedvarende blister, sår i mundhulen eller blødninger i huden. De bør kontakte lægen, som vil vurdere, om ophør af behandlingen med Dancor® er nødvendig.

Hvis De får voldsomme smerter i maven og meget medtaget tilstand pga. hul i mave eller tarm, skal De straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Hvis De får blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm, skal De straks kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Dancor®. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis De bruger:

- medicin mod impotens/erektil dysfunktion (fx sildenafil, tadalafil, vardenafil)
- visse typer af medicin mod depression (tricycliske antidepressiva)
- medicin med for højt blodtryk
- binyrebarkhormoner.

Brug af Dancor® sammen med mad og drikke

De kan tage Dancor® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

De bør undgå at drikke alkohol, mens De er i behandling med Dancor®, da Dancor® kan forstærke virkningen af alkohol.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, skal De normalt ikke tage Dancor®. Tal med lægen.

Amning

De må ikke tage Dancor®, hvis De ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dancor® kan give bivirkninger i form af svimmelhed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. De bør ikke køre eller betjene maskiner, før De ved hvordan Dancor® påvirker Dem.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE DANCOR®

Brug altid Dancor® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Vær opmærksom på, at De ikke kan bruge Dancor® 10 mg tabletter til alle de anførte doseringer.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: 10 mg 2 gange dagligt. Dosis kan øges til 20 mg 2 gange daglig eller mere. Den maksimale dosis er 80 mg daglig.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Tal med lægen.

Børn:

Dancor® bør ikke bruges til børn.

De bør først tage tabletten ud af blisterpakningen lige før brug, da tabletterne er følsomme for fugt.

Blisterpakningen indeholder en rød tørretabelt, som De ikke må indtage.

Hvis De har taget for mange Dancor® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Dancor®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er udvidelse af blodkarrene, som giver et fald i blodtrykket og hurtig puls.

Hvis De har glemt at tage Dancor®

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis De har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis De holder op med at tage Dancor®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dancor® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Leverbetændelse, gulsot eller ophobning af galde i galdegangene. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- hovedpine, sædvanligvis forbigående (ses oftest i begyndelsen af behandlingen).

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter):

- blødning fra endetarmen. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- svimmelhed.
- rødmen.
- kvalme, opkastning.
- følelse af svaghed.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter):

- svimmelhed, evt. besvimelse pga. for lavt blodtryk.
- hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis De får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter):

- Smerter opadtil i maven og bag nederste del af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tolvfingertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde udvikle sig til blødende mavesår med blodig eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk eller tarm med meget voldsomme mavesmerter og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- hjertebanken.
- alvorlige tilfælde af smertefulde blister eller sår i mundhule og på tunge. Kontakt læge.
- påvirkning af leverens funktions. Tal med lægen.
- forskellige former for udslæt, kløe.
- muskelsmerter.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- dobbeltsyn.
- øget følsomhed af huden for lys.
- sår på huden, hovedsageligt ved endetarmsåbningen, på kønsorganerne og på maven.
- mavesmerter.

Dancor® kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverprøver, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares over 25°C.
- Opbevares i original emballage, da det er følsomt for fugt.
- Brug ikke Dancor® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Dancor® 10 mg tabletter indeholder:

- Aktivt stof: Nicorandil 10 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, croscarmellosenatrium, stearinsyre og mannitol.

Udseende og pakningsstørrelse

Dancor® 10 mg er en hvid, rund tablet med delekærv, mærket "EM" på den ene side og "73" på den anden side.

Dancor® findes i pakningsstørrelsen 60 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev sidst revideret marts 2011