

Zymelin[®] næsedråber, opløsning 1 mg/ml

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Zymelin[®] uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Zymelin[®].

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Zymelin[®]
3. Sådan skal du bruge Zymelin[®]
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Zymelin[®] får blodårerne i næsens slimhinder til at trække sig sammen. Det giver mere luft gennem næsen. Virkningen kommer i løbet af 5 - 10 minutter og holder i 10 - 12 timer. Du kan bruge Zymelin[®] ved forkølelse med tilstoppet næse eller ved bihulebetændelse.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Zymelin[®]

Brug ikke Zymelin[®] hvis du:

- tidligere har haft en allergisk reaktion efter anvendelse af denne type medicin
- er overfølsom over for det virksomme indholdsstof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer
- lider af grøn stær med snæver kammervinkel
- har fået fjernet hypofysen eller er blevet opereret i hjernen gennem næse eller mund

Særlige forholdsregler

Du må ikke bruge Zymelin[®] til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger selv ved lave doser.

Du må ikke bruge Zymelin[®] 1 mg/ml til børn under 10 år uden lægens anvisning.

Behandlingen bør ikke vare længere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug kan medføre, at hævelsen af næseslimhinden eller følelsen af tæt næse vender tilbage eller forværres.

Brug Zymelin[®] med forsigtighed hvis du er følsom over for stoffer, der giver dig søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk.

Hvis du lider af svært forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, stofskiftesygdomme, diabetes, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata eller er i behandling med medicin mod depression (tricykliske eller tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere), bør du kun anvende Zymelin® efter lægens anvisning.

Brug af anden medicin

Hvis du er i behandling med visse stoffer mod depression (tricykliske eller tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere), kan bivirkninger ved brug af Zymelin® blive forstærket. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller på apoteket.

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Ved graviditet eller hvis du ammer, bør du kun bruge Zymelin® efter lægens anvisning.

3. Sådan skal du bruge Zymelin®

Bryd flaskens forsegling ved at skrue låget helt til. Herved dannes et lille hul i flaskens spids. Skru låget af. Flasken er nu klar til brug.

Voksne og børn over 10 år: 2 dråber i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage.

Børn under 10 år må ikke bruge Zymelin® 1 mg/ml uden lægens anvisning.

Du må ikke bruge Zymelin® 1 mg/ml til børn under 2 år.

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Hvis lægen har anvist en dosering, skal du følge lægens anvisning.

Har du brugt for meget Zymelin®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har brugt mere Zymelin®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, dødsighed, hovedpine, hurtig og uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk. Hos børn under 2 år kan indtræffe koma. Disse tilstande kan også opstå ved at tage medicinen forkert, f.eks. ved at indtage dråberne gennem munden.

Har du glemt at bruge Zymelin®?

Tag næste dosis så snart du kommer i tanke om det. Tag ikke flere end 3 doser dagligt.

4. Bivirkninger

Zymelin® kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, øget sekret fra næsen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):
Tilstopet næse især efter hyppig eller langvarig brug.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):
Alvorlige allergiske reaktioner som hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig eller uregelmæssig puls, hævelse af ansigt og hals.
I tilfælde af disse alvorlige bivirkninger skal du straks søge læge eller ringe 112.

Der kan i sjældne tilfælde optræde andre, ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller på apoteket.

Fortæl læge eller apotek hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Opbevar Zymelin[®] utilgængeligt for børn.

Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Zymelin[®] næsedråber, opløsning 1 mg/ml indeholder

Det virksomme indholdsstof er xylometazolinhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er benzalkoniumchlorid, dinatriumphosphatdihydrat (E 339), natriumchlorid, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, natriumedetat og rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Zymelin[®] næsedråber er en klar, farveløs opløsning.
Zymelin[®] findes i flasker à 10 ml.

Markedsføring i Danmark

Nycomed Danmark ApS
Langebjerg 1
DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Pharma AS

Solbærveien 5
N-2409 Elverum
Norge

Hvis du får bruk for Zymelin[®] i andre lande, så spørk efter medicin der inneholder xylometazolinhydrochlorid.

Har du yderligere spørsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret marts 2007